

HISTOIRE
DE
L'ACADEMIE
ROYALE
DES SCIENCES.

ANNE'E M. DCCXXIII.

Avec les Memoires de Mathematique & de
Physique, pour la même Année.

Tirez des Registres de cette Academie.



A AMSTERDAM,
Chez PIERRE DE COUP, Marchand
Libraire dans le Kalverstraat.

M. DCCXXX.





T A B L E

POUR

L'HISTOIRE.

PHYSIQUE GENERALE.

<i>Sur la manière dont le Fer s'aimante.</i>	Page 1
<i>Sur la lumière des Dails.</i>	10
<i>Sur la rondeur des Pierres & des Cailloux.</i>	12
<i>Sur le Phosphore du Barometre.</i>	18
<i>Sur les Pierres de Foudre , les Toux de Serpent, & les Crapaudines.</i>	21
<i>Observation de Physique generale.</i>	24

A N A T O M I E.

<i>Sur les deux Espaces que l'Humeur Aqueuse occupe dans l'Oeil.</i>	25
<i>Sur la formation des Hydatides.</i>	30
<i>Diverses Observations Anatomiques.</i>	36

T A B L E.

C H I M I E.

<i>Sur un Verd-de-gris naturel.</i>	48
<i>Sur le Sel Armoniac.</i>	51

B O T A N I Q U E.

55

A L G È B R E.

<i>Sur le Calcul des Differences finies , & des Sommes des Suites.</i>	56
<i>Sur une Methode pour la transformation des Nombres Irrationels en Rationels.</i>	67

G E O M E T R I E.

<i>Sur une Proprieté des Polygones inscrits ou cir- cons crits au Cercle.</i>	80
<i>Sur l'Universalité des Figures.</i>	83

A S T R O N O M I E.

<i>Sur l'Apogée & le Périgée, ou l'Aphélie & le Périhélie des Planètes.</i>	90
<i>Sur une Comète.</i>	100
<i>Sur la Conjonction de Mercure avec le Soleil, du 9 Novembre.</i>	104

OPTI-

OPTIQUE.

<i>Sur les Ombres des Corps.</i>	123.
----------------------------------	------

MECHANIQUE.

<i>Sur le Choc des Corps à ressort.</i>	139
<i>Sur la Reflexion & la Refraction.</i>	147
<i>Machines ou Inventions approuvées par l'Académie en 1723.</i>	165.





T A B L E

P O U R

LES MEMOIRES.

*O*bservations Meteorologiques, faites en 1722.
Par M. MARALDI. Page 1

*De l'Origine & des Usages de la Pierre de
Foudre.* Par M. DE JUSSIEU. 7

*Sur les Figures inscrites & circonscrites au
Cercle.* Par M. SAURLIN. 12

*Examen d'une Matière cuivreuse, qui est
une espece de Verd-de-gris naturel.* Par M.
DE REAUMUR. 14

*Seconde Partie du Calcul des Differences fi-
nies.* Par M. NICOLE. 26

*Memoire sur les Teux gelés; dans lequel on
determine la grandeur des Chambres qui
renferment l'humeur aqueuse.* Par M. PE-
TIT, Medecin. 54

*Methode generale pour transformer les Nom-
bres irrationaux en series de Fractions ra-
tionnelles les plus simples & les plus appro-
chantes qu'il soit possible. L'on explique à
cette occasion un endroit important d'Archimede,
qui paroît n'avoir pas été entendu par
ses Commentateurs.* Par M. DE LAGNY. 78

*Observations Anatomiques sur quelques mouve-
mens.*

T A B L E.

<i>mens extraordinaires des Ontoplores & des Bras. Et sur une nouvelle espèce de Muscles. Par M. WINSLOW.</i>	98
<i>Proposition Elementaire sur les Triangles. Par M. DE BEAUFORT.</i>	112
<i>Experiences qui montrent avec quelle facilité le Fer & l'Acier s'aimantent, même sans toucher l'Aimant. Par M. DE REAUMUR.</i>	116
<i>Sur le dernier Passage attendu de Mercure dans le Soleil, & sur celui du mois de Novembre de la presente année 1723. Par M. DELISLE le Cadet.</i>	149
<i>Diverses Experiences d'Optique. Par M. MARALDI.</i>	157
<i>Des diverses Methodes de déterminer l'Apogée & le Perigée, ou l'Aphelie & le Perihelie des Planetes. Par M. CASSINI.</i>	201
<i>Etablissement d'un nouveau Genre de Plante, sous le nom de RICINOCARPOS. Par M. MARCHANT.</i>	243
<i>Seconde Section de la seconde Partie du Calcul des differences finies, où l'on traite des grandeurs exprimées par des fractions. Par M. NICOLE.</i>	253
<i>Des Merveilles des Dails, ou de la lumière qu'ils répandent. Par M. DE REAUMUR.</i>	287
<i>De l'Origine des Pierres appelées YEUX DE SERPENTS ET CRAPAUDINES. Par M. DE JUSSIEU.</i>	296
<i>Suite des Observations sur la Fabrique du Sel Ammoniac, avec sa décomposition pour en tirer le Sel volatil, que l'on nomme vulgairement SEL d'ANGLETERRE. Par M. GEOFFROI le Cadet.</i>	304
<i>Dernières Remarques sur un Cas singulier du</i>	Pre-

T A B L E.

Problème des Tangentes. Par M. SAURIN. 321

Observations & Reflexions sur la Comete qui a paru au mois d'Octobre 1723. Par M. MARALDI. 360

Observation du Passage de Mercure dans le Soleil. Du 9 Novembre 1723. Par M. CASSINI. 372

Sur la Rondeur que semblent affecter certaines especes de Pierres, & entr'autres sur celle qu'affectent les Cailloux. Par M. DE REAUMUR. 391

Observation de Mercure sur le disque apparent du Soleil. Par M. MARALDI. 407

Memoire sur les Barometres lumineux. Par M. DU FAY. 422

Observation du Passage de Mercure sur le Soleil; faite à Paris dans l'Observatoire Royal, le 9 Novembre 1723, au soir. Par M. DE LISLE le Cadet. 438

Suite des Recherches Physico-Mathematiques sur la Reflexion des Corps. Par M. DE MAIRAN. 489

Arachidnoides Americana, Arachidna quadri-folia villosa, fl. luteo. nov. plant. Americ. gen. Plum. 49. Pistache du Tertre. 2. 121. Manobi. Labat. 4. 59. Par M. NISSELE, de la Societé Royale de Montpellier. 550



HISTOIRE

DE

L'ACADEMIE ROYALE.

DES SCIENCES.

ANNE'E M. DCCXXIII.



PHYSIQUE GENERALE.

SUR LA MANIERE

dont le Fer s'aimante.

L'AIMAN est si fécond en prodiges, que chacun de ses phénomènes principaux, dès qu'il est approfondi, en devient une source presque inépuisable, & se subdivise, pour ainsi dire, en une infinité de prodiges nouveaux. Telle est la manière dont le Fer s'aimante, c'est-

HIST. 1723.

A

à-dire,

* V. les M. p. 116.

2. HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

à-dire , acquiert la propriété qu'il n'avoit pas d'attirer d'autre Fer aussi-bien que l'Aiman. *M. de Reaumur*, qui a étudié cette propriété , l'a trouvée & beaucoup plus étendue , & beaucoup plus variée , en un mot beaucoup plus surprenante qu'on ne pensoit.

Pour aimer une Aiguille de Bouffole, un Couteau, &c. on les fait toucher à une pierre d'Aiman , en les conduisant le long de cette pierre selon la ligne qui joint ses deux Poles , il n'en faut pas davantage. Il est étonnant que le Fer ait acquis une nouvelle vertu par le simple contact de l'Aiman, mais il l'est encore plus que ce contact ne soit pas nécessaire , non pas même l'Aiman , & que le Fer s'aimante uniquement par d'autre Fer. C'est ce qui arrive à chaque moment dans des Boutiques , où l'on n'y fait pas d'attention ; presque tous les Outils dont les Ouvriers se servent pour couper ou pour percer le Fer à froid , Ciseaux, Burins, Poinçons, &c. se sont aimantés, ils attirent la limaille de Fer, dès qu'on les en approche , ils s'en chargent & s'en couvrent, & quelquefois enlèvent de petits Clouds, comme s'ils avoient été touchés par un Aiman mediocre.

Tous ces Outils ont été trempés , mais *M. de Reaumur* s'est bien assuré par des expériences que la trempe ne leur a pas donné cette vertu , ils ne la tiennent que de ce qu'ils ont travaillé sur le Fer. Un Poinçon ou un Ciseau sont aimantés par le premier coup de Marteau qu'on leur donne sur un morceau de Fer, un second, un troisième coup

coup les aimantent encore mieux, mais cela a des bornes, après quoi ils n'acquièrent rien de plus.

Il faut que le Fer sur lequel ils ont travaillé ait été froid, & même ils perdroient sur le Fer rougi au feu la force attractive qu'ils auroient prise sur le Fer froid.

Ils n'en prennent qu'une très-foible sur d'autres matières, telles que le bois, la pierre, le Cuivre.

Ils en prennent aussi un peu par de simples coups de Marteau donnés à vuide.

Ils la perdent de la même façon, & même celle qu'ils auroient prise en travaillant sur le Fer, ou en touchant un Aiman foible.

Les Outils qui avec une même masse ont une figure plus allongée, s'aimantent mieux, les Poinçons, par exemple, mieux que les Ciseaux.

Tout cela est constant par des expériences exactes de *M. de Reaumur*, autant répétées ou variées qu'il l'a fallu.

Tous les Physiciens reconnoissent autour de l'Aiman un Tourbillon de matière magnetique, qui a deux Poles où la matière est beaucoup plus serrée. Nous avons dit en 1717*. combien ce Tourbillon est sensible. On reconnoît d'ailleurs le Fer pour un Aiman imparfait. *M. de Reaumur* fait consister cette imperfection, en ce que quoi qu'il circule beaucoup de matière magnetique au dedans & au dehors du Fer, elle n'y a pas un cours régulier, qui forme un Tourbillon bien construit à la manière de celui de l'Aiman. Le Tourbillon magnetique du Fer, au lieu de deux

A 2

Poles

4 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

Poles uniques, en a un grand nombre placés çà & là sans ordre. Et comme la vertu attractive de l'Aiman vient de la régularité de son Tourbillon, il ne faut pour changer à cet égard le Fer en Aiman, que rendre son Tourbillon régulier.

C'est ce que peuvent faire de simples coups de marteau, l'ébranlement qu'ils causeront à toutes les parties de la masse forcera la matière magnetique qui la penetre & y circule à prendre un autre cours, toute la merveille est que cet autre cours soit justement celui qu'il faut. Pour cela on doit concevoir qu'il s'en falloit bien peu qu'il ne le fût, que la cause generale qui fait circuler la matière magnétique dans le Fer, tend par elle même à l'y faire circuler aussi régulièrement que dans l'Aiman, qu'elle n'en est détournée que par quelque legere opposition qui vient de la structure interieure du Fer, & qu'elle profite du moindre secours pour reprendre sa régularité naturelle. Aussi le Fer ne prend-il qu'une très-foible vertu par les simples coups; aussi la perd-il de même, le Tourbillon se retrouve dérangé.

Mais si un Outil d'acier coupe ou perce du Fer, il a pour s'aimanter un grand avantage, outre celui qu'il peut tirer des percussions. Il fait sortir par son action, il exprime du Fer de la matière magnetique qui se joignant à la sienne propre, augmente la force qu'elle avoit pour se mettre en Tourbillon régulier.

Si le Fer sur lequel l'Outil travaille est rougi au feu, la matière magnetique n'est plus exprimée du Fer, parce que ses pores
étant

Étant dilatés par le feu, elle y circule avec une entière liberté. Peut-être même celle de l'Outil passe-t-elle dans le Fer rouge, à cause de la facilité plus grande qu'elle trouvera à s'y mouvoir, ce qui est précisément le contraire de ce qu'il faudroit pour aimanter l'Outil.

Les Outils d'une figure allongée s'aimantent mieux, parce que pour être aimantés, il faut qu'ils aient leurs Poles vers leurs deux bouts, or plus ces bouts sont éloignés l'un de l'autre, la masse étant la même, plus le lit, pour ainsi dire, où coule la matière magnetique est serré, & plus par conséquent elle prend de force en y coulant.

Une experience que M. de *Reaumur* fit par hazard, lui prouva bien la communication des Tourbillons de deux morceaux de Fer entre eux; & l'augmentation de force que cette communication cause au Tourbillon le plus foible. Il essayoit la vertu de quelques Outils aimantés par le travail, il étoit tout proche d'une Enclume, & il y posoit les petits morceaux de Fer qu'il faisoit attirer & enlever par ces Outils. Il s'apperçût que quand il ne les posoit pas sur l'Enclume, ils n'étoient plus attirés, ni enlevés, qu'il leur en falloit substituer de moins pesants, & que cela arrivoit même, mais avec moins de difference, lorsqu'ils étoient posés sur quelque morceau de Fer moins gros que l'Enclume. Le Tourbillon de l'Enclume s'unissoit donc à celui des Outils, & le fortifioit. Nous avons rapporté quelque chose de semblable en 1717 à l'endroit cité.

Une vûe fournie par des experiences en fait naître d'autres qui demandent des experiences.

6 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

riences nouvelles, & il n'y auroit à craindre que de ne pas finir si on vouloit tout suivre jusqu'au bout. M. de *Reaumur* conçut que puisqu'il ne manquoit autre chose au Fer pour être Aiman, sinon que ses differens Tourbillons se réunissent pour n'en faire qu'un, qui alors auroit necessairement ses deux Poles, & n'en auroit que deux, ce pourroit être un moyen de parvenir à cet effet que de tourmenter le Fer, de le secouer, de l'agiter interieurement, en le pliant & le repliant diverses fois. Il le fit sur une verge de Fer qui n'avoit que la grosseur requise, & il vit qu'étant cassée à l'endroit qui avoit été plié & replié, les deux bouts de la cassure attiroient de la limaille, s'en chargeoient, & enfin étoient mieux aimantés qu'ils ne l'eussent été par un Aiman mediocre. Voilà du Fer aimanté par lui-même.

Les deux bouts qu'avoit la verge avant que d'être cassée ne sont point aimantés, il n'y a que les deux bouts de la cassure qui le soient. C'est-là que les differens Tourbillons ont été forcés à se réunir, parce que des parties comprimées ont chassé d'entre leurs interstices la matière magnetique, & que d'autres qui se sont écartées les unes des autres l'ont reçue.

Un fil de Fer trop menu ne s'aimante presque pas dans sa cassure. La matière du Fer a été trop également comprimée par les plis & replis, & les Tourbillons sont demeurés tels qu'ils étoient.

De plus grosses verges s'aimantent mieux, mais non pas dans l'exacte proportion de leur grosseur.

Il faut que les deux bouts cassés ayent une certaine longueur. Un bout trop court ne se feroit pas aimanté. Cela revient à ce qui a déjà été dit.

Le Fer le plus doux est celui qui s'aimante le mieux par cette operation. Il se laisse mieux plier & replier.

Il ne faut pourtant pas qu'il l'ait été trop. Un trop grand nombre de plis & de replis lui fait perdre la vertu acquise par un nombre suffisant. Cela revient aux coups de Marteau dont on a parlé.

La vertu acquise par cette operation s'affoiblit peu-à-peu, & quelquefois ne dure qu'un jour. Apparemment les parties du Fer se remettent par leur ressort dans leur premier état. Elles ne s'y remettent pas soudainement, parce qu'elles ont à vaincre le nouveau cours que la matière magnetique a pris.

Il étoit naturel de juger que si après avoir cassé une verge par cette operation, on en prenoit une des deux parties, & pour plus de commodité la plus grande, dont par conséquent un bout seroit aimanté, & qu'on recommençât l'operation sur cette partie en la pliant & repliant, le bout aimanté viendroit à l'être encore mieux. C'est aussi ce que M. de *Reaumur* pensa, & dont il fut pleinement assuré par l'experience. Le bout aimanté en fut quatre fois plus fort, la verge ayant été tourmentée en huit endroits differens.

Il faut bien remarquer que ces huit endroits avoient été pris entre le milieu de la verge, & le bout aimanté. M. de *Reaumur*

s'avisa de prendre de l'autre côté les endroits où il plioit & replioit , le bout non aimanté qui étoit de ce côté-là s'aimanta à mesure que les plis & replis se repetoient , l'autre s'affoiblissoit en même temps , & enfin presque toute sa vertu passa dans le bout qui d'abord n'en avoit aucune. Cela n'arrive pourtant pas toujours si juste , on ne fait souvent que diminuer la force du bout aimanté d'abord , sans en donner autant à l'autre.

Si on prend une verge de Fer , & qu'on la tourmente d'abord par son milieu , ensuite de part & d'autre de ce milieu à de petites distances égales , les deux bouts ne sont pas sensiblement aimantés , ils ne viennent à l'être que quand les plis & replis ont été faits environ au tiers ou au quart de la distance qui est entre le milieu , & chaque bout ; encore sont-ils beaucoup plus foiblement aimantés que si l'opération n'avoit regardé qu'un seul des deux , c'est-à-dire que la verge n'eût été tourmentée que de son côté. M. de *Reaumur* a poussé encore plus loin ses expériences sur cette matière , & l'on trouve toujours des phénomènes singuliers , extrêmement délicats , sujets à de grands changemens par de légers changemens de circonstances. Il n'est pas impossible d'en entrevoir les causes physiques , mais il seroit du moins très-difficile de les mettre dans une assez grande évidence. Il faut que dans ces sortes d'occasions la Raison relâche un peu de sa rigueur ordinaire.

La grande facilité du Fer à s'aimanter est prouvée depuis assez long-temps par l'expérience des Pincettes , qui ayant demeuré pen-

pendant un Eté posées verticalement & immobiles dans un coin de Cheminée, se trouvent aimantées desorte que leur bout inferieur attire la pointe Meridionale d'un Aiguille de Boussole, & le bout superieur la pointe Septentrionale. M. de *Reaumur*, qui a repeté cette experience, & observé les circonstances necessaires pour la rendre sûre, au lieu qu'on la croyoit incertaine, abrege bien le temps qu'il faut à une barre ou verge de Fer pour s'aimanter. Je dis *barre* ou *verge*, parce qu'il a trouvé que le Fer dont on fait les Pincettes est le moins propre de tous à ce qu'on attend, & que d'ailleurs il suffit d'avoir un Fer long, & qu'il vaut mieux qu'il soit tout droit. Il faut tenir toujours ce Fer verticalement; si on en presente le bout inferieur à la pointe Meridionale de l'Aiguille, on voit qu'il attire cette pointe, & si on baisse la barre de Fer toujours verticale jusqu'à ce que son bout superieur se presente à la même pointe de l'Aiguille, il la repoussera. Ce sera la même chose renversée, si c'est le bout superieur que l'on presente le premier. Ce n'est pas encore là la merveille. Mais si cette barre ainsi aimantée, & qui a acquis deux Poles, on la retourne de haut en bas, ce qui ne demande qu'un instant, & qu'on presente son bout devenu inferieur à la pointe Meridionale de l'Aiguille, il l'attirera, au lieu qu'auparavant il la repoussoit, on voit assés quel sera le reste du phenomene. Voilà donc les Poles de la barre changés en un instant, & apparemment on n'eût pas cru qu'un Tourbillon régulier bien formé

10 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
est pû se renverser en sens contraire avec
tant de facilité & de promptitude.

La necessité que la situation de la barre
soit verticale, semble prouver que le cours
de la matière magnetique dans le grand
Tourbillon qu'elle forme autour de la Ter-
re est plus vertical qu'horizontal, mais ce
seroit là un point à examiner plus à fond.
La Philosophie auroit lieu d'être bien con-
tente de son travail, si elle avoit seulement
découvert tous les phenomenes de l'Aiman.

SUR LA LUMIERE DES DAILS.

* **L** Es Dails sont une espece de Coquilla-
ge dont nous avons parlé en 1712 †
Pline leur a donné une lumière qu'il appel-
le *miraculeuse*, ils luisent dans l'obscurité,
& d'autant plus qu'ils sont plus frais, ils
luisent dans la bouche de ceux qui les man-
gent, dans les mains de ceux qui les tou-
chent, les gouttes qui tombent de leurs
corps, soit à terre, soit sur les habits, sont
luisantes. M. de *Reaumur* qui en 1712 a-
voit nié cette propriété aux Couteliers, au-
tre Coquillage assés semblable aux Dails,
veut bien avoir tort à l'égard de *Pline*, par-
ce qu'il avoue qu'il l'auroit niée aux Dails,
à qui il ne la connoissoit point alors. S'il
a fait une faute, il la diminuë mieux en l'aug-
mentant volontairement, qu'en tâchant de
la diminuer avec art, & par des détours.

Tout

* Voyez les M. p. 287. † P. 18. & suiv.

Tout ce que *Plin*e a dit des Dails a été vérifié par M. de *Reaumur*. Differens Poissons étant pourris, & pareillement des chairs d'Animaux terrestres, luisent dans l'obscurité; c'est tout le contraire des Dails, il faut qu'ils soient frais, & leur lumière s'affoiblit à mesure qu'ils le sont moins, & cesse quand ils sont corrompus. Il n'y a que leurs chairs, & non leur Coquille, qui soient lumineuses, mais elles le sont, & le sont également dans toute leur substance.

Leur lumière tient à leur humidité, elles n'en ont plus quand elles sont sèches, mais on la fait revivre, quoi-que plus foible, quand on les humecte d'eau simple, ou d'eau salée. L'eau de vie les éteint sur le champ.

L'humidité qui se détache du corps des Dails est si luisante, que M. de *Reaumur* qui en avoit touché, ayant ensuite lavé ses doigts dans de l'eau, cette eau parut dans l'obscurité comme du lait en plein jour.

Il soupçonne que des Dails pourris, mêlés avec d'autres frais, les avoient empêchés de paroître lumineux.

Peut-être aussi, comme il le conjecture, y a-t-il des temps pour la lumière des Dails, & ce seroient ceux de quelque fermentation, comme celle qui arrive dans les temps destinés par la Nature à l'accouplement des Animaux. Il confirme cette pensée par l'exemple des Vers luisans. Ils ne le sont que dans les temps chauds, qui sont apparemment ceux de leur accouplement.

Il est bon de savoir que les Vers luisans sont les femelles de l'espece, les Mâles ne sont point luisans, & ils ont des ailes. Un

jour que M. de *Reaumur* tenoit une femelle dans sa main, un Mâle vint la trouver, & ils s'accouplèrent. La lumière de la femelle est un petit Phare qui guide le Mâle au lieu où elle est. Des expressions poétiques que nous employons dans le langage de l'Amour, seroient employées au propre par ces Insectes.

SUR LA RONDEUR DES PIERRES
ET DES CAILLOUX.

* **L** manquoit au Système de la formation des Pierres, donné par M. de *Reaumur* en 1721 †, l'explication de la rondeur qu'affectent certaines especes de Pierres, & principalement les Cailloux. On n'entend point par-là une rondeur parfaite, ni approchante, elle est très-rare, ce n'est qu'un arrondissement grossier, des contours toujours courbes, & differens en différentes parties, des angles émoullés & abatus, jamais de lignes droites qui terminent des surfaces.

Si, comme il a été dit en 1721, on pouvoit supposer que tous les Cailloux ont roulé dans des Rivières, ou dans la Mer, cette figure n'embarasseroit pas, mais la supposition seroit trop violente, on trouve des Cailloux ronds dans des lits de Pierre d'une grande profondeur, & quelque grands bouleversemens qui soient arrivés
autre-

* V. les M. p. 391, † V. l'Hist. de 1721, p. 15. & suiv.

autrefois sur la Terre, il est trop difficile de concevoir ni qu'ils ayent produit les figures de tous ces Cailloux sans exception, qui sont maintenant si ensevelis, ni qu'il ne se soit point formé de Cailloux depuis ces bouleversemens. Il est sûr qu'il se forme encore aujourd'hui des Crystaux & des Pierres. Tout est encore également animé, également vivant.

On a vû en 1721 * quelle étoit la pensée de M. de *Mairan* sur des Pierres, rondes aussi dans le sens que nous avons dit, trouvées à *Breuil-pont*. L'idée sera vraie pour des cas particuliers comme celui dont il s'agissoit; des Pierres se seront formées comme des Crystaux à des Voûtes de Grottes souterraines, le pedicule qu'on leur a remarqué étoit fort favorable à cette hypothèse, mais cela ne peut pas être commun. Les Congelations faites à des Voûtes prennent ordinairement des figures plus allongées que ne sont celles des Cailloux, ce sont souvent des Cylindres, & quelquefois des Tuyaux creux. Il auroit fallu une infinité de Voûtes renversées pour faire un grand nombre de lits très-étendus où se trouvent les Cailloux & les Pierres rondes, il auroit fallu encore qu'elles se fussent accordées malgré la violence du bouleversement à se mettre dans une même disposition horizontale, & enfin une Voûte ne fourniroit qu'un lit de Cailloux, au lieu qu'on en voit plusieurs étendus les uns sur les autres, sans compter la grande profondeur, où ils sont assés souvent.

A 7

Les

14. HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

Les nouvelles lumières que nous avons dit en 1721 qu'il valoit mieux attendre sur ce sujet, font venues presque d'elles-mêmes s'offrir à M. de Reaumur, & se sont liées très-naturellement avec son *Système general* sur la formation des Pierres. Dans un banc de Sable que l'on coupoit auprès de la maison de Campagne, il a trouvé une très-grande quantité de petits tas de ce même Sable, distingués du reste par être liés, plus compactes, & arrondis presque tous irrégulièrement. Il les a nommés des *Marrons de Sable*, à l'exemple des Ouvriers qui appellent *Marrons* de Glaïse de semblables corps, qu'ils trouvent dans la Glaïse. Ces *Marrons* de sable étoient de toutes sortes de grosseurs, depuis celle d'un Pois jusqu'à celle de la Tête, & quelquefois plus. Ils étoient de tous âges entr'eux, & souvent même leurs parties étoient entr'elles de tous âges, l'âge étant réglé sur ce que le Sable devient Pierre, & la Pierre Caillou. Plusieurs, sur-tout les gros, n'avoient qu'une enveloppe extérieure de Sable, après quoi ils étoient Pierre & déjà Caillou dans le centre. La couleur generale du banc de Sable étant verdâtre, elle s'alteroit dans les *Marrons* selon le degré de leur transformation, elle s'éclaircissoit & blanchissoit lorsqu'ils étoient Pierre, & brunissoit lorsqu'ils étoient devenus Caillou. Le suc pierreux dont nous avons parlé est par-tout ici trop reconnoissable, & il n'est pas besoin d'expliquer en détail comment il a produit ces phenomenes.

Ce qui acheve bien la preuve, c'est qu'au-dessus de ce banc de Sable, il y en avoit un

au-

autre d'un Sable plus gros & plus sec, tout rempli de Cailloux bien formés & parfaits, d'une infinité de figures différentes, & dont toutes les figures avoient leur semblable dans quelque Marron de Sable du banc inférieur. Ces Marrons étoient donc destinés à devenir Cailloux.

Si le Suc pierreux, on n'examine point d'où il vient, ni quel est son cours, trouve un banc de Sable où il puisse couler & se répandre également de tous côtés & en tous sens, il liera également tous les grains de Sable, & en fera un tout qui fera une masse ou un banc de Grès. Mais toute uniformité exacte est très-rare, & peut-être impossible dans la Nature, le banc de Grès ne sera pas lui-même bien uniforme. Ce qui empêchera qu'il ne s'en forme un le plus souvent, c'est que les grains du banc de Sable ne seront pas assés régulièrement disposés entr'eux, mille hazards les auront ferrés en quelques endroits plus que dans d'autres, les auront séparés en differens tas, auront causé d'assés grands vuides, sur-tout si le banc n'est pas de Sable pur, & qu'il soit mêlé de terre, ce qui est commun. Le suc pierreux aura donc dans ce banc de Sable un cours inégal, tantôt plus, tantôt moins facile. Et comme ce Suc n'est, selon M. de *Reaumur*, qu'un Sable prodigieusement fin porté dans de l'eau, qui le soutient tant qu'elle a tout son mouvement, & ne le laisse tomber que quand elle se rallentit, il ne se déposera qu'aux endroits où l'eau rencontrera quelques obstacles, c'est-à-dire, dans

dans ceux où elle fera arrêtée par des tas de Sable & par des Marrons.

L'eau arrêtée par un Marron, de quelque figure qu'il soit, se partage pour couler à l'entour depuis le point le plus élevé de ce corps jusqu'au plus bas diametralement opposé, & cela parce que cette eau est encore plus visqueuse que toute autre, & par-là est plus disposée à suivre le contour des corps; par ce mouvement elle arrondit nécessairement le Marron autant qu'il peut l'être, & en abat les angles aigus.

Puisque l'eau chargée du suc pierreux coule du dessus du Marron jusqu'au dessous, c'est principalement en ce sens qu'elle le doit arrondir, & s'il est plat & fort étendu dans le sens horizontal, elle le doit laisser à peu près tel qu'il étoit, en arrondissant seulement ses bords. Aussi M. de *Reaumur* a-t-il eu le plaisir de voir, conformément à cette conjecture, que tous les Marrons d'une figure de Gâteau peu relevé par le dessus & par le dessous étoient dans le banc de Sable couchés horizontalement sur le plat. Cela ne recevoit presque nulle exception, malgré la grande diversité des circonstances qui auroient pû déranger la Règle. On voit que tout sert à qui sait observer.

Les plus gros d'entre les Marrons de Sable, les plus renflés, ceux qui approchent le plus de la figure de Boule, sont ceux où l'on trouve le plus ordinairement des cavités, à peu près dans le milieu. Si elles étoient vuides, c'étoient apparemment des cre-

crevasses, des creux qui s'étoient trouvés naturellement dans le banc de Sable. Si elles étoient pleines, elles l'étoient d'un sable détaché, tout pareil à celui du reste du banc; le Suc pierreux n'avoit point encore pénétré jusqu'à ces grains pour les lier. S'il y eût pénétré, mais seulement en une quantité mediocre, il auroit petrifié les grains & les auroit blanchis, sans les lier tous ensemble, & en faire une masse.

Mais si le banc au lieu d'être de Sable, avoit été de Craye, ou de Marne, on auroit trouvé dans la cavité des pierres une espece de farine pierreuse, telle que celle qui remplit le milieu des Pierres de *Breuilpont*.

Supposé que l'on soit ici sur la voye de la formation des Pierres & des Cailloux, on pourra aller à celle des Metaux, l'Analogie mene loin. Il ne faudra que concevoir une eau chargée de Sucs metalliques, au lieu qu'elle l'étoit de Sucs pierreux, & donner à cette eau des terres convenables qu'elle penetrera. La rondeur des grains metalliques s'expliquera par les principes établis, mais les esperances les mieux fondées doivent encourager à découvrir, & non pas faire croire qu'on a déjà découvert.

SUR LE PHOSPHORE DU BAROMETRE.

* **L**A Lumière qui paroît au haurde quelques Barometres agités dans un lieu obscur, est connue depuis cinquante ans, elle a assés exercé les Physiciens, & principalement M. *Bernoulli*, qui le premier a approfondi ce phenomene†, & éclairé tous ceux qui en ont traité après lui. M. *du Fay* a recueilli soigneusement l'Histoire de tout ce qui a été écrit sur ce sujet, & ces sortes d'histoires, outre qu'elles plaisent naturellement, parce qu'elles representent les differens efforts de l'Esprit humain, instruisent par les diverses vûes qu'elles fournissent, soit en faisant voir l'inutilité des unes, soit en indiquant ce qui manqueroit aux autres.

Il restoit encore quelque incertitude sur la manière de rendre le Barometre lumineux, ou, pour mieux dire, sûrement lumineux, & M. *du Fay* l'a apprise d'un Vitrier *Allemand*, à qui il en donne toute la gloire, qu'il est pû sans beaucoup de peril enlever à un homme obscur, & éloigné. Les conditions absolument nécessaires sont que le Tuyau soit bien sec, le Mercure bien net, & bien purgé d'air. Elles n'ont rien de difficile dans la pratique.

La moindre humidité dans le Tuyau gâteroit tout, mais ce n'est, selon les obser-
va-

* V. les M. p. 422. † V. l'Hist. de 1700. p. 7. & celle de 1701. p. 1.

vations de M. *du Fay*, qui a tourné ces expériences de bien des sens, que l'humidité qui seroit au haut & dans le vuide du Tuyau, où la lumière doit paroître. Hors de-là le Tuyau peut être humide sans inconvenient. On le nettoye aisément avec du Cotton attaché au bout d'un fil de Fer.

Il faut que le Mercure soit bien net, mais cela ne demande nul soin penible. Il n'y a qu'à faire passer le Mercure par un Cornet ou Entonnoir de papier, dont l'embouchure soit fort étroite, il y dépose suffisamment ses impuretés.

Il faut que le Mercure soit bien purgé d'air. Il n'y a encore là nulle operation recherchée. Le Vitrier *Allemand* verse d'abord dans son Tuyau un tiers du Mercure qu'il doit employer, ensuite il le chauffe doucement & par degrés, & en le remuant avec un fil de Fer, il aide à sortir aux bulles d'air que la chaleur pousse hors du Mercure. Après cela il verse un second tiers, qu'il traite de même, & enfin il verse le troisième auquel il ne fait rien. La purification des deux tiers suffit pour le tout.

M. *du Fay* ne s'est point apperçu qu'un différent degré de chaleur donné au Mercure, produisît de différence sensible dans la lumière.

Il a remarqué que si on chauffe le Mercure dans quelque vaisseau, pour le verser de là dans le Tuyau du Barometre, on manque la lumière. Il faut que dans ce passage, quoi que court, le Mercure ait repris de l'air, & à peu-près autant qu'il en avoit.

Il a remarqué aussi que le Mercure bien purgé

purgé d'air , ne diminuë pas de volume. Apparemment la grande pesanteur de ses parties les ferre les unes contre les autres autant qu'elles peuvent l'être , & leur rondeur ne leur permet que certains interstices déterminés , qui ne peuvent diminuer. Quand l'air est chassé de ces interstices , la matière subtile prend toute sa place , sans que les parties en soient plus en état de se rapprocher. Il se feroit des vuides , si le vuide étoit possible. Il y a tout lieu de croire que l'expulsion de l'air ne sert au phenomene de la lumière que parce qu'il est remplacé par la matière subtile.

S'il ne reste que fort peu d'air , la lumière ne laisse pas de paroître , mais moins vive , & entrecoupée. Les bulles d'air elles-mêmes deviennent lumineuses , l'abondance & la force de la matière subtile les surmonte.

Le diametre du Tuyau est indifferent. La lumière s'étend davantage dans un plus gros Tuyau sans s'affoiblir. *M. du Fay* avoit construit exprès pour ce phenomene des Tuyaux dont le haut s'élargissoit en deux ou trois Olives de verre.

La lumière de ces Barometres ne s'affoiblit point par le temps. Ce sont , comme nous l'avons dit ailleurs , des Phosphores éternels.

Il seroit inutile de repeter des explications Physiques données dans les endroits cités , ou faciles à appliquer ici. Il n'y étoit question que d'une methode sûre pour rendre les Barometres lumineux. Ceux qui auront cette propriété seront les meilleurs pour l'usage , sur-tout pour l'usage des Observateurs.

teurs exacts, puisqu'ils seront les plus vuides de tout air grossier.

*SUR LES PIERRES DE FOUDRE,
les Yeux de Serpent, & les Crapaudines.*

NOUS mettons ensemble pour plus de brièveté, & à cause de quelques rapports éloignés, des Pierres qui n'ont guere rien de commun que le nom de *Pierres figurées*, les Pierres de Foudre d'un côté, & de l'autre les Yeux de Serpent, & les Crapaudines.

Ces grands changemens de Mers & de Continens que M. de *Jussieu* croit avoir amené ou laissé dans nôtre *Europe* des ossemens d'Animaux aujourd'hui fort étrangers, se confirment tous les jours, les Yeux de Serpent & les Crapaudines en font une nouvelle preuve. Ce sont des dents petrifiées d'un Poisson des Côtes du *Bresili* qu'on y appelle le *Grondeur*. Il a deux sortes de dents, dont les plus petites, & qui apparemment servent à percer, sont les Yeux de Serpent, & les plus grandes, qui broient, sont les Crapaudines. Cela se reconnoît par l'exacte conformité des figures. Après la Machoire d'un Poisson de la *Chine*, trouvée aux environs de *Montpellier* †, il n'y a plus rien là de merveilleux; & si les Turquoises sont des Os d'Animaux, comme il a été dit en 1715 †, il n'est pas merveilleux non

* V. les M. p. 7. & 296. † V. l'Hist. de 1721, p. 1.
& suiv. † P. 1. & suiv.

non plus que les dents du Grondeur soient devenues des Pierres précieuses du second ordre.

Ces dents ne sont pas la dent entière, ce n'en est que la Couronne, envelope & couverture ronde d'une Racine qui demeure attachée à la Machoire. Aussi les Yeux de Serpent & les Crapaudines ont-ils dans leur intérieur la même cavité qui se trouve dans cette partie des dents du Grondeur, & si on en voit qui ne l'ayent pas, elle a bien pu dans un long espace de temps se remplir d'une matière pétrifiée.

Il y a des Yeux de Serpent & des Crapaudines, qui se peuvent rapporter à des Dents de Dorade, Poisson qui se trouve dans nos Mers, & il est vrai qu'il y a moins de frais dans ce Système, mais M. de *Jussieu* ne croit pas qu'il suffise pour toutes ces sortes de Pierres, il y en a quantité dont la figure demande qu'elles appartiennent au Grondeur. On les trouve d'ailleurs dans les Minières, mêlées avec des parties d'Animaux certainement étrangers. Le Grondeur & la Dorade peuvent être deux especes d'un même Genre, quoi-qu'ils habitent differens Climats.

Les Pierres de Foudre n'ont rien d'Animal. Ce sont de véritables Cailloux qui ont une figure de Coin ou de fer de Flèche. Cette figure a fait juger aux anciens Grecs qu'elles étoient les armes de Jupiter tonnant, & qu'il les lançoit de ses mains avec la foudre. Cette opinion a passé, ou est née d'elle-même chés les Peuples du Nord, qui pour trouver ces Pierres en grande quantité

tité dans leurs Pays, ne les ont pas moins reverées. Ils croient même, quoi-qu'elles viennent de la foudre, qu'elles les en garantissent, & on a bien de la peine encore aujourd'hui à les en desabuser. Les *Chinois*, qui ne sont guere à portée de la contagion de ces idées, en ont pourtant d'assés semblables, & il n'est pas trop aisé de voir pourquoi cette superstition est si naturelle.

L'origine de ces Pierres est très-évidente & très-sûre, dès qu'on en voit de toutes pareilles taillées par les Sauvages de l'*Amerique*, pour fendre du bois, ou armer leurs flèches. Ils n'ont point de fer, & en frottant des pierres fort dures les unes contre les autres, ils font ces sortes d'Ouvrages qui leur sont absolument nécessaires, & n'y plaignent point le temps, dont effectivement ils ne manquent pas. Notre Continent a été habité anciennement par des Sauvages, & les mêmes besoins, la même disette de Fer, leur ont inspiré la même industrie. Dans la suite leurs Outils devenus inutiles ont été ensevelis en grande quantité dans la terre, ils s'y sont mieux conservés que s'ils eussent été de métal, car la rouille ou le verdet les auroit peut-être consumés, ou défigurés, & voilà ces Pierres tombées avec la foudre.

Si les autres Pierres figurées sont des monumens de grandes révolutions physiques, celles-ci sont le monument d'une grande révolution qu'on peut appeller *morale*, & la comparaison du Nouveau Monde avec l'Ancien sert également à prouver l'une & l'autre espèce de révolution.

O B S E R V A T I O N
DE PHYSIQUE GENERALE.

M. De Montagnac Consul à *Lisbonne*, a écrit que l'on étoit fort étonné dans la Province des *Algarves* d'y voir en Décembre 1722 & au Mois de Janvier suivant les arbres verds & fleuris comme au Printemps, des Prunes & des Poires aussi mûres & aussi bonnes qu'au Mois de Juin, des Figues aussi grosses qu'en Avril & en Mai, & des Vignes qui avoient déjà des grappes de Verjus. La grande variété des mêmes Saisons doit quelquefois amener de ces fortes de miracles, & il est bon d'observer quelles peuvent être les extrémités & les bornes de cette variété.

Nous renvoyons entièrement aux Mémoires

* Les Observations de M. *Maraldi* pour l'année 1722.

* V. les M. p. 1.



ANATOMIE.

*SUR LES DEUX ESPACES
que l'Humeur Aqueuse occupe dans l'Oeil.*

* **L'**HUMEUR Aqueuse remplit dans l'Oeil tout l'espace que laissent entr'elles les deux Membranes, Cornée & Uvée. Cet espace est coupé en deux par l'Iris, production de l'Uvée ; desorte que la partie antérieure est entre la Cornée & l'Iris, la postérieure entre l'Iris & le Crystallin. Ces deux espaces ont été appellés, l'un *Chambre antérieure*, l'autre *Chambre postérieure* par M. Brisseau, fameux Professeur en Médecine à Doñay, qui a écrit sur ces matières.

Quand la question de la Cataracte membraneuse, ou glaucomatique a été agitée dans l'Académie†, ou dans le Public, M. Bisseau qui attaquoit l'opinion commune de la Membrane, a soutenu que de la manière dont se faisoit l'opération ordinaire de la Cataracte, & vû l'endroit où l'on perçoit l'Oeil ;

* V. les M. p. 54. † V. les Hist. de 1706. p. 15. & suiv. de 1707. p. 127. & suiv. de 1708. p. 47. & suiv. de 1712. p. 21. & suiv.

l'Oeil, il n'étoit pas possible que l'Aiguille n'allât dans la Chambre posterieure, & n'y abatît le CrySTALLIN, ou du moins ne le blessât, aussi-bien que l'Uvée, parce que cette Chambre est fort petite. Ceux du parti contraire se sont sauvés, en la supposant assés grande, & plus grande même que l'antérieure, ainsi que la representent de celebres Anatomistes.

C'est-là ce qu'a voulu éclaircir M. *Petit* le Medecin. Ces sortes de points de fait délicats, & peu sensibles, sont difficiles à décider. Que l'on coupe un Oeil en sa partie antérieure, l'Humeur aqueuse s'en écoule aussi-tôt, & l'on ne sait dans laquelle des deux Chambres elle étoit en plus grande quantité. Pour éviter cet inconvenient, M. *Petit* a fait geler des Yeux pendant le froid, car on fait depuis le commencement de ce Siècle que l'humeur aqueuse se gele. Il a pris des Yeux de differens Animaux, d'Homme, de Cheval, de Bœuf, de Mouton, de Chien, de Chat, de Loup, &c. il faut que le froid soit considerable, afin que l'Humeur aqueuse soit bien gelée, & qu'on en puisse exactement mesurer l'étendue en differens espaces.

La glace de la Chambre antérieure s'est toujours trouvée beaucoup plus épaisse que celle de la posterieure, & par consequent la Chambre antérieure plus grande que la posterieure, & l'on prévoit bien que cela aura suivi différentes proportions dans des Yeux d'Animaux de différente espece, & même dans ceux d'une même espece, quoiqu'avec moins de difference.

L'é-

L'épaisseur de la glace des deux Chambres ne donne pas leur inégalité de grandeur aussi juste & aussi facilement que nous semblons le dire ici, il s'en faut bien que ces espaces ne soient des parallelepipèdes, ou même des Solides rectilignes, ils sont curvilignes, & peu réguliers, desorte qu'il faut comparer les épaisseurs de la glace dans les endroits où elle est de part & d'autre la moins épaisse, & la plus épaisse, & en conclurre une épaisseur moyenne. Cela jette nécessairement M. *Petit* dans un détail curieux & assés neuf de ces parties de l'Oeil, tant dans l'Homme, qu'en plusieurs autres Animaux.

La glace de la Chambre postérieure n'est pas même aisée à appercevoir. Comme elle n'est qu'en fort petit volume, elle est noircie par l'Uvée qui est noire, & la termine; & à peine paroît-elle. Quand on coupe l'Oeil selon son axe, c'est-à-dire, selon une ligne qui passe par les centres du Crystallin & de la Cornée, ce qui est la section la plus propre à cette recherche, la glace se brise par petites parcelles qui s'échappent, & de plus le Scalpel, quelque tranchant qu'il soit, s'émousse, & entraîne avec lui des parties noires de l'Uvée, & des *Processus Ciliaires*, qui se mêlent avec la glace, & la cachent. Il faut de l'art pour la découvrir telle qu'elle est, & pure.

Si l'on ne prend pas les Yeux immédiatement après la mort, ils sont déjà flétris, parce que les Humeurs se sont évaporées à proportion du temps. L'Humeur aqueuse plus légère & plus volatile que la Vi-

trée, & d'ailleurs plus libre, puisque la Vitree est retenue dans une infinité de petites Cellules, s'évapore davantage, & c'est celle dont on a besoin ici.

Quand les Yeux sont gelés, ils sont fort tendus, eussent-ils été flétris auparavant, les Humeurs se sont dilatées par la gelée comme fait l'eau, parce que l'Air qu'elles contenoient, dispersé auparavant en plusieurs petites parcelles, & comprimé, s'est ramassé, & a eu plus de force pour se mettre au large. Il est à observer, en passant, que les Humeurs qui se gellent, s'évaporent assez considérablement, ce que l'on reconnoît par une diminution très-sensible de leur poids. Mais la dilatation des Humeurs nuit à la recherche de la capacité des deux Chambres. Il y a dans l'Oeil de l'Homme vingt fois plus d'Humeur Vitree que d'Aqueuse, on peut donc supposer que l'une a vingt fois plus d'air que l'autre, & par consequent vingt fois plus de force de dilatation. Il doit donc arriver que la Vitree en se gelant, usurpe une partie de l'espace qui appartenoit à l'Aqueuse dans la Chambre postérieure, & l'en chasse, & cela arrive en effet à tel point, qu'on ne trouve quelquefois plus de glace dans cette Chambre. M. *Petit* suit plus particulièrement les changemens que peut causer à la configuration respective des parties cette grande inégalité de dilatation entre l'Humeur Vitree & l'Aqueuse.

Malgré toutes ces difficultés, il n'a pas laissé de parvenir à la détermination qu'il cherchoit, en combinant les differens effets, en pesant les diverses circonstances, & en
pre-

prenant des milieux. Dans l'Homme la Chambre postérieure contient à peu-près le tiers de l'Humeur aqueuse. Le poids moyen de cette Humeur entière est de 4 grains, d'où il suit que la Chambre postérieure en contient 1 grain & $\frac{1}{3}$, & cette quantité est si petite, que la Chambre, qui a $5\frac{1}{2}$ lignes d'étendue, ne peut être que très-étroite, & par conséquent le raisonnement de M. *Brisseau*, qui a donné lieu à tout ceci, doit subsister dans toute sa force.

Il ne faut pas omettre une remarque curieuse, quoi que simplement accessoire. Dans les Yeux gelés le CrySTALLIN n'augmente point de Volume comme les Humeurs. M. *Petit* crut d'abord que le CrySTALLIN qui est compris entre la Vitree & l'Aqueuse, & ferré par elles de part & d'autre, lorsqu'elles se dilatent, & d'ailleurs incapable par sa texture d'une aussi forte dilatation que la leur, étoit toujours dans le même état & sous le même volume. Mais des CrySTALLINS gelés à part n'augmenterent pas non plus. Pourquoi leur air ne s'étoit-il pas dilaté, lorsque rien ne s'y opposoit ? Il en faut revenir au Systême general de la Gelée. Les parties propres d'une liqueur qui se gèle, perdent de leur mouvement, & par cela seul elles se rapprochent, & tiennent moins d'espace, peut-être aussi chacune se resserre-t-elle en elle-même; le volume total seroit donc diminué. Mais l'état où elles sont donne à l'Air qu'elles renferment la liberté de se réunir en grosses bulles & de se dilater, & de-là vient l'augmentation du volume total. Si les liqueurs sont de nature à ne se

point geler , leurs parties propres perdent assés de mouvement pour se rapprocher un peu, mais non pas assés pour permettre à l'air de se réunir, & de se dilater , & il arrive une petite diminution de volume. Le Crystallin est dans le cas de n'en avoir pas une qui soit sensible, ou peut-être de n'en avoir aucune, sa substance est trop tenace , trop visqueuse, & les particules d'air éparées ne peuvent s'y rassembler. Cependant il s'en est trouvé quelques bulles , mais très-petites, sous la membrane de quelques Crystallins dégelés, mais il y a apparence qu'elles ne s'étoient formées que lorsqu'ils s'étoient dégelés, ils étoient devenus fort mous , ce qui marque toujours quelque desunion de parties. Plus la Physique considere les choses en petit , plus elle a besoin de multiplier, & de raffiner ses vûes.

SUR LA FORMATION DES HYDATIDES.

LE sujet que nous allons traiter, prouvera la grande difference qu'il y a entre appercevoir les choses d'une vûe generale & confuse , ou d'une vûe distincte, & qui se porte à toutes les parties & à tous les détails de l'objet. De la première manière on pourroit avoir rencontré le Vrai , & cependant ne tenir rien, car la difficulté de l'application à toutes les particularités pourroit être si grande , qu'on seroit obligé de lâcher prise, & d'abandonner ce Vrai qu'on auroit attrapé d'abord..

Les

Les Hydatides sont des Vésicules pleines d'une eau allée claire, & telle que la Lympe du corps Animal. Elles sont le plus communément rondes, de différentes grosseurs depuis celle d'un Pois jusqu'à celle d'un Oeuf de Canne, & quelquefois fort au de-là, elles ont une envelope de même couleur que leur eau, très-uniforme, sans fibres, qui se puissent détacher les unes des autres, comme celles d'une membrane; quelquefois il n'y a pas pour une envelope, il y en a deux, trois, & jusqu'à six ou sept, toutes de même nature.

Les Hydatides sont ordinairement séparées les unes des autres, quelquefois elles sont comme en Grappe, plusieurs étant attachées à une Tige commune.

Elles sont communément renfermées en grand nombre sous les premières envelopes des principaux Viscères, tels que le Foye, la Rate, &c. là elles nagent dans une liqueur de la même nature que celle qui est contenue dans chaque Hydatide. Outre le Sac membraneux qui appartient au Viscère, elles ont quelquefois une autre envelope commune de même nature que celle de chaque Hydatide particulière. Quelquefois les Hydatides ne sont renfermées dans aucune envelope commune, mais répandues confusément dans la cavité du ventre.

Elles sont quelquefois en nombre prodigieux.

Sur ces faits on a imaginé deux différens Systèmes. Quelques Physiciens ont cru que les Hydatides étoient des Glandes qui s'étant obstruées & engorgées de la liqueur qu'elles de-

devoient filtrer , avoient perdu leurs fonctions , & s'étoient détachées de leurs places naturelles. Mais cette idée n'est guere soutenable. Les Hydatides , qui auroient été Glandes , seroient donc squirreuses , dures , de différentes figures irrégulières , il y resteroit au moins quelques traces des vaisseaux sanguins , qui par un entrelasement merveilleux formoient auparavant leur substance ; rien de tout cela ne paroît dans les Hydatides.

D'autres Physiciens ont eu recours avec beaucoup plus d'apparence aux Vaisseaux Lymphatiques qu'ils ont supposé s'être rompus. En effet , sous la première envelope des Visceres principaux , lieu ordinaire des Hydatides , est un Rézeau tout formé de Vaisseaux Lymphatiques , & les Hydatides ne sont pleines que de Lympe , & nagent dans de la Lympe. La structure des Vaisseaux Lymphatiques est d'ailleurs favorable. Ce sont des canaux tels que dans des intervalles assés petits les côtés du canal se rapprochent & font un demi-étranglement du Vaisseau , qui par-là ressemble en quelque sorte à un Chapelet. Les grains de ce Chapelet ont paru fort propres à devenir des Hydatides , pourvû qu'ils vinssent à se séparer les uns des autres , c'est-à-dire que le vaisseau se rompît dans tous ses étranglemens , ce qu'on pouvoit aisément attribuer à un trop grand amas de Lympe. C'est-là une vûë generale , qui , selon M. *Morand* , renferme le Vrai , mais qui ne peut le soutenir & le défendre , à moins que d'être beaucoup plus approfondie. Car l'en-

velo-

velope particulière de chaque Hydatide seroit donc membraneuse, puisqu'elle auroit appartenu à un Vaisseau Lymphatique, or elle n'est point membraneuse. De plus, & ceci est encore beaucoup plus considérable, que l'on suppose tant qu'on voudra le Chapelet rompu, & tous ses grains séparés, ils avoient chacun deux ouvertures vis-à-vis l'une de l'autre, comment se sont-ils fermés de ces deux côtés?

Si l'on veut que la Lymphe ne forme les Hydatides qu'après s'être épanchées hors de ses Vaisseaux, comment les formera-t-elle distinctes, séparées, arrondies, avec des envelopes?

Voici ce que M. *Morand* conçoit pour lever toutes les difficultés. A chaque demi-étranglement d'un Vaisseau Lymphatique sont de part & d'autre deux Valvules semblables pour la figure aux Valvules Sigmoïdes du Cœur. Ce sont deux demi-Capuchons attachés par leur moitié plate à la paroi intérieure du Vaisseau, & qui, si la liqueur coule d'un certain sens selon l'axe du Vaisseau, s'en remplissent; & l'arrêtent en partie dans leur cavité; si elle coule du sens contraire, elle ne fait qu'aplatir le Capuchon & le presser contre la paroi du Vaisseau, & alors le cours de la liqueur est entièrement libre. C'est en ce sens qu'est sa direction naturelle, & c'est pour l'empêcher de rétrograder de l'autre que les Valvules sont faites. Si par quelque cause que ce soit les Valvules ou Poches valvulaires se remplissent de liqueur contre l'ordre naturel, & ne s'en vidant pas, les Poches s'arrondissent autant qu'il

qu'il est possible, & les parties les plus épaissies, les plus filamenteuses du petit amas de Lymphe qui y séjourne sont poussées par les parties plus sereuses vers la circonference, ainsi qu'il arrive à du Lait qui bout, ou à du Sang reposé dans la Palette. Voilà autant d'Hydatides rondes, & avec des envelopes, qu'il y aura de Poches valvulaires dans le cas requis, & il y en peut avoir un très-grand nombre, à cause que les Vaisseaux Lymphatiques sont en grande quantité, qu'ils ont chacun plusieurs étranglemens, & que chaque étranglement a deux Poches.

Toutes les Poches valvulaires d'un Vaisseau Lymphatique étant gonflées, il est possible qu'il se conserve un petit filet de Lymphe qui coule selon l'axe du Vaisseau entre toutes ces Poches; mais il est possible aussi que par le vice general de la Lymphe, & par le retardement de son cours, ce filet ne coule plus, que la liqueur s'épaississe, & devienne une tige assés solide où s'attacheront des Hydatides par leur envelope particulière déjà formée. Ce seront là les Hydatides en grappe.

Par la formation de l'envelope d'une Hydatide il est très-aisé d'entendre comment il s'en formera plusieurs. Il ne faut qu'un plus long séjour de la Lymphe dans son moule, ou un peu plus d'heterogenité entre ses parties. L'envelope la plus extérieure sera toujours la premiere formée.

Un amas d'Hydatides ainsi produites, renfermé sous la Tunique d'un Viscere, peut aisément grossir à tel point qu'il crevera cette Tunique, & alors les Hydatides étant
épan-

épanchées dans quelque cavité avec beaucoup de Lympe, cette Lympe pourra devenir une grande Hydatide, qui contiendra toutes les autres, c'est à-dire, qu'il s'y formera une enveloppe generale de la même manière dont les particulières se sont formées. Cette enveloppe generale est d'un diametre beaucoup plus grand que ne pourroit jamais être celui d'aucun Vaisseau Lymphatique dilaté, ce qui prouve fort pour le Systeme de M. *Morand*. Elle est plus molle que les enveloppes particulières, soit parce qu'elle est beaucoup plus grande & plus étendue, soit parce qu'elle n'a pas été produite dans un Moule aussi petit & aussi ferme.

Il se trouve quantité d'Hydatides crevées & vuides, & celles-là ont fourni une bonne partie de la Lympe commune où elles naissent toutes.

Il est sans difficulté que la Lympe, gelatineuse comme elle est, & destinée à nourrir toutes les parties du Corps, à se transformer en elles, peut produire les enveloppes des Hydatides, ou leurs fausses membranes. M. *Ruyfch* ayant bien fouetté avec une branche d'Arbrisseau le sang d'une Saignée encore chaud, il s'en attacha à cette branche une infinité de parties filamenteuses, qui après avoir été blanchies par des lotions, formoient une espece de membrane, que l'on auroit prise pour vraie & naturelle. M. *Morand* n'a pas manqué de repeter cette experience.

Il a voulu voir aussi quelles liqueurs mêlées avec la Lympe l'épaississoient le mieux, & il a trouvé que c'étoient l'Esprit de Vin,

36 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE
 & la Teinture de Noix de Galle. L'Eau
 Alumineuse a produit sur la surface du mê-
 lange une pellicule toute semblable aux en-
 velopes des Hydatides. On pourroit trouver
 aussi quelles liqueurs empêcheroient la Lym-
 phe de s'épaissir , & les Hydatides de se
 former dans notre corps ; mais ce desordre
 n'est point sensible long temps même après
 sa naissance, cette maladie ne se laisse con-
 noître que quand elle ne peut être guérie
 par aucune autre voye que les Ponctions,
 qui ne peuvent pas toujours être pratiquées.

DIVERSES OBSERVATIONS:

ANATOMIQUES.

I.

M GEOFFROI reçût de M. son Oncle
 qui est à *Toul*, la relation d'un Mon-
 stre humain né le 24. Decembre 1722. à
Dompremi-la-Pucelle, lieu de la naissance
 de la fameuse Pucelle d'*Orleans* dans le *Bar-
 rois*. Il faut se représenter deux Enfans à
 qui on a retranché toutes les parties infé-
 rieures depuis le Nombril, & qui sont unis
 l'un à l'autre par un Nombril commun, de
 sorte que le tout ensemble n'est que les deux
 moitiés supérieures de deux Corps unies par
 le plan inférieur de chacune. Elles sont
 posées du même sens, & les deux Têtes
 qui terminent le tout sont tournées en
 même temps vers le haut, ou vers le bas.
 Au des côtés & au milieu de la figure
 monstr.

monstrueuse est une Vulve commune, & des deux côtés de cette Vulve deux Cuisses, deux Jambes, & deux Pieds. Tout cela n'est point de l'autre côté où n'est point la Vulve, il n'y a qu'un Moignon de Cuisse, qui n'appartient qu'à l'un des demi-Corps.

On a vû ce Monstre déjà âgé de trois semaines, bien vivant, bien conformé en toutes ses parties, ayant du sommet d'une tête à l'autre 16 pouces $\frac{1}{2}$ de Roi, & 1 pied depuis le ventre jusqu'au bout des deux Pieds. On a vû ces deux Enfans qui avoient deux Nourrices teter & manger de la bouillie avec beaucoup d'appetit, & un grand air de santé. Quelquefois l'un tetoit, pendant que l'autre dormoit. Ils ont été tous deux batisés, & nommés *Jeanne*. La production des Monstres n'étonne plus les Physiciens, nous avons déjà dit plusieurs fois quel en est le principe general. Mais si des Monstres humains à deux Têtes comme celui-ci vivoient assés long-temps, il seroit curieux d'observer la difference des pensées & des volontés des deux Têtes, & comment le Monstre total se prendroit à les accorder, ou à sacrifier les unes aux autres.

II.

Une femme qui étoit à terme d'accoucher ayant été inutilement trois jours en travail avec des pertes de sang considerables, mourut, & on l'ouvrit pour découvrir ce qui l'avoit empêchée d'accoucher. On trouva que le Placenta qui doit être attaché au fond de la Matrice, l'étoit au contraire à l'orifice interne, & le bouchoit exactement, excepté un endroit où il n'étoit pas collé,

& c'étoit par là que s'écouloit le sang des pertes. L'Enfant avoit les pieds en haut qui poufloient ses Envelopes contre le fond de la Matrice, il avoit la Tête en bas, qui avec les Epaules poufloit le Placenta contre l'Orifice interne, & le Col de la Matrice, de sorte qu'il se fermoit le passage lui-même. *M. Petit* le Chirurgien a tenu cette observation de trois de ses Confreres, témoins éclairés & habiles. La naissance est elle-même un grand-peril de mort.

III.

Le même *M. Petit* visitant un malade qui avoit une Hernie ou Descente du côté gauche, où étoit un Testicule bien placé, ne lui trouva point le Testicule du côté droit, & apprit de lui qu'il ne l'avoit que quand sa Descente étoit rentrée ou reduite. Alors il arrivoit souvent que ce Testicule tomboit dans la place d'où la Descente étoit sortie, mais non pas aussi bas que le Testicule qui y étoit toujours. Le Scrotum ou Sac total n'étoit que la Bourse gauche, il n'y avoit que celle-là qui eût quelque chose à contenir; la droite étoit effacée faute de fonction, & le Raphé, espece de couture ou de ligne qui separe naturellement ces deux Bourses, & divise le Scrotum en deux parties égales, s'étoit entierement jetté du côté droit à l'extrémité de la Bourse unique.

Si c'étoit là un vice de la premiere conformation, tout est expliqué, mais *M. Petit* croit fort possible que ce n'en fût pas un. Les Enfants n'ont pas en naissant les Testicules dans le Scrotum, ils y tombent peu-à-peu, aidés par les efforts que font les En-
fants.

fans pour touffer, pour crier, &c. Ils arrivent d'abord chacun à un Anneau des Muscles du bas Ventre, passent au travers, & descendent dans une Bourse. Les Enfans qui crient ou se tourmentent moins, ont plus tard le Sexe masculin entierement développé. Si un Anneau a refusé le passage à un des deux Testicules, les Anatomistes concevront bien comment il a pû être entraîné à suivre le chemin de l'autre, & tomber après lui dans la même Bourse, & même comment cette chute peut n'être pas absolument necessaire, & dépendre de quelques mouvemens qu'on se donnera. Il n'est pas rare de trouver des Hommes à qui un Testicule passe & repasse par son Anneau avec facilité.

IV.

Quand on a été mordu d'un Chien que l'on croit enragé, il arrive ordinairement que le Chien est tué avant que l'on se soit assuré de son état, & la personne mordue demeure dans une cruelle incertitude. M. *Petit* le Chirurgien a un expedient pour la terminer. Il frote la Gueule, les Dents, les Gencives du Chien mort avec un morceau de viande cuite, qu'il presente ensuite à un Chien vivant. S'il la refuse en criant & en heurlant, le mort étoit enragé, pourvû cependant qu'il n'y eût point de sang à sa gueule. Si la viande a été bien reçûe & mangée, il n'y a rien à craindre.

V.

Ce n'est que sur la foi de l'experience qu'on peut croire que des coups d'Epée dans l'Estomac se guerissent. Un Dragon du
Re

Regiment de *Languedoc* en ayant reçu un, vomit aussi-tôt du sang & des alimens. M. *du Vivier* Chirurgien Major des Dragons de ce Regiment, jugea que le coup ouvroit l'Orifice superieur de l'Estomac, en faisant obliquement un trajet d'environ 6 pouces; il pansa le Malade, & le fit saigner sept fois en vingt-quatre heures, ce qui n'empêcha pas qu'une grosse fièvre ne s'allumât, & qu'il ne vomît encore plus d'une pinte de sang. Cependant par une diète très-exacte, par l'usage des Vulnéraires & de l'Eau de Rabel, & par celui des Lavemens la fièvre diminua dès le troisième jour, le Blessé n'eut plus que des Hoquets, & de frequens soupirs, & enfin en dix-huit jours il fut guéri. Deux mois après il eut une fièvre tierce pour laquelle on lui donna de l'Emetique, il vomit beaucoup de sang, apparemment parce que les secousses de l'Estomac avoient r'ouvert la surface interne de la playe, mais M. *du Vivier* le tira encore de cet accident. Il lui en coûta plus de temps que pour le premier, il lui fallut deux mois entiers.

V.L.

M. *du Vivier* ne laissa pas d'employer dans une autre blessure d'Estomac ce même Emetique, qu'il avoit reconnu pour si dangereux. Un Officier ayant fait une débauche de 10 heures à table, reçut un coup d'épée, & M. *du Vivier* jugea par le vin qui sortoit, & par la place du coup, qu'il perçoit l'Estomac à son fond. La playe extérieure n'étoit que d'environ 3 lignes. Un autre Chirurgien vouloit saigner; pour lui il fut d'avis

de l'Emetique, parce que si l'Estomac qui étoit fort chargé & fort rendu se soulageoit de ce fardeau excessif, ses parties écartées se rapprocheroient, & la playe qui ne pouvoit être que petite, diminueroit beaucoup dans l'instant. Ce sentiment, quoi-que hardi, l'emporta. On saigna après que l'estomac fut vidé, tout le reste se fit à l'ordinaire, & selon qu'il convenoit, & la guerison fut parfaite.

VII.

Un Portefaix de *la Flèche*, âgé de 40 ans, fort robuste, attaqué depuis huit ans d'une Hernie incomplète qu'il faisoit rentrer facilement, & qui ne l'empêchoit point de travailler, sentit, presque tout à coup une extrême augmentation de son mal, sa Hernie devint grosse comme le poing, longue de 5 à 6 doigts, très-dure, & il eut des douleurs très-vives & des vomissemens frequens, qu'il n'avoit point encore éprouvés. M. *Farcy*, Chirurgien de *la Flèche*, qui fut appelé, & qui a envoyé cette Relation bien attestée à l'Academie, n'osa tenter de faire la réduction à cause de la grande dureté qu'il trouvoit; elle étoit telle qu'elle sembloit offenser. On tâcha vainement de la ramollir par des Cataplasmes. Le Malade fut quatre jours sans aller à la selle, effet naturel & ordinaire de ce que le cours des matières étoit arrêté dans la Hernie, mais il y alla ensuite naturellement, & continua d'y aller tous les jours & cependant la Hernie ne diminueoit ni de grosseur, ni de dureté, quoi-que l'Intestin fût soulagé d'une partie des matières qui s'y étoient d'abord amassées. Il fal-

lois.

loit bien que la tumeur vînt enfin à suppuration , & comme on vit qu'elle s'y dispo-
soit, on l'aida , & le 14^{me} jour M. *Farcy*
fit l'operation, qu'on avoit différée autant
qu'il avoit été possible à cause de l'extrême
repugnance du Malade. M. *Farcy* coupa
quatre doigts de l'Intestin pourri , & il fut
fort étonné d'en tirer de petits Os, que l'on
reconnut pour des Os de Pieds de Mouton.
On en tira jusqu'à seize. Le Portefaix avoit
mangé des Pieds de Mouton la veille de
son accident, & en avoit avalé goulument
quantité d'Os. Ils rendoient la tumeur si-
dure , & caufoient l'impossibilité de la ré-
duction , mais en même temps ils produi-
soient un bon effet. A l'endroit où l'Intestin
eût été étranglé , & par conséquent les
matières entièrement arrêtées, ils formoient
une espee de Voute sous laquelle le passage
de ces matières demeurait allés libre. Mais
ce qu'il y a ici de très-singulier, c'est que
quatre doigts de l'Intestin pourris ayant été
emportés par l'incision , une autre partie
presque égale du même Intestin pareillement
pourrie s'étant ensuite séparée naturellement
du vif , les matières destinées à sortir par
l'Anus ne devoient plus sortir que par-là ,
& par la Playe qu'il auroit fallu tenir tou-
jours ouverte , & le Malade auroit porté
toute sa vie une Canule qui auroit été son
Anus. Cependant c'est ce qui n'est point
arrivé: M. *Farcy* vit que de jour en jour
les matières sortoient en moindre quantité
par l'ouverture de l'Intestin & par la Playe,
il espéra qu'enfin elles ne sortiroient plus,
il se résolut à donner au Malade des ali-
mens.

mens affés folides qu'on ne lui auroit pas permis selon la pratique ordinaire ; tout réüffit , la Playe se cicatrifa en trente-trois-jours , il ne resta point de fistule au Malade , & il n'eut point besoin de porter de Canule. Il se remit au travail comme s'il n'eût jamais été incommodé. L'intestin , dont on avoit emporté plus d'un demi pied , se rejoignit donc , ce qui est presque inconcevable , à moins que l'on applique ici une observation du celebre M. *Ruyseh* * sur l'Intestin Ileon. Quelquefois il s'y fait un prolongement plus ou moins grand , qui est une espece de Cœcum particulier. Ce prolongement aura été la portion de l'Intestin Herniaire remplie d'Os , il aura fait naturellement la voute dont on a parlé , on en aura coupé une bonne partie , & ses parois se seront rapprochées & réünies plus facilement que ne feroient deux bouts d'un même Intestin continu , séparés d'un demi-pied. Quoi-qu'il en soit , il est certain que dans des Corps d'une pareille constitution , accoutumés à un grand exercice , & à une grande frugalité , la Nature a plus de ressources , ou les met plus aisément en œuvre.

VIII.

Voici une autre Observation , où l'on verra que la Nature , mais aidée de l'Art , a fait cette réünion d'Intestin , que l'on n'esperoit pourtant pas. L'Observation vient d'un Chirurgien fameux , élevé à la plus haute place où il pût prétendre. Quand

Plu-

* Cette découverte de M. *Ruyseh* a été confirmée par M. *Littre* , Mem. de 1700 p. 397 & par M. *Mey* , Mem. de 1701. P. 356.

L'Intestin qui fait la Hernie est pourri ou gangrené, il en tire en dehors toute la partie altérée, après avoir ouvert la peau du Scrotum & le Sac Herniaire, & dilaté suffisamment l'Anneau; à travers la partie du Mesentere qui soutient la partie altérée de l'Intestin, il passe avec une Aiguille un double fil ciré, & en nouant les deux extrémités d'un fil, il forme une espece d'anse de la partie du Mesentere par laquelle il assujettit l'Intestin vers le milieu de la Playe sans le ferrer, afin que les suppurations & les matières qu'il contient, s'il s'ouvre par la pourriture, soient portées au dehors, car leur épanchement dans la cavité du ventre seroit mortel. Il fit cette operation à un Homme de 35 ans, il lui emporta un demi-pied d'Intestin gangrené, & ayant rapproché l'un de l'autre selon sa methode les deux bouts de l'Intestin placés à l'ouverture de la Playe, il espera qu'ils s'y pourroient coller, que les matières sortiroient par la partie supérieure de l'Intestin, l'inférieure demeurant inutile, & que le Malade porteroit toute sa vie une Canule, qui lui tiendrait lieu d'Anus. La Nature fit beaucoup plus que ce qu'il eseroit de plus avantageux. Les deux bouts d'Intestin se réunirent l'un à l'autre en un mois, & les matières, qui sortoient d'abord par l'ouverture de la Playe, reprirent peu-à-peu pendant ce temps la route de la partie inférieure de l'Intestin, qui étoit leur route naturelle. Le rétablissement du Malade fut entier, à deux accidents près.

Il eut pendant deux ans une Colique plus ou moins forte selon qu'il avoit plus ou moins

moins mangé ; elle répondoit à l'endroit de la Playe, & diminua toujours par degrés. La réunion des deux bouts d'Intestin s'étoit faite par de nouvelles chairs cicatrisées, & le passage qu'elles laissoient aux matières n'avoit dans les commencemens ni le diametre naturel de l'Intestin, ni sa souplesse.

Comme la methode qu'on avoit pratiquée, demandoit qu'on élargît beaucoup l'Anneau, il se fit par-là une Descente d'Intestin de la grosseur d'une Orange, & on eut beaucoup de peine à trouver un Bandage convenable,

IX.

M. *Morand* a observé dans l'Hydrophthalmie, ou Hydropisie de l'Oeil, qui allonge & dilate la Sclerotique du côté du Nef Optique, qu'en exposant à la lumière l'Oeil détaché de l'Orbite, il est très-transparent dans toute l'étendue de l'axe qui le traverse depuis la partie antérieure & saillante de la Cornée jusqu'au de-là de la partie postérieure & dilatée de la Sclerotique.

CETTE année parut un Livre de M. *Petit* le Chirurgien, intitulé, *Traité des Maladies des Os, dans lequel on a représenté les Appareils & les Machines qui conviennent à leur guérison*. Une première Edition faite vingt ans auparavant, n'empêche pas celle-ci d'être un Livre tout nouveau. Quel siècle que vingt ans pour un Chirurgien habile & très-employé ! Combien d'observations & d'experiences nouvelles ?

Les Maladies des Os sont la Luxation,

ou

ou le déplacement hors de leurs articulations naturelles, la fracture, l'Anchylose, ou l'immobilité, ou difficulté de mouvement qui survient à une articulation, & en empêche le jeu, l'Exostose, ou excrescence, la Carie, ou pourriture, ou vermourure, le Rakitis, ou courbure de l'Épine, telle qu'elle est dans les Enfans en Chartre. C'est un vaste sujet d'Ouvrage que d'appliquer toutes ces Maladies l'une après l'autre à tous les Os du Corps humain qui en sont susceptibles, de rapporter les differens accidens dont elles peuvent être accompagnées, de décrire les operations qu'elles demandent, les pansemens, les Appareils, les Bandages, enfin tout ce qui peut guider & éclairer la Pratique, toujours extrêmement variée par les circonstances. Mais ce détail infini, qui regne dans le Livre de M. *Petit*, nous empêche absolument d'en pouvoir donner aucune idée generale, il nous faudroit de la Theorie, du Systême, & ici tout est Pratique, & faits particuliers. On en a vû quelques échantillons dans les Memoires de 1718 * & dans ceux de 1722. †

Ce Livre fait si bien voir quelle est la prodigieuse quantité de connoissances nécessaires à un veritable Chirurgien, que l'on ne doit pas être après cela fort disposé à s'abandonner si aisément aux Bailleuls ou Renouveurs les plus accredités parmi le peuple. On sera aussi extrêmement porté à croire sincere la protestation que fait M. *Petit* de ne réserver rien ni pour lui, ni pour ses

* P. 121. & 252. † P. 68.

ses Enfans qu'il destine à sa profession, il a ramassé un si grand nombre de choses, qu'on ne le soupçonnera pas d'en savoir davantage. Il est toujours très-utile que ceux qui sont zelés pour le Genre humain & desintéressés, répandent leur connoissances, mais malgré cette genereuse intention, il y a des talens personnels qu'ils ne peuvent ni communiquer, ni transmettre.

Nous renvoyons entièrement aux Mémoires

* L'Ecrit de M. *Winslow* sur un Mouvement singulier des Omoplates, &c.

* V. les M. p. 98.





C H I M I E.

SUR UN VERD-DE-GRIS NATUREL.

* **T**OUT le Verd-de-gris ou Verdet que nous avons est artificiel. On le tire de Lames de Cuivre macérées pendant quelque temps avec du Marc de Raisin, ce Marc altere & dissout jusqu'à un certain point leur surface, on en enleve avec des Couteaux ce qui est alteré, & c'est le Verd-de-gris. On recommence cette operation jusqu'à ce que les Lames soient entièrement changées en cette nouvelle matière.

Une masse minerale envoyée des *Indes* à S. A. S. Mgr. le Duc d'*Orleans*, dont le goût hereditaire pour les Sciences, & en particulier pour l'Histoire Naturelle, lui attire ces sortes de curiosités, a été reconnue par M. de *Reaumur* pour un Verdet naturel, dont l'espece est toute nouvelle.

Cette masse est d'un vert très-vif & très-gai, &, ce qui est singulier, elle a un œil foyeux, & plus qu'aucune étoffe de soye. Sa structure generale est par branchages, par touffes, qui naissent irrégulièrement les unes des autres, elle ressemble par cette disposition

tion aux Vegetations Chymiques; la structure de chaque partie séparée est par longs filets appliquées les uns sur les autres, comme ceux de l'Amiante. Ce corps est pesant & friable.

M. de *Reaumur* jugea d'abord par la pesanteur que cette matière étoit métallique, par la couleur qu'elle étoit cuivreuse, car le Cuivre seul entre les métaux donne une flamme & des matières vertes, & par la friabilité, que c'étoit un Cuivre imparfait, & non encore malléable. Les essais qu'il fit selon la pratique ordinaire, confirmèrent pleinement ses conjectures. Il fut seulement surpris que cette matière fût déjà si avancée dans l'état de Cuivre, qu'ayant été mise en poudre dans un Creuset, environnée de poudre de Charbon, elle en tira tout le Soufre qui lui manquoit pour être Cuivre parfait & malléable.

En cela, aussi bien que par un vert beaucoup plus vif, le Verdet naturel des *Indes* diffère du nôtre artificiel, qui mis à la même épreuve dans un Creuset, ne redevient point Cuivre. La raison en est que le Verdet artificiel n'a point été dépouillé de son Soufre, & que certainement le naturel l'a été, ou que du moins, c'est une matière à laquelle le Soufre a toujours manqué pour la rendre parfaitement Cuivre. On conçoit aisément que si cette même matière eût pénétré une Pierre transparente & Crystalline, elle en eût fait une belle Emeraude. Telle est, selon toutes les apparences, l'origine de toutes les Pierres précieuses colorées;

50 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE
des matières métalliques ont teint des Cryf-
taux.

M. de *Reaumur* n'a pas crû devoir negli-
ger l'explication d'un petit fait qu'il a vû en
rotissant son Mineral & d'autres pareils ,
c'est-à-dire en les faisant chauffer bien pul-
verisés dans un Creuset. Quand la chaleur
est à un certain degré , il s'élançe des jets
jusqu'à plus de la hauteur d'un pouce , &
au dessous de chacun de ces jets il se forme
un petit creux , une espece de Tremie , par
où les jets continuent toujours à sortir. Que
l'on perce la surface de la poudre bouillante
dans les endroits où il n'y a point de jets ,
il s'y en forme aussi tôt. En tournant ce
phenomene de plusieurs sens , M. de *Rea-
mur* s'est assuré que deux conditions y sont
nécessaires , la première que la poudre soit
fine , & legere , la seconde , qu'elle ait une
humidité suffisante , il n'importe d'où cette
humidité vienne. Une vapeur échauffée ,
& qui tend à s'élever , perce la surface su-
perieure de la poudre , & en enleve avec
elle de petits grains jusqu'à une certaine hau-
teur , & quand une fois elle s'est fait une
route , il lui est plus facile de la suivre que
de s'en faire une nouvelle , ce qui tient
toujours ouvert le petit creux par où sort
le jet.

SUR LE SEL ARMONIAC.

* **L'**EGYPTE nous fournit tout nôtre Sel Armoniac, & elle nous le fournit, parce qu'elle manque de bois, ce qui a été expliqué dans l'Hist. de 1720†. On y a rapporté aussi comment les différentes expériences de M. *Geoffroi* le cadet sur ce Sel l'avoient conduit à deviner que les *Egyptiens* le faisoient par sublimation, quoi-que la forme de pains plats & orbiculaires sous laquelle ils nous l'envoient fût très-peu favorable à cette pensée. Le fait fut heureusement vérifié.

Pomet dans son Histoire des Drogues parle en deux mots d'un Sel Armoniac qu'on voyoit autrefois, plus estimé que celui d'aujourd'hui, & qui étoit en pains de Sucre. On n'osoit guere se fier à ce peu qu'il en disoit, & il n'en restoit presque plus aucune mémoire, lorsqu'un accident très-funeste l'a fait reparoître au jour. La Peste de *Marseille* ayant interrompu le commerce avec l'*Egypte*, il a fallu recourir aux *Hollandois* pour avoir du Sel Armoniac, & ils nous ont envoyé de ces pains de Sucre que l'on ne connoissoit plus. Ils le tirent certainement des *Indes Orientales*. M. *Geoffroi* n'a pas manqué d'appliquer son idée de la sublimation à ces Pains des *Indes*, qui sont des Cones tronqués vers le sommet, & en partie creux. Leur figure s'accommodoit bien

C 2

mieux

* V. les M. p. 304. † P. 62. & suiv.

72 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE
mieux à cette idée que celle des Pains d'*Egypte*. Jusq'ici les uns & les autres étoient des espèces d'Enigmes, que les *Egyptiens* & les *Indiens* nous envoioient, comme autrefois les Rois de ces mêmes Pais-là s'en envoioient de veritables, pour faire assaut d'esprit & de penetration.

Les *Anglois* nos Voisins nous donnoient aussi à deviner une autre Enigme de leur façon, tirée encore du Sel Armoniac. C'est ce qui s'appelle *Sel d'Angleterre*. Il a toute la vogue que peut avoir en ce Pais-ci une drogue étrangere. Au lieu de l'odeur urineuse, & presque insupportable du Sel Armoniac, il en a une qui sans être moins penetrante est agreable, & aromatique. La grande singularité est qu'il est en forme sèche & solide, & qu'il doit avoir été tiré du Sel Armoniac sous cette forme en grande quantité, car sans cela il ne s'en pourroit pas faire un débit si considerable. D'ailleurs il en est beaucoup plus commode pour l'usage. Jusq'ici nos Chimistes ne s'étoient guere appliqués qu'à tirer du Sel Armoniac son Esprit, c'est-à-dire une liqueur où nageoient ses Alkali volatils dégagés de leurs Acides. Le *Sel d'Angleterre* est bon pour les vapeurs & pour les défaillances, & on le porte sur soi dans de petits flacons.

Malgré le nom qu'on lui donne, il y a long-temps que ce Sel étoit connu des Chimistes. M. *Lémeri* en avoit parlé dès les premières Editions de son *Cours de Chimie*, & M. *Tournefort* a dit dans nos Memoires de 1700 * que de 15 onces de Sel Armoniac

niac il en tiroit 10 de Sel volatil outre 3 onces d'Esprit, c'est-à-dire 10 onces de Sel volatil en forme sèche.

M. *Tournefort* étoit donc déjà bien avancé, mais M. *Geoffroi* a été plus loin. De 16 onces de Sel Armoniac il en a tiré plus de 13 onces de Sel volatil en forme sèche, & cela principalement parce qu'il a mêlé au Sel Armoniac sur lequel il operoit une plus grande quantité d'intermede, qui est un Sel Alkali bien calciné. Cet intermede plus abondant écartoit davantage les unes des autres les parties du Sel Armoniac, qui avoient été auparavant bien purifiées, pulvérisées très-fin, & bien séchées, de sorte que toutes leurs surfaces se représentant séparément à l'action du feu, rien n'empêchoit qu'elles ne laissassent échapper tout ce qu'elles contenoient de volatil. Il y a de plus un certain tour d'operation que l'on verra, dont l'adresse vient du genie & de l'experience du Chimiste.

En comptant l'Esprit que M. *Geoffroi* a tiré outre le Sel en forme sèche, & ce qui se perd & se dissipe necessairement dans l'operation, il se trouve que sur 16 onces de Sel Armoniac il y en a 15 de Sel Alkali, qui par consequent se sont liées à une once seulement de l'Acide du Sel Marin, qu'on avoit fait entrer dans la composition du Sel Armoniac, ainsi que nous le savons presentement. Quinze parties d'Alkali sur une d'Acide dans la composition d'un Sel concret ou moyen tel que l'Armoniac, sont une dose étonnante, & qui ne se trouve

§4 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

peut-être que dans ce seul Mixte ; mais cela même rend bien raison pourquoi le Sel Armoniac mis sur une pelle rouge s'en va tout en fumée : ses deux principes, l'Acide & l'Alkali , n'ont presque pas de liaison, parce que l'un est en trop grande quantité par rapport à l'autre.

Quant à l'odeur agreable que les *Anglois* donnent à leur Sel , ce n'est pas la peine de s'y arrêter , elle vient de quelques Plantes aromatiques. M. *Geoffroi* donne dans tout le détail la composition de ce Sel telle qu'il l'a découverte , & qu'il la pratique. Le genie *François* n'est pas mystereux, même en Chimie.





BOTANIQUE.

M Marchant a donné la Description du
Chamædrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis. I. R. H. 205. *Marum Cortusi.* J. B. T. 3. 242. *Majorana Syriaca vel Cretica.* Casp. Bauh. Pin. 224.

Et du *Trachelium azureum, umbelliferum.* Pon. Bald. Ital. 44. *Cervicaria Valerianoides, cœrulea.* Casp. Bauh. Pin. 95.

Nous renvoyons entierement aux Memoires

* L'Ecrit de M. Marchant sur l'établissement d'un nouveau Genre de Plante, qu'il appelle *Ricinocarpos.*

† V. les M. p. 243.



ALGEBRE.

SUR LE CALCUL DES DIFFERENCES *finies, & des Sommes des Suites.*

* CETTE matière a déjà été traitée en 1717 d'après M. Nicole †. Il rend présentement sa Theorie plus generale, & l'étend à de nouvelles Suites dont les conditions sont moins bornées. Non seulement nous allons le suivre dans cette augmentation qu'il donne à sa Recherche, mais pour répandre plus de lumière sur le tout, nous remonterons jusqu'aux idées fondamentales, que nous éclaircirons plus qu'elles ne l'avoient été.

Si la première Ordonnée d'une Courbe est nulle ou zero, il est très-clair qu'une Ordonnée quelconque suivante est la somme des différences de toutes les Ordonnées qui la précèdent, c'est-à-dire, la somme de toutes les grandeurs dont chaque Ordonnée a crû au dessus de la précédente. Ainsi dans une Suite d'Ordonnées croissantes qui commence par zero, toute Ordonnée est la somme de tout ce qu'il y a eû de différences

* V. les M. p. 26. & 253. † P. 48. & suiv.

ces jusqu'à elle inclusivement. Que ces différences soient finies ou infiniment petites, la proposition subsiste également. Si elles sont finies, la 1^{re} Ordonnée finie, qui n'est que la 2^{de} Ordonnée, puisque la 1^{re} est zero, est la somme d'elle-même qui est la différence de zero à elle; la 2^{de} Ordonnée finie, qui est la 3^{me}, est la somme de la 2^{de} Ordonnée entière, & de la différence dont la 3^{me} surpasse cette seconde, & toujours ainsi de suite. Si les différences sont infiniment petites, comme on les conçoit dans la Geometrie moderne, il n'y a rien de changé, seulement toute Ordonnée finie est la somme d'une infinité de différences.

Ce que l'on vient de dire d'une Suite croissante d'Ordonnées qui commence par zero, s'applique de soi-même à une Suite décroissante, qui se terminera par zero. Il n'y a que ce seul changement, l'Ordonnée qui dans le 1^{er} cas étoit la somme de toutes les différences des Ordonnées précédentes jusqu'à elle inclusivement, est dans le 2^d cas la somme des différences de toutes les Ordonnées suivantes, car pour rendre la Suite croissante, au lieu qu'elle étoit décroissante, il n'a fallu que la concevoir renversée.

Cette condition, que la Suite croissante, car il suffit de la considérer, commence par zero, est absolument nécessaire, afin qu'une Ordonnée quelconque soit la somme des différences de toutes les Ordonnées précédentes, & ne soit ni plus ni moins. Si la première Ordonnée de la Courbe n'est pas zero, ou infiniment petite, mais finie, ou ce qui vient au même, si on ne considère
 C 5 dans

38 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

dans la Courbe qu'une Suite d'Ordonnées qui ne commence qu'après le point où il y en auroit une nulle, une Ordonnée quelconque de cette Suite fera bien encore la somme des différences de toutes les Ordonnées précédentes, mais elle contiendra de plus une grandeur égale à la première Ordonnée finie par laquelle on aura commencé la Suite; ainsi la somme des différences sera égale à cette Ordonnée moins la première. Si au contraire la Suite dont il s'agit commence par quelque Ordonnée qui soit avant l'Ordonnée nulle, après quoi elle continuera à l'ordinaire par les Ordonnées croissantes, une Ordonnée quelconque d'entre ces croissantes fera la somme des différences de toutes les Ordonnées précédentes jusqu'à zero, mais non pas des différences des Ordonnées qui auront précédé zero; ainsi la somme des différences de toutes les Ordonnées posées & que l'on veut considérer, sera égale à cette Ordonnée, plus la somme des différences des Ordonnées qui auront précédé zero ou l'Ordonnée nulle.

Par le calcul différentiel on a toujours la différence infiniment petite d'une Ordonnée quelconque d'une Courbe, & cette différence qui est la quantité dont cette Ordonnée supposée ici croissante, surpasse celle qui la précède, est une partie infiniment petite de l'Ordonnée. *Intégrer* une quantité, c'est trouver par une partie infiniment petite quel est le tout fini, en déterminer la valeur. Quand on integre la différence infiniment petite d'une Ordonnée, on a donc cette Ordonnée ou la somme exacte des différences

feredces de toutes les Ordonnées précédentes dans le cas où cette somme & l'Ordonnée sont exactement égales, & si elles ne sont pas dans ce cas, qui est celui où la Suite a commencé par zero, on voit aisément, en supposant une première Ordonnée nulle, ce qu'il faut ajoûter à la somme trouvée des différences, ou en retrancher.

C'est par cette Methode que l'on détermine la Quadrature des Courbes, ou les espaces finis renfermés entre ces Courbes & des droites. On prend les différences de ces espaces, ou les espaces infiniment petits dont ils croissent à chaque instant, & on les integre quand l'integration est possible, car on ne fait que trop qu'elle ne l'est pas toujours, du moins jusqu'à present.

Noas avons dit en 1717 comment toutes ces idées qui ont pris naissance dans le Systême de l'Infini ont été transportées au Fini, d'abord par M. *Taylor*, grand Géometre Anglois, & après lui par M. *Nicole*. Une Suite quelconque formée de nombres finis étant posée, chacun de ces nombres est la difference finie dont la somme totale de la Suite augmente toujours, & par conséquent chaque nombre conçu comme une difference, étant intégré, sera égal à la somme de toutes les différences précédentes de la somme totale, c'est-à-dire à la somme de tous les nombres qui l'auront précédé, supposé que la suite ait commencé par zero; ce qui est une très-belle Methode pour avoir la somme de tel nombre de termes qu'on voudra d'une Suite.

Mais cette Methode n'est pas applicable

ble à toutes sortes de Suites. Il faut que chaque terme en puisse être exprimé d'une manière generale & Algebrique, & il faut que cette expression, puisqu'on la conçoit comme l'expression d'une difference, puisse être intégrée. Or cela demande deux conditions, ainsi que nous l'avons dit. 1^o. Que les termes de Suites soient formés par un produit. 2^o. Qu'il n'entre dans ce produit qu'une seule grandeur indéterminée, qui croisse toujours d'une même quantité, c'est-à-dire, que les nombres multipliers ou *facteurs* qui composeront un terme quelconque de la Suite, seront la grandeur indéterminée, la même plus la quantité constante dont elle croît, la même plus deux fois la quantité constante, &c. Car cela peut aller si loin qu'on voudra, & le produit qui fait un terme quelconque de la Suite peut avoir un nombre quelconque de facteurs. Quand on détermine la grandeur indéterminée, c'est-à-dire, qu'on lui donne successivement les valeurs des nombres naturels, 1, 2, 3, &c. on a les differens termes consecutifs de la Suite. Le premier est celui où la grandeur indéterminée est 1.

La grandeur indéterminée assujettie à croître toujours d'une quantité constante dans les differens facteurs, qui forment chaque produit ou terme de la Suite, n'est pas assujettie pareillement à ne croître que de cette même quantité quand elle passe d'un terme à l'autre. Elle peut croître de toute autre quantité dans ce passage, pourvu que dans chaque passage ce soit toujours la même quantité. Ainsi il peut y avoir deux diffe-

différentes quantités constantes, l'une dont la grandeur indéterminée croît dans chaque facteur d'un même terme, l'autre dont elle croît d'un terme à l'autre. Cela fait deux cas, dont le plus simple est celui où les deux quantités constantes sont la même. C'est ce cas-là que M. Nicole a donné en 1717. Une infinité de Suites croissantes qu'on peut former à son gré en observant les conditions requises, lui appartiendront, & par conséquent on aura les sommes de tel nombre fini de leurs termes qu'on voudra depuis leur origine. Il est à remarquer qu'entre toutes ces Suites sont celles de tous les Nombres figurés possibles, & c'est ce que nous allons faire voir.

La Suite des Nombres naturels étant posée, les Nombres qui commençant par 1 auroient pour 1^{re} différence le 2^d des naturels, ou 2, & ensuite tous les autres pour différences consécutives, seront les Triangulaires. Ils font cette Suite 1, 3, 6, 10, &c. De même ceux qui commençant par 1 auront pour 1^{re} différence le 2^d des Triangulaires, ou 3, & ensuite tous les autres pour différences consécutives, seront les Pyramidaux, 1, 4, 10, 20, &c. De la même manière se formeront les Triangulopyramidaux, qui commençant par 1 auront pour 1^{re} différence 4, le 2^d Pyramidal, & ensuite tous les autres Pyramidaux pour différences. On voit qu'il se formera ainsi des Nombres figurés sans fin. On les appelle Nombre du 1^{er} ordre, du 2^d, du 3^{me}, &c. en comptant les Naturels pour ceux du 1^{er}.

Mais on ne peut donner aux Naturels le nom de figurés.

Si l'on forme de suite des produits des nombres Naturels pris deux à deux, c'est-à-dire que l'on multiplie 1 par 2, 2 par 3, 3 par 4, &c. & que l'on divise chacun de ces produits par 2, on aura la Suite des nombres Triangulaires. De même si l'on multiplie de suite les Naturels pris trois à trois, c'est-à-dire qu'on fasse le produit de 1, 2, & 3, celui de 2, 3 & 4, celui de 3, 4 & 5, &c. & qu'on divise chacun de ces produits par 6, on aura la Suite des Pyramidaux. On aura la Suite des Triangulo-pyramidaux en formant pareillement des produits Naturels pris quatre à quatre, la difficulté ne peut être que de savoir quel sera le diviseur commun de ces produits; mais il saute aux yeux que ce diviseur commun fera égal au 1^e produit, c'est-à-dire ici 24. Il en ira toujours ainsi de tous les nombres figurés à l'infini.

On aura donc une infinité de Suites dont chaque terme sera un produit formé d'un certain nombre de facteurs qui croîtront d'une même quantité constante, & où de plus d'un terme à l'autre les premiers facteurs comparés entr'eux croîtront encore d'une quantité constante, qui sera la même que la première. Quant au diviseur commun de tous les produits ou termes, il sera fort aisé d'en tenir compte. Ainsi toutes les Suites de nombres figurés sont telles que par la Methode de M. Nicole on peut avoir les sommes d'un nombre quelconque fini de

de leurs termes à commencer par le premier.

Si les produits formés, comme on vient de dire, ne sont pas divisés par le diviseur commun que demande chaque ordre de nombres figurés, ce seront d'autres Suites de nombres qui n'en apartiendront que de plus près à la Methode de M. *Nicole*.

Toutes les suites qui y apartiennent peuvent être réduites en Suites de nombres rompus, il n'y a qu'à donner à tous leurs termes qui deviendront Dénominateurs, un même Numérateur constant. Mais alors elles sont décroissantes, & leur dernier terme infiniment petit, ou zero. Ainsi les sommes en general étant toujours prises depuis zero jusqu'à un terme fini quelconque, celles-là comprennent la partie infinie de la Suite qui est du côté de son extrémité, au lieu que les autres n'en comprenoient qu'une partie finie du côté de son origine. Les premières sommes ne l'étoient que d'un nombre fini de termes, ces secondes le sont d'un nombre infini, ce qui les rend & plus curieuses, & d'un usage beaucoup plus grand en Géométrie.

Le terme fini d'où l'on prend la somme de la Suite fractionnaire jusqu'à zero son dernier terme, peut aussi-bien être le premier terme que tout autre, & par conséquent on a la somme de la Suite entière. On a d'ailleurs la somme de cette Suite depuis tel terme que l'on veut, par exemple, depuis le 10^{me} jusqu'à zero, ainsi en ôtant cette somme totale, on aura celle des 10 premiers termes, & de tout autre nombre fini de ses termes.

Les

Les sommes des Suites fractionnaires conditionnées selon que la Methode l'exige, sont necessairement finies, quoi-qu'elles soient sommes d'une infinité de termes.

Puisque les produits des nombres Naturels pris deux à deux, & divisés par 2, pris trois à trois, & divisés par 6, &c. sont des Suites de nombres figurés, il n'y a pour les changer en suites dont les nombres figurés soient les dénominateurs, qu'à leur donner pour numérateur constant, ou 2, ou 6, &c. enfin le nombre que nous avons trouvé pour diviseur commun à chaque ordre de figurés.

Afin que ces Suites fractionnaires soient comprises dans la Methode de M. Nicole, il n'est point absolument necessaire que leur numérateur soit constant, il suffit que les numérateurs soient aussi-bien que les dénominateurs des nombres formés comme la Methode le prescrit pour les Suites de nombres entiers. Mais ces especes de Suites fractionnaires ne seront pas toujours *sommables*, c'est à-dire que le nombre infini de leurs termes n'aura pas toujours une somme finie, & dont on puisse déterminer la valeur; quelquefois il en aura une infinie, que l'on ne pourra par conséquent déterminer. Ainsi si une Suite fractionnaire a pour numérateurs les nombres Triangulaires, & pour détermineurs les Pyramidaux correspondans, elle ne sera point sommable, & sa somme sera infinie. Mais si à ces mêmes nombres Triangulaires on donne les Triangulo-pyramidaux pour dénominateurs, la Suite sera sommable, & en general une Suite fractionnaire dont

dont les numérateurs seront des nombres figurés d'un ordre quelconque, & les dénominateurs des figurés d'un ordre suivant, ne sera point somminable quand les deux ordres seront immédiatement consecutifs, & hors de-là le sera toujours.

En 1717 M. *Nicole* ne passa point le cas supposé jusquici, où d'un terme à l'autre de la Suite la grandeur indéterminée croît de la même quantité constante, dont les facteurs d'un même terme croissent entr'eux. Maintenant il étend sa Théorie au cas où cette quantité constante dans l'étendue de chaque terme, n'est plus la même dans le passage d'un terme à l'autre, quoi-que toujours la même dans chaque passage. Tels sont ces nombres 15, 48, 99, &c. Car le 1^{er} est le produit de 3 & de 5, le 2^d celui de 6 & de 8, le 3^{me} celui de 9 & de 11, où l'on voit que 3 & 5 facteurs du 1^{er} terme, 6 & 8 facteurs du 2^d, 9 & 11 facteurs du 3^{me} croissent toujours entr'eux de la quantité 2, mais 3 premier facteur du 1^{er} terme croît de la quantité 2 pour devenir 6 premier facteur du 2^d terme, 6 croît aussi de 3 pour devenir 9 premier facteur du 3^{me} terme, ce qui peut être continué à l'infini.

Cette Methode devenue plus vaste demande aussi plus de calcul, mais le même esprit, & les mêmes principes y regnent toujours. Elle comprend nécessairement l'autre qui est plus simple, & pour l'y ramener il n'y a qu'à supposer égales les deux quantités qui doivent être toujours constantes.

Si la quantité constante dont croissent les facteurs d'un même terme est nulle, alors
ce.

ce terme qui n'est plus qu'une même grandeur multipliée par elle-même un certain nombre de fois, est un quarré, s'il a deux facteurs, un cube, s'il en a trois, &c. Et si en même temps la quantité constante, qui doit être dans le passage d'un terme à l'autre, subsiste, on a une Suite dont les termes sont ou des quarrés, ou des cubes, &c. de nombres éloignés entr'eux d'un intervalle égal à cette quantité constante. Par exemple, si elle est 3, on a une Suite dont les termes sont ou les quarrés, ou les cubes, &c. de 1, de 4, de 7, de 10, &c. Si elle n'est que 1, on a les puissances quelconques consecutives des nombres naturels. Or par la Methode de M. *Nicole* on a l'expression generale Algebrique de la difference des termes de la Suite, on a donc celle de la difference qui est entre les mêmes puissances des nombres Naturels éloignés entr'eux de tel intervalle toujours égal qu'on voudra, & consecutifs, si l'on veut. On a aussi par la même Methode la somme d'un nombre fini quelconque des termes d'une Suite, depuis tel nombre fini exclusivement qu'on a voulu choisir jusqu'au premier inclusivement, on a donc les sommes d'un nombre fini quelconque de puissances des nombres Naturels, soit consecutifs, soit éloignés entr'eux d'un intervalle égal quelconque. On voit assez que cette détermination, toute vaste qu'elle est, n'est qu'un cas particulier de la Methode modifiée, & restreinte.

Toutes les Suites comprises dans la seconde supposition de M. *Nicole*, & telles que :

que l'on peut avoir leur difference Algebrique, & l'integrer, ce qui donne des sommes, ne sont pas pour cela telles qu'étant devenues fractionnaires elles soient susceptibles des mêmes operations, & qu'on puisse en avoir les sommes à la manière des Suites fractionnaires. Le changement qu'elles ont reçu apporte des limitations à leur capacité d'être sommées. Ce n'est pas qu'en leur donnant un numerateur constant, elles ne vinssent toutes sans exception à avoir des sommes finies, mais souvent on n'en pourroit pas déterminer la valeur. quoi-que finie. Ainsi les quarrés des nombres Naturels étant réduits en fractions dont 1 sera toujours le numerateur, la somme de cette Suite est certainement finie, mais inconnue. Il en va de même des autres puissances des nombres naturels. Le calcul par lequel M. Nicole trouve des formules generales de la difference & de l'integration des Suites fractionnaires de sa seconde supposition est trop long, trop recherché, trop veritablement calcul, pour nous permettre d'y entrer.

SUR UNE METHODE

pour la transformation des Nombres Irrationnels en Rationels.

* **L**ES Nombres irrationnels sont des Racines quelconques de Nombres qui ne sont point les Puissances correspondantes à ces

* V. les M. p. 78.

à ces Racines. Ainsi les racines quarrées ou 2^{des} de 2, de 3, de 5, &c. qui ne sont point des quarrés, ou des puissances 2^{des}, les racines cubiques ou 3^{mes} de 2, de 3, de 4, de 5, &c. qui ne sont point des cubes, ou des puissances 3^{mes}, les racines 4^{mes}, 5^{mes}, 6^{mes}, &c. à l'infini de 2, de 3, de 4, de 5, &c. sont des nombres irrationels. Il n'y a que peu de nombres qui soient quelque puissance, & ces nombres-là fournissent chacun autant de nombres irrationels, qu'il leur manque de puissances, c'est-à-dire une infinité. A plus forte raison, les nombres qui ne sont aucune puissance. De-là vient que dans les calculs scientifiques on rencontre beaucoup plus de nombres irrationels, que de rationels.

Les irrationels sont naturellement inintelligibles à l'Esprit humain, au lieu que les autres sont l'objet de ses plus claires idées. On ne fait ce que c'est que la racine 2^{de}, 3^{me}, 4^{me}, &c. de 2, on fait seulement qu'elle est plus grande que 1, & moindre que 2, & d'autant moins au dessus de 1, & plus au dessous de 2, qu'elle est d'une dénomination plus élevée. Aussi les Anciens n'ont-ils point reconnu les nombres irrationels pour de véritables nombres, ils les évitoient avec beaucoup d'art dans leurs solutions de Problèmes, qu'ils n'eussent pas crûes légitimes, si elles n'eussent abouti qu'à leur en donner, mais les Modernes plus hardis, ou forcés enfin à les admettre, parce qu'ils les rencontroient trop souvent, les ont reçûs, & soumis au Calcul comme les autres, autant que leur nature l'a pû permettre. Nous n'al-

n'allons traiter que des Irrationels, qui sont des racines quarrées, & par le mot de racine nous n'entendrons ici que celle qui est quarrée.

Puisque l'on ne peut avoir la valeur précise d'un Irrationel, & que l'on fait seulement entre quelles limites il est compris, tout ce qu'on peut faire est d'approcher de cette valeur inconnue par des nombres rationels qui soient au dessous, mais le moins au dessous qu'il se pourra, ou au dessus, mais le moins au dessus. La racine de 2 est 1, plus quelque quantité, mais quelle quantité? Voici comme on s'y prend pour le déterminer autant qu'on le peut. 2 étant pris ici pour un quarré, il est certain que si on le multiplie par un véritable quarré, tel que 100, par exemple, le produit sera un quarré imparfait, que la racine de ce nouveau quarré sera plus grande que n'étoit celle de 2, & que divisée par 10, racine de 100, elle donnera une fraction qu'il faudra ajoûter à 1 pour avoir une racine de 2 plus grande que 1. On tire donc la racine de 200, racine imparfaite, puisque 200 n'est pas quarré. Cette racine est 14, ou 10 plus 4, & cette grandeur divisée par 10 est 1 plus $\frac{4}{10}$, & $\frac{4}{10}$ est ce qu'il faut ajoûter à 1 pour approcher plus de la racine de 2 en dessous que 1 n'en approchoit.

En effet le rapport de 1 à la racine précise & inconnue de 2 est tel, que le quarré de 1, qui est 1, est la moitié du quarré de cette racine, & par conséquent si l'on avoit deux nombres rationels tels que le quarré de l'un fût la moitié du quarré de l'autre, on auroit le

le rapport exact de 1 à la racine de 2, mais puisque ce rapport exact ne se peut trouver, ces deux nombres ne se peuvent trouver non plus, seulement on pourra-t-on trouver deux dont les quarrés approchent du rapport cherché. Or c'est ce qui se voit dans la grandeur $1\frac{2}{7}$, ou $\frac{7}{7}$ qu'on vient de déterminer, car il ne s'en faut qu'une unité que 49 quarré de 7 ne soit double de 25 quarré de 5, desorte que le rapport de 5 à 7 représente à très-peu près celui de 1 à la racine de 2.

Mais cet à *très-peu près* n'empêche pas qu'on ne puisse encore approcher davantage du rapport de 1 à la racine de 2. Au lieu de multiplier comme on a fait dans l'operation précédente 2 par 100, il n'y a qu'à le multiplier par 10000, autre quarré dont la racine est 100, & la racine de 20000 qui sera 141, divisé par 100, marquera que la racine de 2 est 1 plus $\frac{1}{100}$ plus $\frac{1}{10000}$, desorte que par la seconde operation on s'est approché de $\frac{1}{100}$ de plus qu'on n'avoit fait par la première.

En multipliant encore 20000 par 100, & en operant de même, on aura une nouvelle fraction plus petite que $\frac{1}{100}$, qu'il faudra ajouter aux deux déjà trouvées, & par la repetition continuelle des operations, le nombre de ces fractions décroissantes augmentera toujours, sans que jamais leur somme puisse venir à faire un nombre rationnel qui ajouté à 1 soit la racine précise de 2, ou ait son quarré égal à 2.

Ce sont là les approximations à l'infini connues de tous les Geometres, mais M.

de

de *Lagni* les trouve défectueuses par plus d'un endroit. Elles ne se font que par des extractions de racines, & ces operations tâtonnent necessairement aussi-bien que les Divisions, dont elles sont une espece, car toutes les fois qu'on a mis un Quotient trop fort, ce qui arrive souvent, on est obligé de le réduire, & de le réduire au hazard, puisque quelquefois on le réduit encore, or, selon M. de *Lagni*, tout tâtonnement dans des operations prescrites par des méthodes est indigne de la Science Mathematiques. Mais ce qu'il y a de pis dans les approximations usitées, c'est que les fractions décroissantes, que l'on trouve toujours à chaque operation, ne suivent aucune regle. Leurs dénominateurs sont, à la verité, réglés par la progression 10, 100, 1000, &c. mais les numerateurs ne le sont, ni ne le peuvent être en aucune manière, ce qui fait que les fractions mêmes ne peuvent se déterminer qu'une à une, & ne forment point de Suite ou de Serie Algebrique, qui soit un objet de Science.

On s'est apperçû, il y a déjà quelque temps, que ces nombres fractionnaires $\frac{1}{2}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{17}{12}$, $\frac{41}{29}$, &c. representent chacun, quoi-qu'imparfaitement, ainsi qu'il est inevitable, le rapport de 1 à la racine de 2. On l'a déjà vu sur $\frac{7}{8}$, & on le verra de même sur les autres. Ils sont tous tels que le quarré du plus grand est double du quarré du plus petit à une unité près, qu'il a de trop ou de trop peu, & cela alternativement, c'est-à-dire, que dans le 1^{er} terme qui est $\frac{1}{2}$ le quarré de 3 ayant une unité de plus que le double du quarré

quarré de 2, il arrive dans $\frac{17}{7}$, 2^d terme, que le quarré de 7 a une unité de moins que le double du quarré de 5, & toujours ainsi de suite.

L'unité étant donc toujours l'excès ou le défaut du plus grand quarré, il est évident que plus ce quarré est grand, plus elle est petite par rapport à lui, & par conséquent que $\frac{7}{2}$ approche plus du rapport cherché que $\frac{17}{2}$, $\frac{17}{2}$ plus que $\frac{7}{2}$; &c. De sorte qu'en continuant toujours ces nombres, si on le peut, on aura toujours une expression rationnelle plus approchée du rapport de 1 à la racine de 2.

Or on peut les continuer à l'infini, le 1^{er} seul, ou un autre quelconque étant donné. Car si c'est $\frac{1}{2}$, par exemple, on trouvera le dénominateur du suivant en ajoutant le numérateur 3, & le dénominateur 2 de $\frac{1}{2}$, & pour avoir le numérateur qui doit répondre au nouveau dénominateur trouvé 5, il faut ajouter ce dénominateur 5 au dénominateur 2 du terme précédent, & toujours de même à l'infini. M. de Lagni met cela très-aisément en une formule Algebrique generale, & l'on a une Suite très-regulière, formée par la seule addition, sans aucune operation raisonneuse, & où les termes rapprochent toujours de plus en plus du rapport de 1 à la racine de 2.

Ce que M. de Lagni a fait sur cette racine de 2, il le fait ensuite sur celle de 3. Son rapport à 1 peut être représenté par ces nombres fractionnaires $\frac{2}{1}$; $\frac{7}{5}$; $\frac{26}{13}$; $\frac{97}{53}$, &c. car le quarré de 2 surpasse d'une unité le triple du quarré de 1, le quarré de 5 est de

de deux unités moindre que le triple du carré de 3, & ainsi de suite, de sorte que le carré du plus grand nombre est toujours alternativement plus grand d'une unité & moindre de deux unités qu'il ne faudroit. Cette différence des carrés excédants & défailans n'étant pas la même, il faut faire deux Suites, dont l'une sera $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \&c.$ l'autre $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \&c.$ Et M. de Lagni donne pour chacune une formule générale, qui est la même, mais qui ne peut servir que pour chacune en particulier, & non pour les deux mises ensemble, comme nous les avons d'abord exposées. La loi ou formule de chacune de ces Suites est qu'un terme précédent, tel que $\frac{2}{3}$ étant donné, le numérateur du suivant est le double du numérateur de ce précédent ajouté au triple de son dénominateur, & le dénominateur du suivant est le numérateur du précédent ajouté au double de son dénominateur. Les termes se forment toujours encore ici par la seule addition.

Le rapport du côté du Triangle équilatéral inscrit dans le Cercle au rayon est celui de la racine de 3 à 1. *Archimede* dans sa Quadrature du Cercle a eu besoin de ce rapport exprimé en nombres rationels, & il a choisi $\frac{1351}{780}$, & $\frac{265}{153}$. Le carré de 1351 est plus grand d'une unité que le triple du carré de 780, & le carré de 265 est moindre de deux unités que le triple du carré de 153. Or il se trouve que ces deux nombres fractionnaires sont compris dans les deux Suites de M. de Lagni, & par cette raison il ne croit pas qu'*Archimede* les ait pris au ha-

zard, quoi-que ses Commentateurs les plus zelés n'ayent jamais eu la pensée de lui attribuer un choix si judicieux. Il est vrai qu'on ne peut guere rien présumer de trop à la gloire d'un si grand & si rare genie.

M. de Lagni trouve ensuite les formules generales, qui appartiennent à la racine de 5, à celle de 6, de 7, &c. On voit bien que nous avons sauté celle de 4, parce qu'elle est rationnelle, mais quand toutes les formules des racines irrationnelles, qui expriment chacune en particulier une Suite infinie, sont disposées selon leur ordre naturel, on s'aperçoit aussi-tôt qu'elles font elles-mêmes une nouvelle Suite réguliere, où cependant il manque des termes dans certains intervalles, & ces intervalles sont justement ceux où doivent être placées les racines rationnelles, qui viennent d'elles-mêmes, pour ainsi dire, se soumettre à l'analogie generale.

Nous pourrions ici donner une Remarque sur les racines quarrées irrationnelles, que nous ne croyons pas qui ait encore été faite. Tous les nombres qui sont la somme d'un quarré & de sa racine, tels que 2, somme du quarré 1, & de sa racine 1, 6 somme de 4 & de 2, 12 somme de 9 & de 3, 20, 30, 42, 56, &c. que j'appelle pour abreger, nombres *mi-partis*, ont necessairement leur racine quarrée irrationnelle. Si l'on dispose ces racines selon leur ordre naturel, celle de 2, de 6, de 12, &c. & que sous elles on dispose selon le même ordre les impairs, 3, 5, 7, &c. le rapport de 1 à chaque racine des *mi-partis* sera exprimé par celui de

2 à

2 à l'impair correspondant, de manière que la difference ne fera jamais que d'une unité, & toujours en dessus. Le rapport de 1 à la racine de 2 premiere racine des mi-partis, est tel que ces deux quantités étant quarrées, le quarré de la plus petite est la moitié du quarré de la grande; or le quarré de 2 est la moitié du quarré de 3, premier impair, à cela près que le quarré de 3 excède d'une unité le double du quarré de 2. Le rapport de 1 à la racine de 6, seconde racine des mi-partis, est tel que le quarré de la plus petite de ces grandeurs est contenu six fois dans le quarré de la plus grande, & le quarré de 2 est contenu 6 fois dans le quarré de 5 second impair, si ce n'est que 25 excède 24 d'une unité. Le rapport de 1 à la racine de 12 est exprimé de la même manière par celui de 2 à 7, &c. & il est très-aisé de démontrer cette propriété de ces Suites de Nombres.

Les rapports successifs de 2 à tous les impairs, qui expriment ceux de 1 aux racines des mi-partis, sont extrêmement approchés puisqu'il n'y a dans les quarrés qu'une difference d'une unité, qui en emporte une bien moindre dans les racines dont il s'agit, & ces rapports sont très-réguliers, puisqu'on a toujours la même difference, & toujours du même côté.

Les nombres mi-partis ou leurs racines sont dans la Suite naturelle des nombres, des points fixes par lesquels on peut juger des rapports de 1 aux nombres irrationnels intermediaires. Ainsi puisque le rapport de

76 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

1 à la racine de 2, est celui de 2 à 3, & que celui de 1 à la racine de 6 est celui de 2 à 5, il faut que le rapport de 1 à la racine de 5 soit compris entre celui de 2 à 3, & celui de 2 à 5. Il faut que le rapport de 1 à la racine de 10 soit compris entre celui de 2 à 5, & celui de 2 à 7, & ainsi du reste.

Mais il y a plus, & on l'appërçoit déjà par ces exemples. Entre deux nombres mi-partis il y a toujours nécessairement un nombre quarré; entre 2 & 6 est 4, entre 6 & 12 est 9, &c. Le rapport rationnel de 1 à la racine de ces quarrés est nécessairement le même que celui de 2 au nombre moyen entre deux impairs. Le rapport de 1 à la racine de 4 est le même que celui de 2 à 4, qui est le nombre moyen entre 3 & 5. Le rapport de 1 à la racine de 2 est le même que celui de 2 à 6, nombre moyen entre 5 & 7, & toujours ainsi. Par conséquent le rapport de 1 à la racine de 5 est compris entre celui de 2 à 4, & celui de 2 à 5; le rapport de 1 à la racine de 10 est compris entre celui de 2 à 6 & celui de 2 à 7. Dans ce même intervalle est compris aussi le rapport de 1 à la racine de 11.

Le rapport rationnel de 1 à la racine d'un quarré étant donc toujours celui de 2 à un nombre pair, & le rapport de 1 à la racine du mi-parti qui suit ce quarré étant celui de 2 à l'impair qui suit le nombre pair posé, les rapports de 1 à toutes les racines irrationnelles des nombres qui sont entre le quarré & le mi-parti suivant sont comprises

prises dans le même intervalle. Ainsi le rapport de 1 à la racine de 49 étant celui de 2 à 14, & le rapport de 1 à la racine de 56, mi-parti suivant, étant celui de 2 à 15, le rapport de 1 aux racines de 50, 51, 52, 53, 54 & 55 sont entre le rapport de 2 à 14 & celui de 2 à 15. Tous les rapports de 1 aux racines de 57, 58, 59, 60, 61, 62 & 63 sont compris entre celui de 2 à 15 & de 2 à 16.

Plus un quarré & le mi-parti qui le suit ou le precede sont grands, plus il y a entr'eux de nombres intermediaires, & comme en quelque nombre qu'ils soient ils partagent toujours entr'eux un intervalle égal qui est celui du rapport de 2 à un nombre pair, & à l'impair suivant, il suit que cet intervalle est toujours partagé en plus petites parties, & plus elles devront être petites, moins il y aura d'erreur à craindre en partageant cet intervalle également pour avoir les racines des nombres intermediaires. En divisant en 6 parties égales l'intervalle qui est entre 14 & 15, on aura des nombres dont le rapport à 2 exprimera assés exactement les rapports des racines de 50, 51, 52, 53, 54 & 55 à 1. Cela sera encore plus vrai ou plus sûr, quand les nombres intermediaires étant en plus grand nombre dans des intervalles toujours égaux, ils y seront plus serrés, & les rapports moins differens.

On pourroit bien par quelques autres considerations diminuer encore le peu d'incertitude qui reste dans ces intervalles, & don-

ner quelques nouveaux points fixes sans sortir de cette petite Theorie, mais ce n'est pas la peine de la pousser plus loin, il sembleroit qu'on auroit voulu lui donner plus de relief qu'elle n'en merite.

Pour revenir à M. de *Lagni*, il promet d'étendre aux racines 3^{mes}, 4^{mes}, &c. ce qu'il ne donne ici que sur les 2^{des}. Le tout se liera necessairement avec ce que nous avons déjà rapporté d'après lui en 1722 * *sur la Resolution des Equations déterminées de tous les degrés*, car le plus souvent ces résolutions ne se terminent qu'à des racines irrationnelles quelconques, qui par les Methodes de M. de *Lagni* deviendront plus traitables, & en quelque sorte moins inconnues.

*-P. 88. & suiv.

LES combinaisons des Carreaux de deux couleurs mi-partis par une Diagonale, qui ainsi que nous l'avons dit en 1721 * avoient été traitées avec succès par le P. *Donat* Religieux Carme, l'ont été aussi par le P. *Meliton* de *Perpignan* Capucin, ancien Professeur en Theologie, & Gardien du Convent de *Perpignan*, qui a communiqué son Ouvrage à l'Academie. Elle y a trouvé beaucoup de travail & de methode. Il ajoûte à celui du P. *Donat* beaucoup de détail, & ce qui est considerable en cette matière, & le principal objet de l'Au-

*-P. 52.

l'Auteur, il détermine parmi un nombre innombrable d'arrangemens possibles de Carreaux le petit nombre de ceux qui forment les figures les plus agréables, & il en règle le choix. Il donne une pratique aisée & très-methodique pour l'exécution des divers desseins composés de ces figures.





GEOMETRIE.

SUR UNE PROPRIETE' DES POLYGONES.
inscrits ou circonscrits au Cercle.

* **M.** *Saurin* examinant une prétendue Quadrature du Cercle présentée à l'Academie, découvrit dans les Polygones inscrits & circonscrits au Cercle une propriété de même espece qu'une autre que l'on y connoissoit déjà. Celle-ci est que si on a deux Polygones réguliers, l'un d'un nombre de côtés quelconque, & que j'appelle *simple*, l'autre d'un nombre de côtés double, & que j'appelle pour cette raison le Polygone *double*, on a toujours en progression geometrique continuë, le Polygone *simple* circonscrit au Cercle, le *double* inscrit, & le *simple* inscrit, par exemple, le Triangle équilatéral circonscrit, l'Exagone inscrit, & le Triangle inscrit. Il est visible qu'il s'agit des aires de ces figures, & tout le monde fait qu'un Polygone circonscrit a une aire plus grande que le Polygone semblable inscrit, & que le circonscrit a une
aire

aire d'autant plus grande par rapport à celle du Cercle qu'il a moins de côtés, & l'inscrit au contraire une aire d'autant plus petite, d'où il suit que l'un & l'autre approchent d'autant plus de l'aire du Cercle qu'ils ont plus de côtés.

La nouvelle propriété due à M. *Saurin* est que le Polygone simple circonscrit, le double circonscrit & le double inscrit sont en progression harmonique, c'est-à-dire que le premier terme est au troisième, comme la différence du premier au second est à la différence du second au troisième. Tels seront donc le Triangle circonscrit, l'Exagone circonscrit, & l'Exagone inscrit. M. *Saurin* l'a démontré en general d'une manière très-aisée & très-courte.

Selon l'idée d'*Archimede*, la plus naturelle, & même la plus lumineuse de toutes celles qu'on peut jamais prendre pour la Quadrature du Cercle, si on conçoit un Polygone d'un nombre infini de côtés circonscrit, & un autre semblable inscrit au Cercle, le circonscrit & l'inscrit se confondent, leurs aires sont égales, & la même que celle du Cercle. Cette confusion ou cette identité ne se trouve que dans l'Infini, & nullement dans le fini, & quand on imagine qu'un Polygone circonscrit se confond avec le semblable inscrit, auquel cas l'un & l'autre devient le Cercle, on imagine ou l'on suppose nécessairement que ce Polygone a une infinité de côtés.

Il suit de la première propriété des Polygones que si dans la progression geometrique qu'elle donne, on suppose les deux termes

extrêmes égaux , le moyen le sera aussi , c'est à dire qu'un Polygone d'une infinité de côtés étant égal au Cercle , soit circonscrit ou inscrit , un autre Polygone d'un nombre infini de côtés deux fois plus grand n'en sera pas plus égal au Cercle , quoi-que dans le fini un Polygone approche d'autant plus d'être égal au Cercle qu'il a plus de côtés.

Il suit aussi de la seconde propriété qui donne une progression harmonique , que si on y suppose les deux derniers termes égaux , le premier le sera , c'est-à-dire qu'un Polygone d'une infinité de côtés étant égal au Cercle , un Polygone d'une infinité de côtés la moitié moindre , n'en sera pas moins égal au Cercle. Ainsi dès qu'un Polygone a une infinité de côtés , il ne gagne rien & ne perd rien par rapport à son égalité avec le Cercle pour avoir plus ou moins de côtés.

Il est vrai cependant qu'on peut concevoir la chose un peu autrement. Quand on imagine la confusion d'un Polygone infini circonscrit avec le semblable inscrit , cette confusion peut n'être pas une identité parfaite , mais laisser une différence infiniment petite qui ne sera pas comptée. Alors il sera toujours constant que plus un Polygone infini aura un grand nombre infini de côtés , plus il approchera d'être exactement égal au Cercle , ou plus sa différence infiniment petite avec le Cercle sera petite. Elle passera même par tous les ordres d'infiniment petit sans arriver jamais à être absolument nulle , ce qui fait qu'il est inutile de la considérer , & qu'il suffit de concevoir le Polygone égal

au Cercle comme ayant le moindre nombre infini possible de côtés.

De ce qui a été dit sur les deux progressions, l'une geometrique, l'autre harmonique, il suit que plus le Polygone simple a de côtés, plus les rapports de l'une & de l'autre progression sont petits. Par exemple, si l'on a ces deux progressions geometriques, l'une, le Triangle circonscrit, l'Exagone inscrit, le Triangle inscrit, l'autre, le Quarré circonscrit, l'Octogone inscrit le Quarré inscrit, les rapports de la 2^{de} sont moindres que ceux de la 1^{re}, c'est-à-dire que le Quarré circonscrit n'est pas si grand par rapport à l'Octogone inscrit que le Triangle circonscrit par rapport à l'Exagone inscrit, &c. Ces rapports doivent toujours aller en diminuant puisqu'on a vû que les termes de ces progressions arrivoient enfin à l'égalité. Il en va de même, & par la même raison, de la progression harmonique de M. Saurin.

SUR L'UNIVERSALITE' DES FIGURES.

ON voit du premier coup d'œil qu'il doit y avoir plus de Quadrilateres possibles que de Triangles, plus de Pentagones réguliers ou irréguliers que de Quadrilateres, &c. parce que dans la combinaison qui doit former tous les Quadrilateres, il entre plus d'Elemens, c'est-à-dire ici plus de côtés & d'angles changeans ou variables, qu'il n'en entre dans la combinaison qui forme les

84 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

Triangles, & ainsi des autres Polygones à mesure qu'ils ont plus de côtés, & par conséquent d'angles. On voit aussi que chacune de ces Espèces de figures doit en contenir une infinité, mais une infinité plus grande selon le Polygone, & apparemment même d'un ordre supérieur. C'est ce que M. *Saulmon* appelle l'*Universalité des figures*, & il s'agit de la déterminer.

Si l'on suppose que l'on ait la plus petite ligne finie possible, & qu'ensuite elle augmente toujours également, elle deviendra successivement une infinité de droites différentes, & enfin sera une droite infinie. C'est précisément la même chose que la Suite des nombres Naturels. Cet infini qui comprend toutes ces droites est un Infini du 1^{er} ordre. Il est vrai que l'on n'a pas la plus petite droite possible, & qu'avant celle qu'on a supposée, il y en a une infinité; il est vrai de plus qu'au lieu des accroissemens toujours égaux qu'on suppose qu'elle prend, elle en pourroit prendre une infinité de différens à chaque pas, de la même manière qu'entre deux nombres consécutifs quelconques de la Suite naturelle, il peut y en avoir une infinité, ce qui multiplieroit infiniment le nombre des termes de la Suite naturelle, & celui des droites, mais il n'importe, comme les droites ne sont susceptibles d'aucune composition, leur Infini est le moindre que l'on puisse considérer en cette matière, & il est toujours en ce sens le 1^{er} Infini, ou Infini du 1^{er} ordre.

Il en va de même de toutes les figures, qui quoi-que composées d'Elemens, ne le sont
sont.

sont que d'Elemens qui ne varient que d'une seule façon. Tels sont tous les Triangles semblables à un Triangle quelconque déterminé, qui ne peuvent varier que par la grandeur, & non par le rapport de leurs côtés, ni par leurs angles. Tels sont tous les Quarrés, & en general tous les Polygones réguliers. Leur Infini n'est que le même que celui des lignes droites.

Mais c'en sera un autre bien différent, si l'on considere tous les Triangles possibles, par exemple, dans toute la variété que peuvent y apporter la différente grandeur des côtés, & celle des angles. Voici comment on peut déterminer l'ordre dont sera leur Infini par rapport à celui des lignes droites, ou des Triangles semblables à un donné.

Je suppose qu'il n'y ait que 10 Triangles Equilateraux possibles, dont le 1^{er} & le plus petit possible a ses côtés de 1 pouce chacun, le 2^d de 2, &c. Je prends deux côtés du 1^{er}, & en augmentant l'Angle qu'ils font entr'eux, je lui donne pour base 2 pouces, côté du 2^d Equilateral, ensuite 3 pouces, côté du 3^{me} Equilateral, & toujours ainsi jusqu'à la base de 10 poudes, moyennant quoi j'aurai 9 Triangles Isoceles differens, mais dont les côtés égaux seront de 1 pouce. J'aurai de même pour chaque autre Equilateral 9 Triangles Isoceles, & par conséquent 90 Isoceles en tout.

Je prends maintenant le premier Isocele, dont les côtés sont 1, 1, & 2, & j'en fais un Scalene, en lui donnant pour côtés 1, 2 & 3, ensuite 1, 2 & 4, 1, 2 & 5, &c. c'est-à-dire que je lui laisse toujours deux côtés inégaux constants, & change le troi-

sième, ce que je puis faire 8 fois sur ce seul Ifofcele, & par conséquent 8 fois aussi sur chacun des autres 9 Ifofceles, & par conséquent les 90 Ifofceles me donnent 720 Scalenes.

Ce nombre des Scalenes est le produit de 10, 9 & 8, ou 10, 10 moins 1, 10 moins 2, 10 étant le nombre de tous les Equilateraux, 9 le nombre des Ifofceles que j'ai formés sur chaque Equilateral, 8 le nombre des Scalenes que j'ai formés sur chaque Ifofcele.

La somme de tous les Triangles possibles dans ma supposition est celle de 10, 90 & 720.

Je raisonnerai de même si je suppose qu'il n'y ait que 20 Equilateraux possibles. Le nombre des Scalenes sera le produit des trois nombres 20, 19 & 18.

Mais si je conçois que le nombre des Equilateraux est un Infini du 1^{er} ordre, comme il l'est réellement, alors le nombre des Scalenes est le produit de trois nombres, qui sont l'Infini, l'Infini moins 1, l'Infini moins 2, c'est-à-dire trois Infinis égaux, & il est un Infini du 3^{me} ordre. Et ce nombre des Scalenes est la somme de tous les Triangles possibles, Equilateraux, Ifofceles & Scalenes, car la somme des Equilateraux ne sera qu'un Infini du 1^{er} ordre, celle des Ifofceles un Infini du 2^d, & toutes deux seront nulles par rapport à la somme des Scalenes.

Puisque j'ai tous les Triangles qui sont possibles par la variation de la grandeur de leurs côtés, & du rapport de leurs côtés

entr'eux, j'ai en même temps tous les Triangles qui sont possibles par la variation de leurs angles, car le rapport des côtés étant déterminé, celui des angles l'est aussi.

L'Infini qui exprime le nombre de tous les Triangles possibles par la variation de leurs côtés est du 3^{me} ordre, c'est-à-dire que son exposant 3 est égal au nombre de toutes les especes possibles de Triangles pris par rapport à leurs côtés, car il faut ou que leurs trois côtés soient égaux, ou que deux seulement le soient, ou que tous trois soient inégaux. Donc pour avoir aussi le nombre de tous les Quadrilateres possibles pris par rapport à leurs côtés, il faut voir combien il y en a d'especes, & ce nombre fera un Infini dont l'exposant sera égal au nombre de ces especes. Or il ne peut y avoir que celles-ci. 1^{re} Espece. Les quatre côtés égaux. 2^{de}. Trois côtés égaux, & un inégal. 3^{me}. Deux côtés égaux, & deux autres égaux aussi, mais differens des premiers. 4^{me}. Deux côtés égaux, & deux inégaux. 5^{me}. Quatre côtés inégaux. L'Infini des Quadrilateres est donc du 5^{me} ordre, à ne considerer que leurs côtés.

Mais la détermination des côtés n'emporte pas celle des angles dans les Quadrilateres comme dans les Triangles, & si l'on considere les angles des Quadrilateres, leur Infini doit s'élever d'ordre. La 1^{re} Espece où les quatre côtés sont égaux, comprend également les Quarrés dont tous les quatre angles sont droits, & les Rhombes qui n'en ont aucun droit. Un Quarré étant déterminé de grandeur, il peut y avoir une infinité

mité de Rhombes qui auront les mêmes côtés, & par conséquent le nombre des Quadrilateres de la 1^{re} Espece est un Infini du 2^d ordre. De même la 3^{me} Espece où sont deux côtés égaux, & deux autres égaux differens, comprend tous les Parallelogrammes rectangles, & tous les Rhomboïdes; & pour chaque Parallelogramme rectangle il peut y avoir une infinité de Rhomboïdes. Cet Infini est donc encore un Infini du 2^d ordre. Pour les trois autres Especes, on verra aisément que l'Infini de chacune n'est qu'un Infini simple ou du 1^{er} ordre. Donc il faut ajoûter 2 à l'exposant de l'Infini total déjà trouvé, & le nombre de tous les Quadrilateres possibles, tant par rapport à la variation de leurs côtés qu'à celle de leurs angles, sera un Infini du 7^{me} ordre.

On pourroit appliquer cette Theorie aux Polygones suivans, au Pentagone, à l'Hexagone, &c. & peut-être trouveroit-on quelque progression réglée entre les exposans croissans des Infinis des differens Polygones consecutifs. Mais on s'en est épargné la peine, parce qu'on ne voit pas qu'il en dût resulter rien d'assés interessant. Ceci n'est que pour donner une idée de ce que M. *Saulmon* appelle l'Universalité des figures, & non pas même pour en donner une de sa Theorie, qui étoit assés differente.

Nous renvoyons entièrement aux Mémoires

* L'Ecrit de M. de *Beaufort* sur une Proposition élémentaire sur les Triangles.

† Et les dernières Remarques de M. *Saurin* sur un cas singulier du Problème des Tangentes.

* V. les M. p. 112. † V. les M. p. 321.





ASTRONOMIE.

*SUR L'APOGÉE ET LE PERIGÉE,
ou l'Aphélie & le Périhélie des Planètes.*

* **T**OUS les Corps célestes de notre Monde, ou Tourbillon Solaire, font des revolutions en ligne courbe autour d'un point, & comme les Courbes qu'ils décrivent ne sont point exactement des Cercles, & quelquefois en sont assés éloignées, & que ces points auxquels leurs mouvemens se rapportent ne sont point des centres de Cercles, il arrive necessairement qu'ils en sont inégalement éloignés en différentes parties de leur révolution. S'ils tournoient tous autour de la Terre, comme l'ont cru les premiers Astronomes, le point où ils en seroient les plus éloignés s'appelleroit *Apogée*, & le point opposé *Perigée*, mais maintenant que l'on sait, car comment se défendre du Systême de Copernic? que toutes les Planètes principales tournent autour du Soleil, il faut appeller *Aphélie* & *Périhélie*, ce qu'on eût appelé *Apogée* & *Perigée*. Cela n'empêche pas que ces Planètes principales ne soient tantôt dans leur plus grande, tantôt dans leur moindre dis-

tan-

tance de Terre , & qu'en ce sens elles ne soient dans leur Apogée & dans leur Perigée , mais parce que leurs mouvemens se rapportent au Soleil & non à la Terre , ces Apogées & ces Perigées sont en quelque sorte des points accidentels dans leur cours , & non pas des points essentiels , tels que les Aphelies & Perihelies. Il n'ya que la Lune , qui parce qu'elle tourne autour de la Terre , a un Apogée & un Perigée proprement dit. Si l'on connoissoit assés exactement les mouvemens des Lunes ou Satellites de Jupiter & de Saturne pour y reconnoître leurs plus grandes & plus petites distances à l'égard de leurs Planetes principales, il faudroit faire de nouveaux mots pour exprimer ces points de leurs Orbes. Quoi-que l'on soit persuadé que la Terre se meut autour du Soleil , on appelle toujours Apogée & Perigée ce qui est réellement Aphelie & Perihelie , mais c'est par la même raison que l'on dit toujours le lever & le coucher du Soleil. Une erreur , qui a long-temps dominé , laisse toujours des traces.

L'Aphelie , ou l'Apogée , car il suffit d'en parler , puisque le Perihelie & le Perigée leur sont toujours diametralement opposés , sont des points principaux dans les Orbes des Planetes , & dont la détermination influé sur toute la Theorie de leurs mouvemens. M. *Cassini* a rassemblé sur une matière si importante tout ce que les vûes des Astronomes qui l'ont précédé , & les siennes propres , ont pû lui fournir de plus exact & de plus facile dans la pratique.

Il faut prendre l'Aphelie ou l'Apogée par
rap-

rapport au point autour duquel la Planete se meut réellement. Il faut donc prendre l'Aphelie des Planetes principales par rapport au Soleil, c'est-à-dire, déterminer dans quel lieu du Ciel est l'Aphelie de ces Planetes dont le mouvement seroit vu du Soleil, où nous ne sommes pas. Si nous y étions, nous les verrions toujours dans leurs lieux *vrais*, nous verrions les inégalités *vraies* de leur mouvement, & quand nous aurions par observation deux parties ou arcs de leur Orbe éloignés l'un de l'autre où leur mouvement seroit égal, nous serions sûrs que le point précis du milieu seroit celui de l'Aphelie, ou répondroit à son lieu vrai dans le Ciel, car de part & d'autre de l'Aphelie ou de l'Apogée, à distances égales, le mouvement est égal. Mais de la Terre nous ne voyons point les Planetes dans leurs lieux vrais, à moins qu'elles ne soient sur la même ligne droite que le Soleil & la Terre, auquel cas nous les voyons dans le même lieu où elles sont vues du Soleil. Ce cas ne peut arriver que quand elles sont en conjonction, ou en opposition.

Les Planetes inferieures, Mercure & Venus, ne sont proprement qu'en conjonction, mais elles ont deux sortes de conjonction. L'une *superieure*, quand elles passent derrière le Soleil qui est entr'elles & nous, l'autre *inferieure*, quand elles passent entre le Soleil & nous. Dans la *superieure*, si elles passent précisément derrière le Soleil, elles nous sont absolument cachées, & si elles ont une latitude plus grande que le demi-diametre du Soleil, ou, ce qui est le même

même, qu'elles soient au dessus ou au dessous de cet Astre à quelque distance, comme elles sont alors dans leur plus grand éloignement de la Terre, elles sont toutes deux trop petites pour être vûës par la Lunette. Dans la conjonction inferieure, si elles passent sur le disque du Soleil, on les y verra comme des Taches, mais cela est très-rare; le plus souvent elles ont une latitude plus grande que le demi-diametre du Soleil, & en sont à quelque distance au dessus ou au dessous, mais alors Mercure est trop petit pour être vû, & il n'y a que Venus qu'on puisse apercevoir. Il est donc très-rare de voir de la Terre les deux Planetes inferieures dans leur lieu vrai.

A l'égard des Planetes superieures, Mars, Jupiter & Saturne, on ne les voit point dans leurs conjonctions, parce qu'alors elles sont ou immédiatement derrière le Soleil, ou si proches de lui, qu'elles sont absorbées dans sa lumière, & d'ailleurs elles sont alors dans leur plus grande distance de la Terre. Elles sont très-visibles dans leurs oppositions, qui arrivent au milieu de la nuit, & où elles sont dans leur plus grande proximité de la Terre, mais à peine chacune d'elles est en opposition une fois par an.

On n'a donc que peu d'observations des lieux vrais des Planetes, qui sont cependant les fondemens necessaires de la détermination des Aphelies.

Quant au Soleil & la Lune, nous avons toujours par observations leurs lieux vrais, puisque le Soleil est le point où se rapporte le mouvement de la Terre, & que la Ter-

re est celui où se rapporte le mouvement de la Lune.

Il faut pourtant remarquer que la Lune moins régulière que tous les autres Corps celestes connus, peut-être, comme nous l'avons quelquefois insinué, parce que nous la voyons de plus près, n'a pas toujours un mouvement égal à distances égales de son Apogée. Elle est sujette à certains écarts, non pas tout-à-fait imprévûs *, mais qui suffiroient pour rendre fautif un calcul où l'on auroit supposé un Orbe plus exact. Elle n'a de régularité sûre que dans ses conjonctions ou oppositions, & ce n'est qu'en ces temps-là qu'il faut compter que les points observés de son cours appartiennent à une même Courbe uniforme.

C'est donc une methode generale pour la détermination des Aphelies ou Apogées des Planetes, que d'avoir des observations de leurs lieux vrais en assés grand nombre pour y pouvoir choisir deux temps égaux, pendant lesquels le mouvement d'un lieu vrai à un autre ait été égal.

Si l'on n'a pas assés d'observations pour y trouver le mouvement vrai égal pendant deux differens espaces de temps égaux, on y peut suppléer ainsi. On ne laisse pas de déterminer l'Aphelie ou Apogée tel qu'il seroit si le mouvement vrai avoit été égal, il est certain que cet Aphelie ou Apogée est mal placé à proportion de ce que le mouvement a été plus inégal dans les deux temps. On prend ensuite un troisième espa-

ce

* V. l'Hist. de 1702. p. 101.

ce de temps égal aux deux premiers, & qui comprenne l'un ou l'autre presque entier, pendant lequel le mouvement ait été encore ou plus grand ou plus petit, & par le moyen de ce troisième espace de temps comparé à l'un des deux premiers, on fait une seconde détermination fautive de l'Aphélie ou Apogée. Mais entre les deux lieux faux où on l'a placé, se trouve celui où il est réellement, & on le détermine par la différence des deux lieux faux, dont on prend une partie proportionnelle aux différentes inégalités de mouvement qu'on a employées. C'est une Règle de fautive position appliquée à cette matière.

Cette Methode, quoi que generale dans la Theorie, ne peut guere être d'usage que pour le Soleil, à cause du grand nombre de lieux vrais qu'il faut avoir par observation, nous allons donner quelque idée d'une autre aussi generale, & qui peut être employée dans la pratique pour toutes les Planetes, qui ne demande absolument que trois observations, mais aussi qui suppose une connoissance de plus que la première.

Tous les Astronomes conviennent aujourd'hui que toutes les Planetes principales décrivent autour du Soleil, & la Lune autour de la Terre une Ellipse, que le Soleil est un des foyers des Ellipses des Planetes, & la Terre un des foyers de l'Ellipse de la Lune. L'Aphélie de chaque Planete est l'extrémité de son grand Axe la plus éloignée du foyer où est le Soleil, & le Perihélie l'autre extrémité, il en va de même de l'Apogée & du Perigée de la Lune.

Cha-

Chaque Ellipse est differente d'une autre, c'est-à-dire que le rapport du grand Axe au petit y est different, ce qui n'empêche nullement que le Soleil ne soit un foyer commun aux Ellipses de toutes les Planetes principales. Plus dans une Ellipse le rapport du grand Axe au petit est grand, plus l'Ellipse est differente d'un Cercle, & plus le mouvement qui se fait sur cette Ellipse est different de celui qui se feroit en même temps sur un Cercle correspondant, c'est-à-dire que le mouvement sur un Cercle étant uniforme, & faisant parcourir des espaces égaux en temps égaux, celui qui se feroit sur l'Ellipse ne le seroit pas, & seroit d'autant plus éloigné de l'être que cette Ellipse seroit plus differente du Cercle. Le mouvement de la Planete sur son Ellipse est son mouvement *vrai*, & celui qu'elle auroit sur un Cercle correspondant est le *moyen*. Celui-ci est toujours égal, & l'autre inégal.

Il suit de-là que selon la differente espece de chaque Ellipse, le mouvement vrai y est plus ou moins inégal par rapport au moyen, & réciproquement que le different rapport du mouvement vrai au moyen doit déterminer la differente espece de chaque Ellipse. Or l'espece d'une Ellipse étant déterminé, on a le rapport de son grand & de son petit Axe, & les deux extrémités de son grand Axe qui passe necessairement par le Soleil sont l'Aphelie & le Perihelie de la Planete.

On a toujours le mouvement moyen d'une Planete. Il faut avoir par trois observations trois de ses lieux vrais, ce qui donne le rap-

rapport de deux portions du mouvement vrai au moyen fait en même temps. Par-là on détermine sur l'Orbe de la Planete trois points qui doivent appartenir à une Ellipse, & comme la position de ces trois points entr'eux comparée à celle qu'auroient les trois points correspondans du mouvement moyen dépend du rapport de ces deux mouvemens, elle suffit pour déterminer la nature de l'Ellipse. Cela ne laisse pas de demander une construction geometrique assés compliquée, & assés fine. Feu M. *Cassini* a été le premier qui a imaginé cette Methode. C'est ce Problème dont nous avons parlé dans son Eloge en 1712 *, que les plus grands Mathematiciens jugeoient impossible, & qu'il resolut à 26 ans.

Il y a deux manières de prendre le mouvement moyen des Planetes, en supposant qu'elles décrivent des Ellipses. L'une est celle de *Kepler* qui divise l'Ellipse en Secteurs égaux terminés par des arcs inégaux, desorte que les aires des Secteurs representent le mouvement moyen, & les arcs le vrai. L'autre consiste à décrire un Cercle autour du foyer où le Soleil n'est pas. Nous les avons expliquées toutes deux en 1710 †. M. *Cassini* donne la methode de les employer l'une & l'autre dans la recherche des Aphelies par le rapport du mouvement vrai au moyen. Elles produisent quelque difference, mais legere, dans le lieu de l'Aphelie. Les Astronomes sont bien persuadés qu'il ne faut pas s'attendre sur ce point à

HIST. 1723.

E

une

* P. 110. † P. 138. & 139.

une aussi grande précision que sur quelques autres. Comme de ces deux manières celle de *Kepler* est la plus conforme à la Physique, ainsi que nous l'avons dit en 1710, il semble qu'elle mérite la préférence, & qu'il vaut mieux s'en tenir aux *Aphelies* qu'elle donne. Du moins elle est plus sûre, selon *M. Cassini*, pour les Planètes dont l'Ellipse est plus différente d'un Cercle, telles que Mars & Mercure. *M. Cassini* donne dans cette hypothèse une méthode nouvelle.

Aux méthodes générales se joint à l'égard du Soleil & de la Lune une méthode particulière qui n'a lieu que pour eux, fondée sur la variation de leur diamètre apparent. Il est bien certain que quand il est le plus petit, ils sont dans leur plus grand éloignement de la Terre, ou dans leur Apogée. Pour toutes les autres Planètes, leur diamètre apparent ne varie pas assez sensiblement pour donner prise, & on ne distingueroit pas assez les degrés successifs de sa variation.

On voit assez que ce qui a été fait à l'égard de deux mouvemens vrais égaux en deux temps égaux pour une Planète quelconque, il faudra le faire ici pour le Soleil & pour la Lune à l'égard de deux diamètres apparents égaux, & quand on les aura eus par observation, trouver les lieux vrais où étoit alors l'une ou l'autre Planète, & prendre le point du milieu de cet intervalle, qui sera le lieu vrai de l'Apogée.

Si les deux diamètres égaux du Soleil sont ceux qu'il a eus à deux différentes hauteurs Méridiennes, il faut ne les compter
pour

pour égaux qu'après qu'ils auront été corrigés selon la Refraction & la Parallaxe dûë à chaque hauteur. Mais s'ils sont pris à des heures où le Soleil ait été à la même hauteur sur l'Horifon, il n'y aura plus de correction à faire pour la Refraction ni pour la Parallaxe qui auront été égales de part & d'autre, puisque toutes deux ne varient que par rapport aux différentes hauteurs horizontales.

On ne peut avoir le diametre apparent de la Lune que dans l'opposition, puisqu'il n'est entier qu'en ce temps-là. Quand on ne laisse pas de voir la partie obscure du disque de la Lune aussi-bien que celle qui est éclairée, on n'a pas pour cela le diametre total, parce que la partie éclairée diminuë sensiblement par son éclat la grandeur apparente de l'obscure, & on ne sait pas précisément de combien. D'ailleurs, comme il a été dit, le mouvement de la Lune est trop peu régulier hors de ses conjonctions ou oppositions, & on pourroit se tromper sur ses lieux vrais, qu'il faut pourtant avoir dans une grande justesse pour la détermination de l'Apogée.

Il pourroit sembler que jusqu'ici nous avons laissé incertain si c'étoit un Apogée ou un Perigée, un Aphelie ou un Perihelie que l'on déterminoit, car ils se trouvent également l'un & l'autre entre deux mouvemens égaux ou entre deux diametres égaux. Mais le doute ne peut pas subsister long-temps, il ne faut que voir si les mouvemens ou les diametres alloient en augmentant de grandeur, en ce cas c'est sûrement un Apogée.

100 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE
ou un Aphelie qu'on a trouvé entr'eux, &
au contraire. D'ailleurs on fait déjà, du
moins à peu près, quels sont les lieux de
tous les Apogées ou Aphelies, & c'est de
part & d'autre de ces lieux-là qu'on cherche
des mouvemens ou des diametres égaux. Il
ne s'agit presque que de verifier, ou de dé-
terminer plus précisément, & plus l'Astro-
nomie se perfectionne, plus elle a de peine
à se satisfaire sur ce point.

SUR UNE COMETE.

* **D** EPUIS 1707 on n'avoit point obser-
vé de Comete, à l'exception d'une
qui ne fut vûë qu'à *Berlin* aux Mois de Jan-
vier & de Fevrier 1718. Cette année on
aperçut à l'Observatoire une Comete le 18
Octobre dans la Constellation du Capricor-
ne, & on ne put la suivre que jusqu'au 5
Novembre. Il seroit bon de se rappeler ici
tout ce qui a été dit sur le sujet des Come-
tes dans les Hist. de 1699 †, 1702 †, 1706 §,
1707 * & 1708 †.

La Comete vûë avec une Lunette de 16
pieds, avoit dans son milieu une lumière blan-
châtre & assés claire, le reste étoit une gran-
de chevelure ou nebulosité, toujours moins
éclatante & moins dense à mesure qu'elle
s'éloignoit de la tête de la Comete, confu-
se & mal terminée vers ses bords & à sa cir-
conference extérieure. Une observation
heureuse & singulière apprit à M. *Maraldi*
que

* V. les M. p. 360. † P. 87. & suiv. ‡ P. 85. & suiv.
§ P. 130. & suiv. * P. 129. & suiv. † P. 119. & suiv.

que cette nébulosité ou Atmosphere lumineuse étoit & fort transparente & fort grande par rapport au corps solide de la Comete, car il vit au travers de cette Atmosphere une petite Etoile fixe, & la vit presque jusqu'à ce qu'elle en eût touché le centre.

Par les Observations de 18 jours, & par la Theorie de feu M. *Cassini*, expliquée dans les Volumes cités, M. *Maraldi* trouva que la Comete alloit du Midi au Septentrion, décrivant assés exactement un grand Cercle qui coupoit l'Ecliptique au 8^{me} degré d'Aquarius, & en déclinoit de 15 degrés vers l'Occident, que le 14 Octobre elle avoit dû passer par son Perigée, qui se trouvoit entre la Constellation du Phenix, & la Fixe appelée *Canopus*, que comme cette partie du Ciel, qui est dans l'Hemisphère Austral, est invisible sur nôtre Horison, la Comete dans son Perigée, & avant que d'y arriver, n'avoit pû être vue, qu'elle n'avoit pû l'être que le 17 Octobre, où le temps fut couvert, qu'à son Perigée son mouvement étoit de plus de 17 degrés en 24 heures, que le 5 Novembre où l'on cessa de la voir, tant à cause des nuages, que du clair de Lune, son mouvement n'étoit plus que d'un tiers de degré, 50 fois moindre qu'au Perigée.

Si les Cometes étoient d'autant plus proches de la Terre que leur mouvement dans le Perigée seroit plus grand, celle-ci seroit une des plus proches qu'on ait observées, depuis qu'on a appris à les bien observer. On n'en connoitroit guere qui eût passé plus près qu'elle de la Terre, que celle de 1472 dont nous avons parlé en 1708, & à qui

P'on donne un mouvement de 40 degrés par jour, mais on ne la compte pas à cet égard pour bien sûre. Cette conséquence d'un plus grand mouvement à une plus grande proximité n'est pas legitime pour les Cometes comme elle peut l'être pour les Planetes. Le mouvement des Cometes ne paroît nullement se rapporter à la Terre. Il est déjà assés surprenant & assés peu conforme au Systême commun des Cometes que P'on ait trouvé par la parallaxe la seconde Comete de 1702 cinq fois seulement plus éloignée de la Terre que la Lune, celle-ci en seroit au contraire plus proche, car la Lune ne fait que 13 degrés par jour.

Il n'y auroit que la parallaxe qui pût donner sûrement la distance d'une Comete. Pour cela il faudroit suivre la methode inventée par feu M. *Cassini*, & expliquée en 1706 * sur la recherche de la parallaxe de Mars; c'est-à-dire; comparer au mouvement d'une Etoile fixe pendant une nuit assés longue le mouvement de la Comete, comme il y comparoit celui de Mars. Cela demande absolument que Mars ou la Comete se meuvent assés long-temps dans un même Cercle parallele à l'Equateur que la Fixe, autrement leur mouvement ne pourroit se comparer à celui de la Fixe par rapport à l'Horison, ainsi qu'il est necessaire peut découvrir une parallaxe. Mars dont le mouvement propre est selon le Zodiaque & à peu-près selon l'Ecliptique, peut bien décrire pendant une nuit un Parallele à l'E-

qua-

quateur , mais la Comete de cette année n'en pouvoit pas décrire un, puisque, comme on l'a vu , son mouvement coupoit l'Ecliptique. C'est ce qui a empêché M. *Maraldi* de pouvoir déterminer , ou même rechercher sa parallaxe.

On verra qu'elle a avec celle de 1707 quelques conformités qui pourroient la faire prendre pour la même Comete revenue au bout de 16 ans. L'une & l'autre alloit du Midi au Septentrion, elles ont coupé l'Ecliptique, ou, ce qui est le même, ont eu leur Nœud à 2 degrés près l'une de l'autre. D'un autre côté elles ne s'accordent pas sur des points essentiels. Leurs Orbites ont été différemment inclinées à l'Ecliptique, il est vrai que cette difference n'est pas plus grande que celle qu'on est obligé d'admettre dans la même Orbite de la Lune. Mais ce qu'on ne peut passer, c'est leur difference de mouvement au Perigée, celle de 1707 n'y avoit que 10 degrés par jour. Ce n'est pas, comme nous l'avons dit ailleurs, que ces differences empêchent absolument que deux Cometes ne soient la même, mais elles suffisent pour nous empêcher d'assurer qu'elles soient la même. Les Systèmes iroient bien vite, si nous voulions nous en croire, & un des plus grands efforts de l'esprit philosophique est d'attendre pour les établir que l'on ait assez de fondemens.

*SUR LA CONJONCTION DE MERCURE
avec le Soleil, du 9 Novembre.*

* **L**E mouvement de Mercure est difficile à connoître, & en effet peu sûrement connu jusqu'ici. Nous en avons parlé assés au long en 1706.† & 1707 ‡.

On n'a pû voir que depuis l'invention des Lunettes les conjonctions de Mercure avec le Soleil dans la partie inferieure de son Orbite, lorsque Mercure a assés peu de latitude pour passer dans le disque du Soleil, rencontres où il est le plus aisé de déterminer les lieux vrais de cette Planete, parce qu'ils ont alors les mêmes que ceux du Soleil, mais de ces conjonctions on n'en a eu que six dans le Siècle passé. Plusieurs Astronomes en esperoient ou en faisoient esperer par leurs Tables une 7^{me} à *Paris* le 5 Mai 1707, comme il a été dit dans l'Hist. de cette année-là. Mais il n'y en eut point, & pas même apparemment pendant la nuit. Mercure eut trop de latitude, & il ne passa point dans le Soleil.

Cette 7^{me} conjonction visible, ou ce 7^{me} passage de Mercure dans le Soleil, on l'espera encore à *Paris* en 1720, soit le 7 Mai après midi, soit le 8 au matin, soit en tout, soit en partie, car les différentes Tables varioient assés considerablement, ce qui n'est

* V. les M. p. 149. 372. 407. & 438. † P. 133 & suiv. ‡ P. 104. & suiv.

n'est pas étonnant à l'égard de cette Planete, mais il n'y eut point encore de passage, du moins le jour, & dans plusieurs lieux de l'*Allemagne*, plus Orientaux que *Paris*, où par conséquent on pouvoit plutôt voir le Soleil, & où il y a d'habiles Observateurs, on ne vit rien non plus, quoi-que le Ciel fût favorable.

On se tint plus sûr d'avoir enfin une conjonction visible le 9 Novembre de cette année, parce que les Tables s'accordoient à y donner peu de latitude à Mercure. M. *Delisle* le cadet calcula au Mois de Juin par les Tables de M. *de la Hire*, qu'à *Paris* Mercure devoit être en conjonction à 5^h 30' 20" après midi.

Il sera bon de donner quelque idée de la manière particulière dont M. *Delisle* se prit à faire ce calcul, & pour cela d'expliquer plus précisément ce que c'est que la conjonction dont il s'agit.

Comme la Terre se meut autour du Soleil dans le plan de l'Ecliptique, d'où son centre & celui du Soleil ne sortent jamais, c'est à ce plan que tout doit se rapporter. Si Mercure dont l'Orbite autour du Soleil est différente de l'Ecliptique, mais la coupe en deux points opposés, qui sont ses Nœuds, se trouvoit dans un Nœud, & de plus placé de telle sorte que son centre fût sur la même ligne droite que ceux de la Terre & du Soleil, on verroit de la Terre Mercure au centre du disque du Soleil, & ce seroit la conjonction la plus parfaite qu'il soit possible.

On fait que les Longitudes & les Latitudes sont par rapport à l'Ecliptique ce que

sont par rapport à l'Equateur les Ascensions droites, & les Déclinaisons. Mercure dans chacune de ses révolutions a deux conjonctions en longitude avec le Soleil, ou se trouve deux fois dans le même cercle de longitude que lui, l'une dans la partie supérieure de son Orbite, l'autre dans l'inférieure; ce n'est que dans l'inférieure que sa conjonction nous peut être visible, & afin qu'elle le soit, il faut qu'il passe par le disque du Soleil. S'il ne faisoit que le toucher, il s'en faudroit tout le demi-diamètre du Soleil qu'il ne fût en conjonction avec le Soleil de la manière dont on l'entend ici. Or Mercure peut avoir jusqu'à 5 degrés de latitude, ou s'éloigner de cette quantité du centre du Soleil, & le demi-diamètre du Soleil n'a que $\frac{1}{2}$ de degré, il doit donc arriver le plus ordinairement que Mercure ne passe point dans le disque du Soleil, ou ne soit point en conjonction avec lui, quoi-qu'il soit conjoint en longitude dans la partie inférieure de son Orbite.

Les Cercles de longitude, ou ceux par lesquels passe successivement Mercure selon son mouvement en longitude étant conçus menés par tous les degrés de l'Ecliptique & par ses Poles, les longitudes *vraies* de Mercure sont déterminées par ceux de ces Cercles où il seroit vû, étant vû du centre du Soleil; mais étant vû de la Terre, ses longitudes *apparentes* ne sont pas les mêmes que les vraies, parce que le point de vû est changé. On veut calculer une conjonction en longitude qui sera vûe de la Terre, & par conséquent il faut avoir les longitudes
des

des apparentes de Mercure. Les Tables Astronomiques ne donnent que les vraies, il faut donc réduire ces vraies en apparentes. M. *Delisle* évita le travail, & même le peril de cette réduction, car plus on calcule, plus il y a de peril d'erreur, en s'imaginant un Spectateur placé dans le Soleil, d'où il verroit Mercure passer vis-à-vis le disque de la Terre supposée immobile, car il est certain que le moment où Mercure fera conjoint en longitude avec le centre de la Terre, fera le même que celui où Mercure vû de la Terre seroit vû conjoint en longitude avec le centre du Soleil, ou sur le même Cercle de longitude. C'est ce moment qui devoit arriver à 5^h 30' 20".

Les Tables donnent pour ce même moment la latitude de Mercure, c'est-à-dire, son éloignement à l'Ecliptique ou au centre de la Terre, sur le disque de laquelle il est vû. On a donc la distance du centre de Mercure & du centre de la Terre sur le Cercle de longitude, perpendiculaire à l'Ecliptique, où ils sont alors tous deux. Comme on voit par les mêmes Tables que la latitude de Mercure est alors Septentrionale, & croissante, on voit qu'il a passé son Nœud ascendant, où ce Nœud est situé, à quelle distance il est du Cercle de longitude où se fait la conjonction, quelle est l'inclinaison de l'Orbite de Mercure sur l'Ecliptique, & par-là on décrit la route de Mercure sur le disque de la Terre. Une perpendiculaire tirée du centre de ce disque sur la route de Mercure, détermine le point où il est le plus proche du centre de

la Terre. Ensuite M. *Delisle* ayant aussi trouvé par les Tables quel est alors le mouvement horaire de Mercure, détermine en quels temps il doit décrire les portions de cette route, dont on a besoin. Il devoit arriver à 3h 23' 48" au point de sa plus proche distance au centre de la Terre, & par conséquent avant sa conjonction, car quand une conjonction ne peut être qu'en longitude, une moindre latitude, qui la précède ou la suit, n'y est point à considérer, & n'entre point dans l'idée de conjonction.

Il faut remarquer que dans la supposition présente, où la Terre est immobile, & où par conséquent le Soleil se meut aussi-bien que Mercure, le mouvement horaire apparent de Mercure est composé de son mouvement vrai & de celui du Soleil à l'égard du Spectateur que nous avons placé dans le Soleil, de sorte que si Mercure & le Soleil vont du même sens, le mouvement horaire apparent de Mercure, qui est celui dont on a besoin, en est plus petit, & on l'aura en retranchant de son mouvement vrai trouvé par les Tables celui du Soleil. Ce sera le contraire pour le cas opposé. Or nous sommes ici dans le 1^{er} cas; Mercure qui dans sa conjonction inférieure est *retrograde* à l'égard de la Terre, ou va d'Orient en Occident, est *direct* à l'égard du Soleil, & va toujours d'Occident en Orient, & le Soleil, à qui l'on donne le mouvement de la Terre, doit être conçu avec cette même direction de mouvement.

Si l'on veut reprendre la réalité, c'est-à-dire, remettre le Spectateur sur la Terre,
il

il est clair qu'il n'y aura rien de changé pour l'heure de la conjonction, pour la route de Mercure sur le disque du Soleil, pour la plus petite distance à l'égard du centre du Soleil, pour l'heure où il sera à cette plus petite distance. Mais il manque le temps de l'entrée de Mercure dans le disque du Soleil, & celui de sa sortie, & on ne les peut avoir immédiatement par l'entrée de Mercure sur le disque de la Terre, & sa sortie, parce que le disque de la Terre & celui du Soleil sont differens en grandeur. Voici comment M. *Delisle* suppléoit à cela.

Si l'on conçoit des rayons tirés de tous les points de la circonférence du Soleil au centre de la Terre, il se formera un Cone de lumière dont l'angle du sommet aura pour base ou pour mesure le diamètre du Soleil que l'on connoît pour chaque moment, & l'axe sera la distance connue de la Terre au Soleil. Quand Mercure entre dans ce Cone, il en intercepte quelques rayons, & c'est-là le moment où il sera vû de la Terre éclipser une petite partie du Soleil, ou, ce qui est le même, entrer dans le disque du Soleil. Pour déterminer ce moment, il faut savoir à quel point du Cone Mercure y entrera, & ce point dépend de la distance où Mercure est alors de la Terre qui est au sommet du Cone, & du Soleil qui est à la base. Or ces deux distances sont connues par les Tables. M. *Delisle* détermina par cette voye que Mercure vû de la Terre, entreroit dans le Soleil à $2^h 45' 38''$ après midi, & qu'il en sortiroit à $8^h 1' 58''$, & par conséquent son passage qui devoit être à peu

FIO HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

près de 5^h $\frac{1}{2}$, ne pouvoit être visible que pendant moins de 2^h.

La fiction ou supposition de ce Cone ne changeoit rien à la première supposition que M. *Delisle* avoit faite du Spectateur placé dans le Soleil, car si ce Cone eût été visible, ce Spectateur eût vû Mercure y entrer dans le même moment où la Terre l'eût vû entrer dans le Soleil.

Selon M. *Halley*, fameux Astronome Anglois, qui avoit calculé cette conjonction en 1691, Mercure devoit entrer dans le Soleil à Paris un peu plus tard que par le calcul de M. *Delisle*, encore plus tard selon les Ephemerides de M. *Manfredi*, célèbre Astronome Italien. Selon M. *Manfredi* il devoit avoir plus de latitude, encore plus selon M. *Halley*. Pour les trois différentes routes déterminées par ces deux Astronomes, & par les Tables de M. de la Hire, elles étoient assés exactement paralleles.

Le 9 Novembre arriva, & le temps fut favorable. Mrs. *Cassini*, *Maraldi* & *Delisle* observerent la conjonction. Nous parlerons d'abord des observations des deux premiers, qui furent faites ensemble.

Ils considererent Mercure à chaque moment comme une Tache fixe dont il faudroit déterminer par observation l'Ascension droite & la Déclinaison à l'égard du centre du Soleil. De cette Ascension droite & de cette Déclinaison on tire la Longitude & la Latitude. Une suite de plusieurs longitudes & latitudes de Mercure par rapport au centre du Soleil, ainsi conclues pour plusieurs momens, sont une suite de points de la route de

de Mercure dans le Soleil, ou, ce qui est le même, de son Orbite par rapport à l'Écliptique. Reste donc à savoir comment on prendroit dans un moment quelconque l'Ascension droite & la Déclinaison d'une Tache fixe par rapport au centre du Soleil.

Dans le Foyer commun de l'Objectif & de l'Oculaire d'une Lunette, il y a quatre fils qui se croisent dans l'axe de la Lunette, un horizontal, un vertical, & deux obliques qui font, tant avec l'horizontal qu'avec le vertical, un angle de 45 degrés. On pose la Lunette sur la Machine *Parallactique*, dont il suffira de dire que la Lunette qui y est posée suit toujours, en se dirigeant à l'Astre, le mouvement diurne de cet Astre, ou, ce qui est le même, le Parallele qu'il décrit.

Si le Soleil est au Meridien, & que l'on fasse toucher son bord supérieur ou inférieur par le fil horizontal, ce fil représente une Tangente ou une très-petite portion du Parallele que le bord touché décrit, & il est proprement horizontal. Si à toute autre élévation du Soleil, excepté le cas où il seroit à l'Horison, on fait toucher son bord supérieur ou inférieur par ce même fil, il n'est plus horizontal, mais il est toujours une portion du Parallele où est le bord touché, & le vertical toujours perpendiculaire à ce fil, représente toujours le Meridien qui coupe ce Parallele. Nous donnerons toujours au fil nommé d'abord horizontal le même nom, en sousentendant qu'il prend en un jour les positions de toutes les Tangentes d'un Parallele. C'est de cette façon que

III2 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

que l'on suit toujours le mouvement diurne d'un Astre.

Si l'on dispose la Lunette de façon que les deux fils obliques soient deux Tangentes du 1^{er} bord du Soleil qui est l'Occidental, ou plutôt que la moitié de chacun de ces fils ; la moitié supérieure de l'un , & l'inférieure de l'autre soient ces Tangentes, il est clair que puisque ces fils font chacun le même angle avec le fil vertical, le centre du Soleil décrira la ligne exactement moyenne entre les deux fils ou le fil horizontal. On aura par observation le temps qu'il emploiera à parcourir ce fil , par ce temps la quantité de degrés ou plutôt de minutes dont est ce fil , portion du Cercle diurne que le Soleil décrit alors. Si ce Cercle est l'Equateur, on a le diamètre du Soleil en parties de l'Equateur , ce qui est sa vraie mesure ; si le Cercle est un Parallele, on en réduit les degrés ou minutes à des degrés ou minutes de l'Equateur par une proportion très-connuë.

Réciproquement si le centre du Soleil décrit le fil horizontal , ses bords, lorsqu'ils sont aux fils obliques, sont touchés en même temps par la moitié supérieure d'un de ces fils , & par l'inférieure de l'autre, & s'ils ne le sont pas, le centre du Soleil n'est point dans le fil horizontal. Par la différence qui se trouve entre le temps où le même bord du Soleil est touché par un fil oblique, & le temps où il l'est par l'autre , on voit combien il s'en faut que le centre du Soleil ne soit dans le fil horizontal ; ou quelle est

est la distance de ce centre à ce fil , & on fait de quel côté est cette distance selon que le fil supérieur ou l'inférieur a été touché le premier.

La Lunette étant disposée de manière que le centre du Soleil parcourt le fil horizontal, la moitié du temps qu'il emploie à le parcourir est le temps où il est arrivé à l'intersection des quatre fils , ou au centre de la Lunette, ou au fil vertical. Si dans ce même moment une Tache est arrivée aussi à un autre point du fil vertical, il est clair que la distance de ce point au centre de la Lunette est la différence de la déclinaison du centre du Soleil , & de celle de la Tache. Cette distance est une grandeur aisée à connoître, parce qu'on fait le rapport de grandeur du fil horizontal , & par conséquent de tous les autres au diamètre du Soleil. On a toujours d'ailleurs par les Tables la déclinaison du Soleil , & par conséquent celle de la Tache. Si la Tache n'est pas sur le fil vertical dans le même moment que le centre du Soleil, on voit en quel moment elle est arrivée à un fil oblique , la différence de ces deux momens étant convertie en minutes de Cercle , on a la grandeur de la ligne tirée du point où la Tache a rencontré le fil oblique sur le fil vertical. A cause de l'angle de 45 degrés que font les obliques , cette ligne est égale à celle qui seroit prise sur le fil vertical, & mesureroit la différence de déclinaison entre la Tache & le centre du Soleil. On voit immédiatement de quel côté est cette différence, si elle est Septentrionale, ou Meridionale.

Si

Si l'on met la Tache dans le centre de la Lunette, le centre du Soleil n'y viendra point, & par conséquent il y aura différence de déclinaison entre ce centre & la Tache, à moins que quand un bord du Soleil viendra à être touché par un fil oblique, il ne le soit en même temps par l'autre. Si cela n'est pas, on verra qu'il y aura différence de déclinaison, & quelle elle sera, & de quel côté.

Quant à la différence entre l'ascension droite du Soleil toujours connue & celle de la Tache, elle se conclut de la différence entre le temps où le centre du Soleil passe par le fil vertical, & le temps où la Tache y passe, car ce fil représente une portion de Meridien, & c'est pourquoi on l'appelle aussi *horaire*.

Par plusieurs observations de cette espèce, dont chacune, comme il a été dit, donnoit un point de la route de Mercure dans le disque du Soleil, cette route y ayant été tracée, on eut sa grandeur & son rapport au diamètre du Soleil, & l'on connut de quelle quantité étoit la portion que Mercure en parcouroit en une heure, ou son mouvement horaire apparent. L'Ecliptique ayant aussi été tracée sur le disque du Soleil selon la méthode expliquée en 1707*, on eut l'inclinaison de la route ou de l'Orbite de Mercure sur l'Ecliptique, telle qu'elle est vûe de la Terre, & rapportée au Soleil, car vûe du Soleil, elle est différente.

Il paroît assés qu'elle doit l'être à cause des deux différens points de vûe, mais il

ne

ne paroît pas de même que vûë de la Terre, elle doit être plus grande, au contraire la Terre étant plus éloignée de Mercure que Mercure ne l'est du Soleil, on croiroit d'abord que l'inclinaison de l'Orbite de Mercure sur l'Ecliptique devoit paroître plus grande vûë du Soleil que vûë de la Terre. Mais il est vrai qu'elle peut paroître ou plus ou moins grande, & voici d'où cela vient. Le rapport du mouvement horaire de Mercure en longitude à son mouvement horaire en latitude est ce qui détermine son inclinaison, car ces deux mouvemens sont représentés par deux droites, qui avec une portion correspondante de l'Ecliptique font un Triangle rectangle, puisque la ligne de la latitude coupe toujours l'Ecliptique à angles droits; & par conséquent le rapport du mouvement en longitude au mouvement en latitude fait en même temps, ou le rapport des deux lignes qui les représentent, détermine l'angle sous lequel le mouvement total de Mercure composé des deux coupe l'Ecliptique. Si le mouvement en latitude étoit nul; il n'y auroit point d'inclinaison du mouvement ou de l'Orbite de Mercure sur l'Ecliptique, si le mouvement en latitude étoit égal au mouvement en longitude, l'Orbite seroit inclinée sur l'Ecliptique de 45 degrés. Mercure étant vû du Soleil, on voit son mouvement vrai en longitude, & son mouvement vrai en latitude; & leur rapport détermine l'inclinaison vraie de l'Orbite. Mais si Mercure est vû de la Terre, les deux mouvemens ne paroissent plus les mêmes. Tous deux sont changés,

parce

parce qu'étant vûs de plus loin , ils font vûs plus petits, & outre cela le mouvement en longitude est très-considérablement altéré dans les conjonctions , où Mercure étant dans la moitié inférieure de son Orbite, est rétrograde , & beaucoup plus lent. Nous avons expliqué en 1709* pourquoi les Planetes font plus lentes dans leurs rétrogradations. Le rapport des deux mouvemens de Mercure vû de la Terre étant changé , peut donc être plus grand, quoi que les deux mouvemens soient en eux-mêmes plus petits; or il est effectivement plus grand, & par conséquent l'inclinaison apparente de son Orbite sur l'Ecliptique plus grande que la vraie.

M. *Cassini* conclut de ses Observations l'entrée de Mercure dans le Soleil à 2^h 50' 30", sa conjonction à 5^h 28' 56", sa sortie à 7^h 43' 14", ce qui diffère très-peu des prédictions de M. *Delisle*, & prouve beaucoup en faveur des Tables de M. *de la Hire* sur la moins connue de toutes les Planetes. Nous passerons sous silence la détermination de l'inclinaison de son Orbite, du lieu de ses Nœuds, &c. pour en venir à quelques remarques plus généralement intéressantes.

Le mouvement horaire moyen de Mercure vû du Soleil est de 10' 14" selon M. *de la Hire*, & le vrai étoit alors de 12' 46". Vû de la Terre pendant son passage par le Soleil, il ne fut que de 6' 4". La raison en est la rétrogradation.

Quand

* P. 104. & suiv.

Quand Mercure entré dans le Soleil en touchoit encore le bord Oriental par où il étoit entré, & par conséquent avoit parcouru sur le disque du Soleil un espace égal à son diamètre apparent, M. *Cassini* observa en combien de temps il parcourroit encore un espace de la même longueur. Ce fut en 1' 18". Ce temps converti en minutes de degré, & de plus en minutes qui appartenissent au diamètre du Soleil, donna un espace de plus de 7", qui étoit donc le diamètre de Mercure vû de la Terre.

On fait que la parallaxe du Soleil est de 10" au plus, ou, ce qui est le même, que le demi-diamètre de la Terre vû du Soleil feroit de 10", & par conséquent qu'une grandeur égale au diamètre de la Terre vû de la Terre sur le Soleil feroit de 20". Pour comparer à cette grandeur le diamètre de Mercure, il faut concevoir Mercure porté jusqu'à la distance de la Terre où est le Soleil, & alors son diamètre apparent diminuera selon la raison qui est entre la distance de la Terre à Mercure dans sa conjonction inférieure, & la distance de la Terre au Soleil. Si l'on prend ces distances selon la règle de *Kepler*, qui donne le rapport des distances aux revolutions, on trouvera que la distance de la Terre au Soleil étant 5, celle de Mercure dans sa conjonction inférieure est à peu près 2, que par conséquent sa distance à la Terre étoit 3, & que si à la distance 3 son diamètre a été de 7", il ne doit être que d'un peu plus de 4" vû à

la distance 5, c'est-à-dire à celle où est le Soleil. Le diametre de Mercure ne seroit donc guere que la 5^{me} partie de celui de la Terre, & la Terre seroit 125 fois plus grosse que Mercure. M. *Cassini* trouve par une autre, mais sur le fondement de la même observation, que le diametre de Mercure n'est que 4 fois plus petit que celui de la Terre, & alors Mercure est égal à la Lune. Ce qui peut rapprocher les deux calculs, qui vû le sujet ne different pourtant pas beaucoup, c'est que les nombres 5 & 2 tirés de la regle de *Kepler*, ont été pris peu exacts pour la commodité.

Mercuré fut toujours vû fort noir, fort rond, bien terminé, & sans aucune nebulosité qui l'environnât. On en avoit soupçonné une dans une conjonction pareille observée en 1697, mais cette année on n'en put absolument découvrir, même avec une Lunette de 34 pieds. Il y a donc toute apparence que Mercure n'a point d'Atmosphère. Puisque la nôtre augmente par sa densité l'impression de chaleur que nous portent les rayons du Soleil, Mercure n'avoit pas besoin d'en avoir une.

M. *Delisle* observa d'une autre manière ce même passage de Mercure dans le Soleil. Il falloit que M^{rs}. *Cassini* & *Maraldi* changeassent souvent la position du fil horizontal de leurs Lunettes, afin de lui faire toujours suivre le Parallele du Soleil, & qu'ils le rendissent toujours Tangente d'un bord, ce qui emporte du temps par les frequentes repetitions, & le passage visible de Mercure devoit être assés court. Feu M. *Cassini* avoit
pra-

praticqué une autre methode en 1697 pour un autre passage de Mercure qui devoit aussi durer peu, & il l'avoit choisie pour aller à l'épargne du temps. M. *Delisle* s'en servit, & voici en quoi elle consiste.

On laisse le fil horizontal de la Lunette toujours horizontal, & coupé à angles droits par le vertical, les obliques sont supprimés, ou n'ont point d'usage, mais on met deux horizontaux, dont la distance peut changer, & est toujours connue. Le fil horizontal represente donc toujours ou l'Horison, ou un petit Cercle parallele à l'Horison, qu'on appelle *Almicantarath*, & le vertical represente toujours un Azimuth. Les Azimuths sont à l'égard de l'Horison & des *Almicantaraths* ce que sont les Meridiens à l'égard de l'Equateur & des Paralleles, ils coupent l'Horison & tous les *Almicantaraths* à angles droits, & concourent tous aux Poles de l'Horison, qui sont le Zenith & le Nadir. Par les temps du passage du centre du Soleil & de Mercure, chacun par un même fil horizontal, & chacun par le fil vertical, on a la distance des *Almicantaraths* & des Azimuths où ils sont chacun. Or ils ne sont en differens *Almicantaraths* & en differens Azimuths que parce qu'ils sont en differens Paralleles & en differens Meridiens, ou, ce qui est le même, parce qu'ils ont differente déclinaison, & differente ascension droite. On tire donc delà leur déclinaison & leur ascension droite, & delà enfin leur latitude & leur longitude.

Il est visible que cette methode demande plus de calcul que l'autre, où la déclinaison

fon & l'ascension droite se tirent immédiatement de l'observation, mais en recompense elle peut fournir dans un même temps un plus grand nombre d'observations, & par conséquent de points qui détermineront la route de Mercure dans le Soleil.

Elle a encore cet avantage, que les Refractions n'y peuvent causer aucune erreur, & que l'on n'est pas obligé d'y avoir égard. On prend le centre du Soleil & Mercure à la même hauteur horifontale, & par conséquent la refraction les a également élevés, & la difference entre leurs hauteurs vraies est la même qu'entre les apparentes. Cela ne pourroit être autrement que dans le cas où il seroit fait un changement subit de refraction entre le passage d'un Astre & celui de l'autre par le même fil horifontal, mais ce temps est trop court, & d'ailleurs on a observé que ces changemens soudains n'arrivent qu'au lever du Soleil, & rarement. L'observation dont il s'agit fut faite le soir. *Mrs. Cassini & Maraldi* ne compterent pas sur leurs dernières observations, parce que les refractions étoient alors trop grandes, & *M. Delisle*, en vertu de la pratique qu'il suivoit, eut des observations du même temps qu'il crut aussi sûres que les autres.

Pour la difference de Parallaxe, qui appartient à deux Astres, parce qu'ils sont différemment éloignés de la Terre, cette methode ne la sauve pas, mais elle ne pouvoit être que si legere, que ce n'étoit guere la peine d'y avoir égard. Cependant pour plus de sûreté, *M. Delisle* supposa,

se-

ſelon les Tables de M. de la Hire, que Mercure avoit 3" de parallaxe plus que le Soleil.

Pendant 1^h 40' que M. *Delisle* put voir Mercure dans le Soleil, il fit 52 observations, dont 62 déterminoient l'Almicantarath de Mercure à l'égard du Soleil, & les 26 autres ſon Azimuth. Ce grand nombre de points ainſi déterminés dans la route de Mercure, devoit en augmenter la juſteſſe & la précifion. Ses déterminations s'accorderent aſſés & avec ce qu'il avoit prédit lui-même, & avec celles de M^{rs}. *Caffini* & *Maraldi*.

Pour mieux faire voir cet accord, M. *Delisle* prit quelques-unes des dernières latitudes de Mercure, telles que M^{rs}. *Caffini* & *Maraldi* les avoient conclues de leurs observations, & qui différoient trop de celles qu'il avoit trouvées pour les mêmes momens, & il montra que réellement ils convenoient enſemble. La methode de M^{rs}. *Caffini* & *Maraldi* étoit ſujette aux Refractions, qu'ils avoient cependant négligées dans leurs dernières observations, parce qu'ils avoient aſſés d'observations précédentes, où elles avoient pû effectivement être négligées ſans erreur ſenſible. Les latitudes tirées de ces dernières observations ſe ſentoient donc de ce défaut, car les refractions n'atèrent que les élévations horiſontales, & ces élévations n'ont rapport qu'aux déclinaifons, & les déclinaifons aux latitudes. La methode de M. *Delisle* étoit indépendante des refractions. De là il arrivoit que ſes dernières latitudes ne devoient pas convenir avec celles des deux autres Aſtronomes, mais en rectifiant

les leurs sur le pied des refractions , dont la variation est allés connuë , tout se remettoit d'accord.

Sur cela M. *Delisle* donna une methode qu'il avoit trouvée pour calculer la véritable position de Mercure dans le Soleil , quand les observations auroient été faites par une methode sujette aux refractions , & dans un temps où il auroit fallu les compter.

Tout le monde s'est aperçu que près de l'Horison le disque du Soleil est très-sensiblement alteré , son diametre vertical est plus court que l'horisontal , parce que la refraction étant inégale , & élevant d'autant moins un objet qu'il est plus haut sur l'horison , l'extrémité supérieure du diametre vertical du Soleil est moins élevée par la refraction que l'inférieure , ce qui fait le même effet que si ce diametre étoit réellement raccourci ; pour l'horisontal , il ne peut recevoir dans ses parties aucune inégalité d'élevation. Si Mercure est alors dans le Soleil , ses positions doivent donc être alterées en ce qu'elles ont de vertical , & il faut les réduire au vrai. M. *Delisle* suppose que le Soleil est devenu une Ellipse exacte , dont le petit axe est le diametre vertical raccourci selon la refraction de ce moment-là , & par-là il connoît la nature de l'Ellipse , ou la distance de ses foyers , qui dépend du rapport des deux axes. Cela posé , il donne une methode geometrique pour réduire les positions apparentes de Mercure aux vraies. Il semble que les Mathematiciens d'aujourd'hui se croient trop heureux d'avoir encore des difficultés à éclaircir.



OPTIQUE.

SUR LES OMBRES DES CORPS.

* **S**I l'on vouloit prouver combien le Physique est quelquefois différent du Geometrique, combien l'exécution réelle des choses s'éloigne de ce que la Geometrie en auroit attendu par ses calculs, rien n'y seroit peut-être plus propre que le sujet qui va être traité. Ce n'est pas qu'il n'y ait de la Geometrie par-tout sans nulle exception, mais elle est ordinairement fort compliquée, & celle qui avoit fondé nos raisonnemens étoit trop simple pour attraper juste les effets tels qu'ils sont.

Nous avons parlé en 1711 † de l'Ombre & de la Penombre de la Terre ou de la Lune, d'où dépendent les Eclipses, & nous supposerons ici ce qui en a été dit. Le Triangle d'Ombre véritable de la Terre est formé du diametre de la Terre, & de deux rayons partis des deux extrémités du Soleil, & prolongés jusqu'à ce qu'ils concourent au de-là de la Terre. Ce Triangle est isos-

F 2

cele,

* V. les M. p. 157. † P. 96. & suiv.

124 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

cele, son angle du sommet est mesuré par le diametre apparent du Soleil qui est de $32'$, d'où l'on conclut par la Trigonometrie que la perpendiculaire tirée du sommet de ce Triangle sur sa base, où la longueur de l'ombre est de 110 diametres de la Terre, ou de 330 mille lieues. Or la Lune n'est éloignée de la Terre que de 100 mille lieues tout au plus, d'où il suit que quand elle s'éclipse, elle tomberoit dans l'ombre véritable de la Terre à moins d'un tiers de sa longueur, qu'elle devroit absolument disparoître dans une ombre si épaisse, & disparoître pour un long temps. Cependant elle ne disparoit presque jamais, & on la voit toujours assés lumineuse, & seulement rougeâtre, ce qui marque sûrement qu'elle n'est que dans la Penombre. Il y a donc là du physique qui dérange beaucoup le geometrique.

M. *Maraldi* a fait un grand nombre d'Experiences pour éclaircir cette matière, non seulement par rapport à l'Optique, qui à mesure qu'elle sera plus étudiée, donnera toujours des phenomenes plus curieux, & auxquels on se seroit moins attendu. M. *Delisle* le cadet avoit déjà donné en 1717 ses experiences & ses reflexions sur cette même partie de l'Optique.

Que l'on expose au Soleil un Cylindre quelconque, il sera fort naturel de croire, selon la petite Théorie de 1711, qu'en supposant ce Cylindre vertical, & en ne considérant dans le solide de son ombre qu'un plan horizontal, il n'arrivera rien autre chose, sinon qu'il y aura un Triangle d'ombre veri-

veritable dont le sommet ou la pointe se terminera à quelque distance du Cylindre, & aux deux côtés de ce Triangle une Penombre infinie, mais toujours plus claire, de sorte qu'elle cessera bien-tôt d'être sensible, quoi-qu'elle le soit encore à une distance où le Triangle d'ombre n'existe plus. Si l'on met donc verticalement derrière le Cylindre une superficie blanche, que l'on éloignera successivement du Cylindre tant qu'on voudra, on y verra toujours une ombre noire & également noire, mais toujours plus étroite jusqu'à une certaine distance du Cylindre qui sera de 110 diametres de ce Cylindre, car cela doit être égal pour tous les corps exposés en plein Soleil, après quoi l'ombre disparaîtra, & on verra toujours à ses deux côtés une Penombre, toujours plus large & plus claire, qui ne disparaîtra qu'à une distance plus grande. Voilà tout ce que la Geometrie donne, & tout ce qu'elle fait prévoir, mais le fait est bien différent.

L'Ombre veritable ne s'étend, en demeurant uniforme & également noire, qu'à une distance plus de la moitié moindre que les 110 diametres du Cylindre. Passé cela, son milieu devient une Penombre, & elle ne conserve de ce qu'elle devoit être que deux traits noirs fort étroits qui terminent cette penombre de part & d'autre selon sa longueur. Ces deux traits sont de la noirceur qui appartient à l'ombre veritable. On reconnoît encore tout cet espace pour être celui que cette ombre devoit occuper, à ce qu'il est de la largeur qui convient à la distance. De plus si on augmente la distance

où l'on a commencé à voir cette penombre, l'espace total qu'elle occupe avec les deux traits noirs diminué toujours de largeur, comme doit faire celui de l'ombre véritable, seulement la penombre, en s'étrecissant, s'éclaircit toujours, les traits noirs gardant la même noirceur & la même largeur, & enfin à la distance des 110 diametres ou à peu près, les deux traits noirs qui se sont toujours approchés se confondent en un, après quoi l'ombre véritable disparoît, & il n'y a plus que de la penombre. Comment l'ombre véritable qui a retenu toute l'éendue de son cours naturel, & sa projection triangulaire, s'est elle changée en penombre pendant plus de la moitié de ce cours, à l'exception de ces deux extrémités, qui sont demeurées inalterables ? Nous appellerons cette penombre qui tient la place presque entière de l'ombre véritable, *fausse penombre*, pour la distinguer de celle qu'on a toujours appelée ainsi.

Il se fait encore une apparence imprévûë. Quand l'ombre est reçûë assés proche du Cylindre, & qu'elle n'a point encore dégénéré en *fausse penombre*, on voit que la vraie penombre placée, comme elle doit l'être, des deux côtés de l'ombre, est terminée en dehors par deux traits de lumière plus vifs & plus éclatants que la lumière même qui vient directement & à plein du Soleil. Ils s'élargissent & s'affoiblissent toujours à mesure que l'ombre est reçûë plus loin du Cylindre. D'où leur vient cet éclat plus grand qu'il ne devrait être, puisqu'il n'y en a point au dessus de celui de la lumière directe ?

recte ? Quant à la vraie penombre, elle est toujours dans son état naturel.

M. *Maraldi* a reconnu par ses expériences que la distance où la fausse penombre commence à paroître, n'est point proportionnée au diamètre des Cylindres, mais qu'elle est à peu près la même pour tous avec quelque petite variation irrégulière. Il la fixe à 41 diamètres du Cylindre. Elle devient plus grande, quand le Soleil est peu lumineux, soit qu'il soit couvert de quelques nuages clairs, soit qu'il soit peu élevé sur l'horison.

Pour expliquer la fausse Penombre, M. *Maraldi* juge qu'il ne faut pas, ainsi qu'on le fait ordinairement, & avec raison en beaucoup d'occasions, prendre les rayons de lumière pour des lignes mathématiques & roides, mais qu'il faut imaginer la lumière comme un fluide, analogue à l'eau, & qui prend les mêmes mouvemens, & les mêmes irrégularités de mouvement, si cependant ce sont des irrégularités. Quand une Rivière rencontre une Pile d'un Pont, elle se divise, & si les deux parties divisées qui ont été chacune une Tangente de la Pile suivent toujours exactement cette direction qu'elles ont prise, elles ne se réuniront qu'à une certaine distance au delà de la Pile. Mais cela n'est pas ainsi, les parties d'eau, qui touchent la Pile, en suivent en partie le contour, les unes plus, les autres moins, & entrent dans cet espace où aucune ne devroit entrer si elles suivoient la direction des deux Tangentes de la Pile. L'application de cet exemple est aisée à faire, le Cylindre devient la Pile du Pont. Il entre donc des

rayons de lumière dans l'espace qui ne devroit être occupé que par l'ombre véritable, mais comme cette ombre est d'une grande largeur proche du Cylindre, ces rayons ne l'alterent & ne l'éclaircissent pas suffisamment pour faire une penombre sensible, & cela n'arrive que quand l'ombre est devenue plus étroite à une plus grande distance du Cylindre, qu'on a trouvée de 41 diamètres. Alors une même quantité de rayons se mêle à une beaucoup moindre quantité d'ombre. Comme l'ombre devient toujours plus étroite, la fausse penombre s'éclaircit toujours.

Puisque tous les rayons de lumière, ou du moins la plus grande partie, suivent pendant quelque petite étendue le contour du Cylindre, ou tournent un peu après en avoir rencontré les bords qui ne sont nullement éclairés, doivent toujours jeter une ombre véritable, & c'est-là tout ce qui en reste. Voilà les deux traits noirs qui enferment la fausse penombre. Il n'y a rien qui puisse faire varier leur petite largeur.

Cependant il est impossible que sur ces mêmes bords il ne se réfléchisse en même temps d'autres rayons, différens de ceux qui circulent un peu à l'entour. Mathématiquement ils ne devroient déterminer que la position ou direction de deux Tangentes extrêmes qui embrasseroient le Cylindre, & au de-là desquelles & en dehors seroit la vraie penombre, mais ces bords sont des surfaces physiques qui par leur inégalité doivent causer des reflexions de rayons. Ce sont ces rayons réfléchis qui se jettant au de-

déhors de la vraie penombre, forment ces deux traits de lumière si éclatans. Ils le sont plus que la lumière directe, parce que la lumière directe tombe dans ce même espace, où la vraie penombre cesse, & que les rayons réfléchis des bords du Cylindre y sont de plus. On voit assés que ces deux traits lumineux doivent toujours s'affoiblir à mesure que l'ombre est reçûe plus loin, puisque la même quantité de rayons réfléchis occupe toujours une plus grande étendue.

A suivre les idées qui ont été établies, il est aisé de prévoir que si les mêmes expériences qui ont été faites avec des Cylindres se font avec des Globes, la figure des phenomenes changera, que la fausse penombre qui étoit un parallelogramme sur le papier où l'on recevoit les apparences, y deviendra un Cercle, que les deux traits noirs qui la terminoient des deux côtés selon sa longueur, deviendront un Anneau circulaire noir & étroit qui enfermera la fausse penombre, qu'au de-là de cet Anneau sera un autre Anneau de vraie penombre, & au de-là de celui-ci encore un autre plus éclatant que la lumière directe. On jugera même que l'Anneau noir qui enferme la fausse penombre diminuera toujours de largeur dans une plus grande distance du Globe, parce qu'il est formé de la même manière que les deux traits noirs qui s'approchoient toujours, & qu'enfin il s'anéantira à la distance de 110 diametres, où il n'y a plus que de la vraie penombre.

Il faut seulement remarquer que la fausse

penombre commence à paroître beaucoup plus près du Globe qu'elle ne faisoit avec le Cylindre. Elle se montre à 15 ou 16 diametres du Globe, au lieu qu'elle ne se montreroit qu'à 41 du Cylindre. Cela convient extrêmement à l'explication physique que M. *Maraldi* donne de la fausse penombre, car qu'un Globe & un Cylindre soient d'un même diametre & d'une même hauteur, le fluide lumineux qui rencontre le Globe par toute la circonference d'un grand Cercle, circulera derrière & alentour en plus grande quantité qu'autour du Cylindre dont il ne rencontrera que deux lignes droites de sa surface égales chacune à un diametre. Cela ne donne encore au Globe qu'un avantage d'un tiers, & il en a un de près de deux tiers selon le rapport de 15 ou 16 à 41, mais on peut aisément concevoir que tout ce qui rencontre le Globe circulant alentour à cause de l'uniformité de sa figure, & non pas tout ce qui rencontre le Cylindre, car il en faut excepter ce qui rencontre ses deux surfaces circulaires, la supérieure, & l'inférieure, toutes les parties du fluide lumineux qui rencontrent le grand Cercle du Globe, conspirent au même mouvement de circulation, & s'y entr'aident mutuellement, ce qui n'est pas dans le Cylindre, & que de-là vient à la lumière une plus grande facilité de circuler autour du Globe, qui s'ajoute à la plus grande quantité.

M. *Maraldi* conclut de ses experiences qu'apparemment il n'y a aucun corps opaque qui fasse une ombre pure, à quelque petite distance qu'elle soit de ce corps, qu'il s'y mê-

le

le-toujours de rayons qui n'ont pas suivi la ligne droite, & ont circulé, mais que leur quantité, trop petite par rapport à celle de l'ombre, les rend insensibles. Il n'y a que des penombres physiques.

Il ne reste plus de difficulté sur la trop grande noirceur de l'ombre de la Terre où la Lune doit tomber quand elle s'éclipse. La fausse penombre de la Terre commence selon les expériences de M. *Maraldi* à 16 de ses diamètres, c'est-à-dire, à 48 mille lieues, & la Lune est la moitié plus loin, elle ne sera donc pas trop obscurcie. Mais des mêmes expériences il renaît une grande difficulté que M. *Maraldi* ne dissimule pas. L'Anneau noir, seul reste de l'ombre véritable, enferme la fausse penombre, & il est indispensable qu'avant que d'arriver à cette penombre la Lune passe par cet Anneau. Elle sera donc plus obscurcie au commencement de l'Eclipse, & ensuite elle le sera moins; ce sera la même chose renversée pour la fin de l'Eclipse, où elle repassera par l'Anneau, or il est bien sûr que c'est précisément le contraire.

L'Atmosphère de la Terre peut servir à la solution. Son ombre doit se trouver justement à la même place que l'Anneau noir, & cette ombre qui doit être fort claire, puisque l'Atmosphère laisse passer beaucoup de rayons, éclaircira suffisamment l'Anneau, & le rendra homogène à la fausse penombre, de sorte qu'il ne restera dans tout aucune inégalité de noirceur que celle qui dépendra du plus ou moins de proximité à l'axe, selon qu'il est naturel & ordinaire.

M. *Maraldi* ne prétend pourtant pas donner cette réponse pour décisive, quoi-qu'elle soit assés plausible, il attend sagement de nouvelles observations plus exactes sur la différente obscurité de la Lune éclipsee.

Aux Experiences sur les ombres en plein Soleil ont succedé celles que M. *Maraldi* a faites dans une Chambre obscure, où la lumière du Soleil n'entroit que par un trou qui n'avoit pas $\frac{1}{2}$ de ligne de diametre. On se ménage cette obscurité pour voir des phenomenes foibles & délicats que le grand jour effaceroit.

Le premier que nous considererons est l'agrandissement surprenant de l'ombre d'un petit corps Cylindrique, tel qu'une Aiguille ou un Cheveu, placé directement dans le petit Cone de lumière du Soleil qui entre par le trou, & à une distance de ce trou, comme de 12 pieds. On met le Corps à cette distance de la pointe du Cone de lumière, afin qu'il soit environné d'une quantité de lumière assés grande. Si son ombre est reçûe sur un Carton à 2 pieds loin de lui, où, vû son petit diametre, il ne doit y avoir nulle ombre veritable, mais seulement une penombre très-foible & très-étroite, on voit une penombre bien marquée, & 10 fois plus grande que le corps; si le Carton est à 10 pieds de distance du Corps, la penombre est 35 fois plus grande, & elle croît toujours à mesure qu'elle est reçûe plus loin.

Le P. *Grimaldi*, qui a le premier observé ce phenomene, l'attribuë à une *diffraction* des rayons, c'est-à-dire, à un mouvement qu'il

qu'il leur donne , par lequel les deux rayons extrêmes qui rencontrent un Corps , & en font les Tangentes , mais s'en écartent en dehors , comme s'ils en fuyoient les bords qu'ils ont rencontrés. *M. Newton* suppose dans le Corps la vertu de les écarter. Il est certain que tout cela agrandit l'ombre. Mais *M. Maraldi* croit qu'une explication plus simple & plus physique peut suffire.

Si l'ombre & la penombre du Cheveu ou de l'Aiguille ne sont formées que par les rayons du Soleil entrés par le trou , elles sont trop grandes selon les principes ordinaires de l'Optique ; mais selon ces mêmes principes , elles ne le seront pas trop , si outre les rayons directs du Soleil , il en vient d'autres de dehors , qui passeront aussi par le trou , & frapperont le petit Cylindre en autant de points , à l'opposite desquels seront des ombres qui s'ajouteront à la première ombre causée par le Soleil seul. Or *M. Maraldi* conçoit qu'il doit entrer par le trou une infinité de rayons réfléchis par les particules de l'air extérieur , & les ombres qu'ils causeront , qui n'auroient pas été sensibles dans un lieu éclairé à l'ordinaire , le seront dans la Chambre obscure.

Selon cette idée l'ombre ne devient que trop grande. Elle doit être comprise entre deux lignes tirées par deux bords opposés du trou , & prolongées dans la chambre jusqu'au Carton , & il est certain qu'elle n'est pas de cette étendue , mais aussi il y a lieu d'en rabattre. Les rayons réfléchis par les particules d'air que l'on imaginera comme

disposées en un demi Cercle dont le Soleil tiendra le sommet , seront d'autant plus foibles qu'ils seront plus éloignés du Soleil , ou , ce qui revient au même , d'un rayon du Soleil qui passera par le centre du trou ; les ombres des rayons qui seront à un certain éloignement de cet axe ne seront plus sensibles. Celles des rayons trop obliques au trou , ne le seront pas non plus. Enfin , suivant ce qui a été dit , les penombres qui se font en plein Soleil sont terminées par une lumière fort éclatante , ici c'est encore à plus forte raison la même chose , & les ombres formées par les rayons réfléchis , & qui tomberoient dans cet espace , ne peuvent pas y subsister. On verra encore l'agrandissement de l'ombre expliqué par M. *Maraldi* d'une autre manière aussi physique , mais moins simple , toujours conforme à ce qu'il avoit établi pour les premiers phenomenes.

Outre l'agrandissement extraordinaire de l'ombre ou de la penombre des Aiguilles , on observe encore une apparence singulière. Quand cette penombre est reçûe fort loin , elle est tantôt coupée en son milieu selon sa longueur par une bande claire , ou un peu rougeâtre , tantôt partagée en plusieurs bandes alternativement plus claires & plus noires , une plus grande distance diminue le nombre de ces bandes. Dans cette variété il y a toujours de commun que la penombre est terminée de part & d'autre par deux bandes claires , qui ont la même cause que celles qui terminent les ombres en plein Soleil , & toujours après ces bandes claires sont deux ..

deux ou trois traits colorés de rouge , de violet & de bleu , qui fans doute ne s'aperçoivent qu'à la faveur de l'obscurité de la chambre , & doivent subsister en plein Soleil , quoi-qu'ils n'y soient pas visibles.

Pour tâcher de découvrir d'où venoient les bandes , M. *Maraldi* fit les observations avec des Lames longues de 2 pouces , & larges les unes de $\frac{1}{2}$ ligne , les autres de 1 ligne , largeur beaucoup plus grande que le diametre des Aiguilles ou des Chevenx. Elles produisoient les bandes comme les Aiguilles , mais à de plus grandes distances ; & lorsqu'elles passaient 1 ligne de largeur , elles n'en produisoient plus à une distance de 72 pieds , mais seulement une penombre uniforme , telle qu'auroit été celle d'une Aiguille à une petite distance , d'où M. *Maraldi* conclut , avec beaucoup de fondement , qu'à cause de leur largeur , elles demandoient une plus grande distance pour produire des bandes , & qu'on en auroit vu paroître , si on avoit pû faire l'observation dans des lieux assez grands. Et comme il suit de cette idée que les bandes qui étoient confonduës , ne font que se démêler par la distance , & se rendre sensibles , M. *Maraldi* croit qu'on les verroit dans l'ombre des Aiguilles reçûe fort proche , si ce n'étoit que cette ombre est trop étroite.

La bande claire ou rougeâtre du milieu est un effet nécessaire de ce qui a été dit sur les ombres en plein Soleil. Qu'à quelque distance d'elle , de part & d'autre , il y ait sur la penombre deux bandes plus noires , on conçoit aisément qu'elles seront formées
par

par ces rayons reflechis dans l'air extérieur, que M. *Maraldi* suppose pour l'agrandissement de l'ombre, il est indispensable qu'ils apportent quelque changement à la penombre formée par la lumière directe, & qui naturellement auroit été uniforme. D'autres bandes pareilles, s'il y en a, seront formées par d'autres rayons reflechis, mais plus éloignés de l'axe ou rayon principal, peut-être aussi par des rayons qui auront essuyé deux reflexions dans l'air; & en ces deux cas les bandes qu'ils formeroient devroient être moins noires & plus foibles. Quand après les bandes formées on augmente la distance du Carton qui reçoit l'ombre, il est évident que ces bandes, en se dilatant, se mêlent & avec la penombre primitive, & entr'elles, & reçoivent des alterations & des variétés qu'il est bien plus aisé d'imaginer en general; que d'expliquer dans tous les détails. Ils paroïtroient même inutiles, le general étant une fois bien conçu.

Les traits colorés de rouge, de violet & de bleu, qui terminent tout de part & d'autre, paroissent dans l'ombre d'un Cheveu, lors même qu'il n'est plus exposé à la lumière directe qui a passé par le trou, & qu'il n'a pû recevoir que des rayons reflechis dans l'air extérieur. C'est-là une assez forte preuve de toute l'hypothese de M. *Maraldi* sur les rayons reflechis.

Ces traits colorés peuvent être causés par des refractions faites sur la dernière & la plus mince couche de la surface du corps opaque, elle doit toujours être assez transparente.

rente pour cet effet, & l'on est aujourd'hui assez communément persuadé qu'il n'y a que les refractions qui séparent assez les rayons teints naturellement de diverses couleurs, pour rendre la diversité de ces couleurs sensible. Cependant M. *Maraldi* explique les traits colorés par la seule reflexion, faite sur les extrémités du corps opaque. Il a mis dans la lumière du Soleil qui entroit dans une Chambre obscure par un trou de $\frac{1}{2}$ pouce de diametre, un Cylindre de 1 pouce de diametre, placé de sorte qu'il ne recevoit pas toute la lumière, & qu'il en tomboit une partie au dehors sans le rencontrer. Il s'en reflexiffoit donc à plus forte raison sur les bords du Cylindre, & cette lumière reflexie reçûe sur un Carton avoit des couleurs si fortes & si vives, que l'on eût pris le Carton pour du papier marbré. C'étoit-là un effet de la figure Cylindrique qui écarte & démêle les rayons, puisqu'elle renvoye divergens ceux qu'elle a reçûs parallèles.

On devine les phenomenes des Globes qui n'auront que de très-petits diametres, & qu'on substituera dans les observations aux Aiguilles ou aux Lames. Les circonstances requises étant gardées, on aura dans le milieu de l'ombre de ces Globes une aire circulaire fort claire, ensuite un anneau obscur & étroit, un autre anneau de penombre plus large, un second anneau obscur & étroit, enfin un anneau lumineux assez large, bordé de couleurs en dehors.

Au lieu que les bandes ne paroissent pas même à une distance de 72 pieds dans l'ombre

bre des Lames qui ont un peu plus de 1 ligne de largeur , les differens anneaux , qui font la même chose que les bandes , paroissent à cette distance dans l'ombre de Globes qui ont jusqu'à $2 \frac{1}{4}$ lignes de diametre. Cela s'accorde avec ce qui a été dit.

Plus les Globes sont petits , plus les aires claires de leurs ombres sont grandes , ce qui s'accorde encore avec la plus grande facilité de la lumière à tourner autour des petits Corps.

Nous ne dirons rien de quelques autres Experiences de M. *Maraldi* , parce qu'elles ne sont en quelque sorte qu'incidentes , & n'entrent pas necessairement dans son dessein principal. Un Philosophe , qui ne veut faire des experiences que par rapport à un sujet , a bien de la peine à resister à des idées de traverse qui lui en demandent aussi , & elles le meneroient loin hors de sa route , s'il n'avoit la force de se prescrire des bornes.



MECHANIQUE.

SUR LE CHOC DES CORPS À RESSORT.

LES Corps à ressort parfait sont les plus rares dans la Nature , & l'on peut même croire qu'à la rigueur il n'y en a point. Ce ne sont que ceux-là dont nous avons parlé en 1721 * d'après M. *Saulmon*, & ce sont les seuls aussi que l'on considère ordinairement dans les Theories geometriques du Choc des Corps à ressort , parce qu'ils ne demandent qu'une hypothese fort simple, & qui facilite les Calculs. Mais M. *Saulmon* a donné aussi la Theorie du Choc des Corps à ressort imparfait, plus generale & plus compliquée que la première , & qui doit par conséquent la comprendre comme un de ses cas particuliers.

Nous avons défini le Ressort parfait, celui qui en se débandant rend parfaitement au Corps la figure qu'il avoit perdue, lorsque ce même ressort s'étoit bandé par quelque choc. Mais nous le définirons ici plus pré-

* P. 109. & suiv.

précisément, celui qui se débande avec une force parfaitement égale à celle dont il a été bandé, d'où suit l'entière restitution de la figure, & même une vitesse dans cette restitution égale à la vitesse dont s'est fait le changement de figure, en un mot toutes choses égales dans les deux temps, mais selon un ordre contraire. Le Ressort imparfait ne se débande donc pas avec autant de force qu'il a été bandé. Il n'importe pour la Geometrie qu'elle soit la cause physique de cette inégalité. Peut-être, comme un Ressort sensible est apparemment composé de plusieurs petits ressorts particuliers insensibles, quelques-uns des petits ressorts se sont rompus dans le débandement, ce qui a affoibli d'autant le Ressort total. Enfin il sera arrivé un dérangement, un déplacement de parties, quel qu'il soit, qui empêchera le ressort de se débander avec la même force dont il a été bandé. Si l'on conçoit que dans le bandement du ressort il arrive au corps un changement qui subsiste le même dans le débandement, le Ressort n'est pas pour cela imparfait, puisque le débandement sera toujours égal au bandement, il n'y a que l'inégalité des forces des deux temps qui rende le Ressort imparfait, le plus ou le moins de *vivacité* du Ressort, c'est-à-dire de promptitude avec laquelle il se bande & se débande, n'y fait rien.

Le Ressort absolument imparfait ou nul sera donc celui qui ayant été bandé ne se débande point du tout. Les Corps mous peuvent être conçus sous cette idée, ils s'applatissent par le choc, & ne se rétablissent point.

point, cela veut dire que tous leurs ressorts se sont rompus en se bandant, & qu'il n'en reste point pour se débander.

Puisque le Ressort, quel qu'il fût, seroit parfait si la force du débandement étoit égale à celle du bandement, il suit que la force du bandement est à celle du débandement, comme le Ressort parfait est à l'imparfait dont il s'agira en particulier. Si, par exemple, dans une Balle de Jeu de Paume la force du bandement du ressort est 9, & celle du débandement 5, le Ressort parfait est au ressort d'une Balle comme 9 à 5.

Nous supposons ici tout ce qui a été établi en 1721. Deux Corps doivent se choquer directement, tous deux vont à l'Orient, le 1^{er} qui est le plus vite rencontrera le 2^d. Lorsqu'ils sont à ressort parfait, nous avons dit que dans le bandement du ressort le 1^{er} est repoussé vers l'Occident avec une certaine force qui diminueoit celle qu'il avoit avant le choc pour aller à l'Orient, que dans le débandement du ressort il étoit encore repoussé vers l'Occident avec une nouvelle force égale à la première. Mais si le ressort est imparfait, la nouvelle force qui agit dans le débandement selon la même direction que la première, ne lui est plus égale, & il est aisé de voir qu'elle est moindre dans la raison du ressort imparfait au parfait. Elle seroit 5, par exemple, la première ayant été 9, s'il s'agissoit d'une Balle de Paume.

On a déterminé en 1721 l'expression de cette force, qui dans le bandement repoussoit le 1^{er} Corps vers l'Occident, par conséquent la force qui dans le débandement l'y repousseroit
enco-

encore cette première force multipliée par 5, & divisée par 9, mais pour la generalité, & même pour la facilité du Calcul algebrique, il vaut mieux exprimer en grandeurs indéterminées le rapport du ressort parfait à l'imparfait. Ainsi le 1^{er} Corps sera repoussé vers l'Occident avec les deux forces inégales & connues, l'une du bandement, l'autre du débandement, & pour avoir la force totale du Corps après le choc, il faudra rabattre ces deux forces de celle qu'il avoit vers l'Orient avant le choc. Ces deux mêmes forces inégales s'ajoutent après le choc à celle que le 2^d Corps avoit avant le choc vers l'Orient, & de-là se tire sans aucune peine la vitesse & la direction de la vitesse de chacun des deux Corps après le choc, car il n'y a qu'à diviser la force de chacun par sa masse.

Nous avons dit en 1721 comment le cas où les deux Corps vont du même sens avant le choc se change en celui où ils vont en sens contraire, ou en celui où l'un est en repos. Il ne faut que rendre negative la vitesse du 2^d Corps avant le choc, ou la supposer nulle. La formule de la vitesse que prennent après le choc les corps à ressort imparfait, devient donc absolument generale. Elle comprend même les Corps à ressort parfait, on n'a qu'à y supposer égales les deux forces du bandement & du débandement. Elle comprend encore les Corps absolument mous, ou absolument durs, il ne faut qu'y supposer nul tout ce qui exprime la force du débandement, car s'il n'y a point de débandement, il n'y a point de Ressort, & en ce cas, ou il y a eu un bande-

dement, c'est-à-dire, un aplatissement sans restitution de figure, ce qui appartient aux Corps absolument mous, ou il n'y a point en de bandement ou de changement de figure, ce qui appartient aux Corps absolument durs.

La formule est encore generale par un endroit que nous n'avons pas expliqué jusqu'ici, de peur d'entasser trop d'idées différentes. Le Ressort que le choc met en action est un Ressort composé de celui des deux Corps, car tous deux agissent l'un sur l'autre dans le débandement. Les Theories ordinaires où l'on suppose que le Ressort est parfait des deux parts, n'ont nulle difficulté sur ce point, nulle attention particulière à y faire, mais ici où les Ressorts peuvent être & sont le plus souvent imparfaits, le Ressort composé ou total varie selon les deux Ressorts particuliers qui le composent. L'un peut être parfait, & l'autre imparfait, & même imparfait à tel point, qu'il sera nul ou n'aura point de débandement, ou bien tous deux seront différemment imparfaits. Il est évident que la force dont le Ressort composé agit sur chacun des deux Corps est la moitié de la force des deux Ressorts particuliers, car il partage également son action entre ces deux Corps, ou, ce qui revient au même, le Ressort composé est la moitié de la somme des deux particuliers. Si l'un manque, il n'est que la moitié de l'autre. Par-là on exprime aisément toutes les suppositions différentes qu'on peut faire sur les différentes combinaisons des deux Ressorts particuliers, & comme il y a dans la formule de M. Saul-

mon une grandeur indéterminée qui représente le Ressort composé, on voit très-aisément ce qu'il faut substituer en sa place selon les cas. Quand on prend le rapport du Ressort parfait à l'imparfait, c'est le composé qui est cet imparfait.

De cette formule generale & toute nouvelle de M. *Saulmon*, naissent des conséquences en foule, nous en détacherons les principales, ou les plus faciles.

Il est clair par ce que nous avons dit, & sans y rien ajoûter, que ce que le 1^{er} Corps qui alloit à l'Orient prend de force par le bandement & le débandement du Ressort composé pour retourner vers l'Occident, le 2^e le prend de surplus pour continuer d'aller à l'Orient, & cela soit que les forces du bandement & du débandement soient égales ou inégales, c'est-à-dire, que le Ressort composé soit parfait ou imparfait, ou, ce qui est le même, ce qu'un des deux Corps perd de force vers un certain côté, l'autre l'acquiert vers ce même côté, & par conséquent quel que soit le Ressort, la quantité de mouvement des deux Corps vers un même côté est égale avant & après le choc.

La vitesse respective des deux Corps avant le choc, qui est la somme de leurs vitesses particulières, s'ils vont en sens contraire, ou la difference de ces vitesses, s'ils vont de même part, est telle qu'on veut la supposer, mais la vitesse respective après le choc dépend de l'action du Ressort, car s'il n'y avoit point de Ressort, il n'y auroit plus de vitesse respective, puisque les deux Corps iroient ensemble d'une vitesse commune, &
moins

moins le Ressort agit, moins il y a de vitesse respective. Quand le Ressort composé, c'est-à-dire, les deux Ressorts particuliers sont parfaits, la vitesse respective est égale avant & après le choc, ce que l'on fait par les Theories ordinaires, donc si le Ressort composé est imparfait, la vitesse respective est moindre après le choc, & elle est moindre selon la raison du Ressort imparfait au parfait.

Par-là on peut toujours connoître de combien un Ressort imparfait est imparfait. Par exemple, M. *Newton* ayant fait choquer directement deux Balles de Paume, a trouvé que leurs vitesses respectives avant & après le choc, étoient comme 9 & 5, le Ressort imparfait des Balles est donc à un Ressort qui seroit parfait, comme 5 à 9. Les Ressorts de tous les Corps pourront être mesurés de la même manière, & même les Ressorts composés de deux Corps quelconques de différente espee.

Il a été dit en 1721 que la force du bandement du Ressort s'exprime par le rapport du produit des deux Corps à leur somme, ce rapport étant multiplié par leur vitesse respective avant le choc. Cette force est à celle du débandement comme le Ressort parfait à l'imparfait, ce qui fait voir tout d'un coup que la force du débandement s'exprime par celle du bandement que le Ressort imparfait multiplie, & que le parfait divise. La consideration de ces expressions donne quelques Analogies qui sautent aux yeux. Ce qu'elles ont de commode, c'est que la vi-

146 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE
tesse respective avant le choc, qui est toujours
connuë, y entre toujours.

Le chemin ou la vitesse du Centre de gravité commun de deux Corps n'est pas plus difficile à trouver dans l'hypothese du Ressort composé imparfait, que dans celle du parfait. Cette vitesse n'est que moindre après le choc dans l'hypothese du Ressort imparfait, mais elle dépend toujours des mêmes principes.

En general, & dans les deux hypotheses, il suit de ce qui a été dit en 1721, que la vitesse du Centre de gravité dépend des forces ou quantités de mouvement des deux Corps, qui toutes deux ou le tirent vers un même côté, auquel cas c'est leur somme qui meut le Centre de gravité, ou le tirent de deux côtés opposés, auquel cas ce n'est que leur difference qui le meut vers le côté de la plus grande force, & si cette difference est nulle, il ne se meut point. Or quel que soit le Ressort, la quantité de mouvement des deux Corps vers un même côté est égale avant & après le choc, donc la vitesse du Centre de gravité sera toujours la même avant & après le choc, & aura la même direction.

Si l'on se souvient de la manière dont nous avons expliqué en 1721 que la même quantité absolue de mouvement pouvoit, selon M. *Saulmon*, subsister dans la Nature, à une petite restriction près, on verra que la même idée subsiste toujours. Un fluide subtil prendra tout ce qui se perd de mouvement dans un choc, où le Ressort composé étant imparfait, il s'est rompu quelques petits Ressorts

sorts particuliers. Le principe de la même quantité de mouvement toujours subsistante est si beau, & si digne de l'Auteur de l'Univers, qu'il merite les efforts des Philosophes pour le conserver, & l'on ne peut s'empêcher d'avoir regret à quelques modifications qu'on est forcé d'y mettre.

SUR LA REFLEXION ET LA REFRACTION.

* **N**OUS avons déjà annoncé en 1722† que la Theorie de M. de *Mairan* sur la Reflexion des Corps, le conduiroit à celle de la Refraction, & il étoit aisé de s'apercevoir qu'elle étoit trop étendue & trop generale pour ne pas aller jusque-là. Mais pour voir naître la Refraction de la Reflexion, il faut prendre de nouvelles vûes, qui seront toujours étroitement liées aux premières.

On conserve ces anciennes suppositions, qu'un plan ou la surface d'un Corps quelconque est choquée par une Sphere, de sorte que le centre de gravité du Corps, celui de la Sphere, & le point de contact sont sur une même ligne droite, que le plan choqué est horisontal, que l'incidence de la Sphere est oblique pour plus de generalité, & qu'il y a un Ressort parfait dans la Sphere. Il est le plus souvent inutile d'en concevoir un dans le plan ou Corps choqué. Tout ce que l'on change, c'est que ce plan ou Corps

G 2

qui

qui étoit inébranlable est maintenant mobile.

Puisqu'il l'est, la Sphere doit le mouvoir. Elle fera sortir sa surface de cette ligne horizontale selon laquelle elle étoit étendue. Nous rapporterons à cette ligne, comme à un terme fixe, les mouvemens qui vont arriver, & nous la nommerons ligne *fixe*. La Sphere, dont le mouvement est composé d'horizontal & de vertical, puisqu'il est oblique, ne peut mouvoir le Corps choqué, ou le pousser au de-là de la ligne fixe, que selon une direction verticale, car par sa direction horizontale elle ne le choque point. Si le Corps & la Sphere étoient des corps parfaitement durs, ou parfaitement mous, la Sphere donneroit au Corps choqué une vitesse verticale d'autant plus grande, qu'il seroit d'une plus petite masse, & au contraire. On peut concevoir que la masse du Corps choqué fait une certaine résistance à la vitesse que le choquant tend à lui imprimer, & que cette résistance croît ou décroît avec la masse. Cela est general, & subsiste dans le cas du Ressort, comme dans celui des Corps parfaitement durs ou mous, mais le Ressort amene des considerations nouvelles.

La Reflexion dépend totalement du Ressort, & afin qu'elle soit parfaite, c'est-à-dire, qu'elle se fasse sous un angle égal à celui d'Incidence, il faut que le Ressort soit parfaitement comprimé, & parfaitement restitué. Pour cela il lui faut un appui inébranlable, qui ne peut être que le Corps choqué. Mais ce Corps choqué est mobile, & prend une vitesse verticale, il cede donc, & n'est plus du tout un appui, s'il cede dans l'inf-

l'Instant indivisible où il est choqué ; du moins il n'est qu'un appui imparfait , s'il ne cede pas entièrement dans cet instant, & est quelque temps à se retirer.

Quê le Corps choqué soit plus ou moins de temps à ceder entièrement, il est visible que cela dépend du plus ou moins de vitesse verticale qu'il doit prendre, & ce plus ou moins de vitesse dépend du rapport qui sera entre la resistance de sa masse & la force de la Sphere selon sa direction verticale. Plus la masse du Corps sera grande, & la force verticale de la Sphere petite, plus le Corps sera de temps à ceder, plus il sera de temps à servir d'appui, quoi que d'un appui toujours cedant, & au contraire. Il suffira de concevoir désormais une même direction ou vitesse verticale dans le mouvement composé de la Sphere, & la masse du Corps choqué toujours croissante ou décroissante.

Il faut un temps fini, quoi que très-court, pour la compression du Ressort, & un autre égal pour la restitution. Le Corps choqué a toute la durée de ces deux temps pour achever entièrement de ceder, & pour se dérober tout-à-fait à la Sphere choquante; il se dérobera dans le 1^{er} temps, & plutôt dans le 1^{er}, s'il prend plus de vitesse, & il ne se dérobera que dans le 2^d, & plus tard dans le 2^d, s'il en prend moins, ce qui fait deux cas remarquables, ou plutôt trois.

Si le Corps choqué est infiniment petit, & par conséquent d'une resistance nulle par sa masse, il prend dans l'Instant indivisible du choc toute la vitesse verticale qu'il doit prendre, il se dérobe, le Ressort

de la Sphere n'est nullement comprimé, & comme elle n'a reçu aucune alteration à son mouvement, elle le continuë selon la même ligne oblique qu'elle décrivait. Il n'y a point de Reflexion. Si le Corps est fini, mais très-petit, il prendra moins de vitesse, résistera un peu de temps; mais se dérobera tout à fait un peu après le commencement de la compression du Ressort. Ici s'applique ce qui a été dit en 1722 d'après M. de *Mairan*, que dans tous les instants infiniment petits, tant de la compression que de la restitution du Ressort, la Sphere avoit toujours différentes tendances à des directions qu'elle suivrait, si le Corps, supposé alors inébranlable, étoit subitement enlevé dans quelqu'un de ces instants. Maintenant le Corps est réellement enlevé dans un instant de la compression du Ressort, la Sphere ira donc selon la tendance de cet instant, & il est aisé de voir que dans la supposition présente ce sera une ligne peu différente de celle qu'elle suivait dans la Reflexion nulle, & lorsque son mouvement n'étoit nullement altéré. Cette nouvelle ligne sera celle d'une Reflexion très-imparfaite, & comme elle ne peut être qu'au dessous de la ligne qu'on a nommée *fixe*, ce sera une Reflexion *en dessous*. Puisque la vitesse verticale de la Sphere diminue toujours par degrés pendant toute la compression du Ressort, & ne renaît par les mêmes degrés que pendant la restitution, ici, où il y a eu une compression incomplète sans restitution suivante, la Sphere a perdu de sa vitesse verticale qu'elle n'a point regagnée,

&c.

& la ligne de Reflexion en dessous est celle du mouvement composé de la Sphere, où la vitesse verticale est moindre qu'avant le choc, & l'horizontale la même, car elle est constante. Il suit de-là que si du centre de la Sphere, dans l'instant du choc, on tire une perpendiculaire sur le plan choqué, où la ligne fixe, la ligne de la Reflexion en dessous s'éloignera plus de cette perpendiculaire que ne faisoit la ligne d'Incidence. Il est très-facile d'imaginer tous les cas suivans, où la résistance du Corps choqué croissant toujours, il ne se dérobera tout-à-fait qu'après une plus grande compression du Ressort, mais toujours incomplete, & où la Sphere suivra une ligne de Reflexion en dessous toujours plus éloignée de la perpendiculaire au plan, & par conséquent plus inclinée à la ligne fixe horizontale, puisque le rapport de la vitesse verticale de la Sphere à l'horizontale diminue toujours.

Si la masse ou la résistance du Corps choqué est telle qu'il ne se dérobe que dans l'instant où la compression du Ressort de la Sphere est entièrement finie, la Sphere qui a perdu toute la vitesse verticale, & n'en reprend rien faute d'appui, n'a plus que sa direction ou vitesse horizontale, & cette direction est en effet la Tangente du sommet de la Courbe, selon laquelle est alors sa tendance. Son centre ne peut plus que se mouvoir horizontalement sur la ligne fixe, ce qui sera, si l'on veut, une Reflexion *moyenne*.

Car on voit déjà que les Reflexions *en dessus*, qui sont les ordinaires, vont venir, à

mesuré que la résistance du Corps choque : devenant encore plus grande , il ne se dérobera que pendant la restitution du Ressort toujours plus avancée. Les Reflexions en dessus seront toujours moins inclinées à la ligne fixe , & moins éloignées de la perpendiculaire au plan , & afin qu'il en vint une qui fît avec elle le même angle que la ligne d'Incidence , il faudroit que la restitution du Ressort eût été entière , c'est à-dire , que le corps choqué n'eût point du tout cédé , ou eût été d'une masse infinie , ou inébranlable , ce qui est le cas de la Reflexion parfaite.

L'angle que fait la ligne de Reflexion nulle avec la ligne fixe est égal à celui d'Incidence , puisque la Sphere ne suit que la même direction ou ligne tant au dessous qu'au dessus de la ligne fixe. Ensuite cet angle de la ligne de Reflexion en dessous avec la ligne fixe , diminue toujours jusqu'à ce qu'il devienne nul dans la Reflexion moyenne , après quoi il commence à croître dans les Reflexions en dessus , & redevient enfin dans la Reflexion parfaite égal à celui d'Incidence , de sorte qu'à cet égard les deux extrémités se rejoignent , mais en sens contraires.

En considérant ce qui arrive ici à la vitesse verticale de la Sphere dans les trois cas de la Reflexion nulle , moyenne & parfaite , on reconnoîtra trois cas dont nous avons parlé en 1706 * dans l'explication du mouvement simple & direct des Corps à ressort. Si le choqué en repos est infiniment petit par rapport au choquant , le choquant ne perd

* P. 156. & suiv.

perd rien de sa vitesse; si le choqué est égal, il prend toute la vitesse du choquant qui demeure immobile; si le choqué est infiniment grand par rapport au choquant, il lui rend toute sa vitesse; l'application se fait d'elle-même.

Il ne fera peut-être pas hors de propos de s'arrêter un peu ici pour expliquer comment une Boule, qui en choque une égale en repos, lui donne toute sa vitesse, & demeure en repos elle-même, cela éclaircira ce qui a été dit ou supposé. Ce phenomene ne peut arriver si la compression & la restitution du Ressort des deux Boules n'ont été toutes deux égales & parfaites, & elles ne peuvent l'avoir été, si les deux Boules n'ont été à l'égard l'une de l'autre un appui parfaitement immobile. Mais comment cela, si la Boule choquée n'a nullement été immobile à l'égard de la choquante? Elle a dû lui ceder, & diminuer d'autant l'action des deux Ressorts.

Il suffit de considerer celui de la choquée. Dès le premier instant où elle l'est, elle s'aplatit un peu, & devient un Spheroïde, dont le petit axe est dans la ligne qui joint son centre avec le point de contact. Le grand Cercle, dont cette ligne étoit le diametre, étant devenu Ellipse, le point du contact & le point de la Sphere diametralement opposé s'approchent tous deux de son centre, & si on avoit d'assés bons yeux, on verroit la partie de la Sphere anterieure par rapport au coup le fuir, & la posterieure s'en approcher, d'où il suit que le centre de la Sphere, placé à égale distance de ces deux parties,

& poussé en même temps & également par elles deux en sens contraires, demeure immobile. Dans les instants suivans le Sphéroïde devient toujours plus Sphéroïde, & le centre demeure toujours immobile, parce que toute la force de la Boule choquante se consume à changer toujours de plus en plus la Sphere en Sphéroïde, ce qui ne demande aucun mouvement, ni déplacement du centre. Son immobilité fait que la Sphere choquée tient lieu à la choquante d'un appui inébranlable.

On voit par tout ce qui a été dit, que les Reflexions en dessous & les Reflexions en dessus sont séparées par une Reflexion qui n'est ni en dessous, ni en dessus, c'est la moyenne. Les Reflexions en dessous se font tant que la vitesse verticale de la Sphere est diminuée par la résistance du plan choqué, & non rétablie; la Reflexion moyenne, lorsque cette vitesse est entièrement éteinte, & nullement rétablie; les Reflexions en dessus, tant que cette vitesse est rétablie en partie, jusqu'à ce qu'enfin elle le soit entièrement dans la Reflexion parfaite.

La vitesse verticale de la Sphere ne peut jamais être dans un cas plus avantageux que celui où elle ne diminue aucunement par la résistance du plan, & c'est alors la Reflexion nulle, dont la ligne n'est que celle d'Incidence continuée au dessus de la ligne fixe. D'un autre côté si cette vitesse a été diminuée, elle ne peut être dans un cas plus avantageux que celui où elle se rétablit entièrement, & c'est la Reflexion parfaite, dont la ligne fait au dessus de la ligne fixe

un

un angle égal à celui d'Incidence. Donc l'espace qui est entre la Reflexion nulle & la parfaite comprend toutes les Reflexions possibles. Afin qu'il y eût encore des Reflexions au de-là de la parfaite, il faudroit que le plan ne fût pas seulement inébranlable pour rendre à la Sphere toute sa vitesse verticale, mais qu'il eût encore une force pour augmenter, ce qui ne peut être en Physique. Dans ce cas, s'il étoit possible, l'angle de Reflexion seroit plus grand que celui d'Incidence, & la ligne de Reflexion s'approcheroit plus de la perpendiculaire au plan que ne faisoit celle d'Incidence.

On s'aperçoit déjà sans doute que les Reflexions en dessous vont devenir des Refractions. Car si une Sphere ayant traversé un Milieu fluide, vient à tomber obliquement sur la surface d'un second Milieu horizontal, plus difficile à penetrer, sa vitesse verticale, par laquelle seule elle penetre, sera nécessairement diminuée, & il est bien certain qu'elle ne se retablira pas, la Sphere qui entrera dans le 2^d Milieu sera donc dans le même cas que celle qui se réfléchissoit en dessous, parce qu'elle avoit perdu quelque portion de sa vitesse verticale qu'elle ne recouvreroit point. Elle entrera dans le nouveau Milieu, en suivant une ligne de Reflexion en dessous; non continuée à celle d'Incidence, & c'est-là ce qu'on appelle une Refraction. Cette ligne de Reflexion en dessous, ou de Refraction est, comme on l'a vu, plus éloignée de la perpendiculaire au plan que n'étoit la ligne d'Incidence, & c'est ce qu'on appelle une Refraction qui s'éloigne de la

perpendiculaire. Elle s'en éloigne d'autant plus que le 2^d Milieu a par rapport au 1^{er} plus de difficulté à se laisser penetrer, par la Sphere.

Si au contraire le 2^d Milieu étoit plus aisé à penetrer que le 1^{er}, il est bien vrai que la force verticale absoluë de la Sphere n'en seroit pas augmentée, mais sa vitesse seroit moins retardée par le 2^d Milieu qu'elle ne l'avoit été par le 1^{er}, ce qui est l'équivalent d'une augmentation réelle de force ou de vitesse. La Sphere doit necessairement penetrer le 2^d Milieu, puisqu'elle a bien pénétré le 1^{er}, elle doit donc se mouvoir au dessous de la ligne fixe, qui appartient ici à la surface commune des deux Milieux. Elle ne peut se mouvoir dans tout l'espace qui appartient aux Reflexions en dessous, qui ne sont telles que parce que la vitesse verticale est diminuée. Elle doit donc suivre une ligne qui soit hors de cet espace, & elle ne le peut sans en prendre une qui s'approche plus de la perpendiculaire au plan que ne faisoit la ligne d'Incidence. Cette Refraction se fait donc en s'approchant de la perpendiculaire, & elle s'en approche d'autant plus que la facilité du 2^d Milieu à être pénétré est plus grande que celle du 1^{er}. Voilà le cas qui n'avoit pas lieu dans la Reflexion, parce qu'on n'y consideroit que des corps solides rencontrés par la Sphere, ; au lieu qu'ici on en considere de fluides qu'elle traverse avec plus ou moins de facilité.

En general il est très-clair par la Theorie des Mouvements composés, que dans le Triangle rectangle, dont l'hypotenuse représente

sente l'Incidence oblique de la Sphere sur un plan horifontal, & les deux autres côtés la vitesse horifontale constante, & la verticale variable qui est aussi ce que nous avons toujours nommé la perpendiculaire au plan, il arrive necessairement que quand cette vitesse verticale est retardée ou diminuée, l'angle de l'hypotenuse avec elle devient plus grand, ou, ce qui est le même, l'hypotenuse qui est le chemin de la Sphere s'éloigne de la perpendiculaire au plan, & qu'au contraire si la vitesse verticale est augmentée ou moins retardée, le chemin de la Sphere s'approche de la perpendiculaire au plan.

Il est donc démontré que le Milieu dans lequel un Rayon de lumière composé de petits Globules, ainsi qu'il a été dit en 1722*, se rompt en s'approchant de la perpendiculaire, est le Milieu le plus aisé à penetrer par le Rayon, & au contraire. Et comme il est certain par l'expérience que la Lumière, en passant de l'Air dans l'Eau, se rompt en s'approchant de la perpendiculaire, & s'en approche encore plus dans le Verre, il est sûr que la Lumière se meut plus aisément dans le Verre que dans l'Eau, & dans l'Eau, que dans l'Air.

Quand on commença dans le Siècle passé à examiner plus soigneusement la Refraction, certainement l'apparence n'étoit pas que des Milieux transparents plus denses dussent donner un passage plus aisé à la Lumière, & plus aisé à proportion de leur densité, qui naturellement devoit être un obstacle. Aussi le célèbre M. de *Fermat*, grand Geometre,

soutint-il long-temps contre *M. Descartes* que l'Air étoit un Milieu plus favorable à la Lumière que l'Eau, & l'Eau plus que le Verre. Pouffé vivement par son redoutable Adversaire, il se retrancha enfin dans un raisonnement dont nous donnerons ici quelque idée.

Il est de la simplicité & de la sagesse de la Nature que la Lumière aille d'un point à un autre, ou par un chemin direct, ou par le plus court, ou par celui qu'elle parcourt en moins de temps. Quand elle se rompt en passant d'un Milieu dans un autre, elle ne va ni par un chemin direct, ni par le plus court, elle va donc par celui de la plus courte durée. *M. le M. de l'Hopital* a démontré dans ses *Infia. petits* sous une espece d'Allegorie, qu'afin que la Lumière, tombant obliquement, aille en moins de temps qu'il soit possible d'un point donné dans un Milieu à un point donné dans un autre, il faut qu'elle se rompe de sorte que le Sinus de l'angle que fait son Incidence avec la perpendiculaire au plan & le Sinus de son angle de Refraction soient entr'eux comme les différentes facilités des deux Milieux à se laisser penetrer. Or quand le chemin de la Lumière qui se rompt s'approche de la perpendiculaire au plan, le Sinus de son angle de Refraction est moindre que n'étoit celui de l'angle d'Incidence. Donc alors la facilité du 2^d Milieu est aussi moindre que n'étoit celle du 1^{er}. Donc le Milieu dans lequel la Lumière se rompt en s'approchant de la perpendiculaire est celui qu'elle penetre le moins facilement.

Cette

Cette consequence est vraie, s'il est bien vrai que le chemin de la Lumière, qui se rompt, doive être de la moindre durée possible, mais une cause finale, un principe moral, pour ainsi dire, ce plus court temps, plus convenable à la sagesse de la Nature, ne peut pas tenir contre un principe Geometrique & Physique, tel que celui de la composition des Mouvements. En effet, comme nous l'avons dit en parlant de M. Leibnitz *, qui admettoit en Physique les Causes finales, & en particulier ce principe de M. de Fermat sur la Refraction, *Ce qui appartient à la sagesse du Créateur semble être encore plus au dessus de nôtre foible portée, que ce qui appartient à sa puissance.* Quand nous aurons découvert ce qui est, ne craignons pas de n'y pas trouver assés d'ordre & de dessein, mais ne jugeons pas de ce qui est par un ordre & des desseins tirés de nôtre imagination.

Les Causes finales étant donc aussi peu décisives en Physique, M. de Mairan ne fait pas difficulté d'admettre que les deux chemins du Rayon rompu sont parcourus en un temps plus long, que ne seroit le chemin direct & unique compris entre les deux mêmes points, & il le démontre, & même à l'égard de la Reflexion, tant qu'elle est imparfaite. La nécessité Mechanique doit prévaloir sur tout.

Quant à la densité des Milieux, qui cependant résistent moins à la Lumière, il fait voir que cette plus grande densité de leurs parties sensibles peut fort bien s'accorder avec une moindre densité du fluide subtil qui remplit
leurs

leurs pores insensibles, & qui fera la Refraction. La contexture des pores avec les parties solides des Corps diaphanes plus denses peut aussi être plus favorable au passage de la Lumière. Enfin c'est à la Physique à éclaircir ce point, qui ne l'est pas encore assez, mais ce qu'il y a de Méchanique est inébranlable.

L'Histoire que fait M. de *Mairan*, non seulement de la contestation de M. *Descartes* & de M. de *Fermat*, mais des differens sentimens des plus grands Philosophes sur toute cette matiere, prouve assez combien elle étoit épineuse, & combien il étoit nécessaire qu'il y eût enfin quelque chose de bien sûrement arrêté. Cette Histoire, curieuse & agréable par elle-même, a été recherchée avec soin, & recueillie de beaucoup d'endroits, dont quelques-uns sont déjà peu connus.

Comme la Refraction de la Lumière a pour cause la différente résistance de deux Milieux, & que l'on conçoit la résistance de chacun toujours la même, la force verticale de la Lumière, lorsqu'elle passe d'un des deux Milieux dans l'autre est toujours également augmentée ou diminuée par rapport à l'horizontale, quelle qu'ait été l'incidence du Rayon, & de-là vient le rapport constant des Sinus des angles d'incidence & de refraction pour deux Milieux déterminés.

Si la Lumière passe d'un Milieu dans un moins résistant, elle se rompt toujours, car il est impossible que sa force verticale ou sa force de penetrer étant augmentée, elle ne penetre. Mais quand elle passe dans un Milieu

lieu plus résistant, elle ne penetrera pas, si la force verticale n'est qu'égale à la résistance de ce Milieu. Cela viendra d'une incidence trop oblique, où le côté vertical aura un trop petit rapport à l'horifontal. Alors la Lumière se reflechira.

C'est donc une erreur que de penser, comme quelques Physiciens, qu'une des causes du froid de l'Hiver est l'incidence trop oblique des rayons sur l'Atmosphere, qui fait qu'il s'en reflechit une plus grande quantité, perdue pour le Climat où est l'Hyver. L'Atmosphere est plus dense, & resiste moins à la Lumière que l'Ether d'où elle vient, & par consequent sous quelque angle qu'elle vienne, il s'y en rompt toujours autant qu'il s'en peut rompre.

Je dis, *autant qu'il s'en peut rompre*, car il est certain par des experiences modernes, que la Lumière ne se rompt point sans se reflechir aussi en partie. Un Rayon physique, qui, quelque petit qu'il soit, est toujours un faisceau de Rayons lineaires, si l'on trouve toujours dans un Corps diaphane des parties solides qui causent des reflexions en même temps que les pores admettent les refractions.

Jusqu'ici nous n'avons regardé que comme un point ce qui passe d'un Milieu dans un autre, mais ce n'est pas réellement un point, c'est une Sphere, quoi-que très-petite, & ce passage est à considerer. Le chemin d'un point, ce seront deux lignes droites differentes, l'une d'incidence, l'autre de refraction, le chemin de la Sphere sera composé de la ligne droite d'incidence, jusqu'à ce que la Sphere touche le 2^d fluide, ensuite d'une

d'une Courbe qui durera jusqu'à ce que la Sphere y soit entièrement plongée, enfin d'une droite qui est la ligne de refraction. Cette Courbe est analogue à celle dont nous avons parlé en 1722, par laquelle dans la Reflexion le centre d'une Sphere est transporté de la ligne d'incidence sur celle de reflexion. Nous allons prendre le cas où une Sphere passe d'un Milieu plus aisé dans un plus difficile. Nous en supposons toujours la surface horisontale.

Ce 2^d Milieu ou fluide resiste également à sa division en tous sens, c'est-à-dire, que si une Sphere qui y est plongée s'y meut horisontalement, il lui resiste autant que si elle étoit muë verticalement, mais dans le temps qu'elle s'y plonge, il faut distinguer les differentes resistances qu'il lui fait. Elle ne peut le diviser ou s'y plonger que par son mouvement vertical, & si ce mouvement n'est que vertical, le fluide lui resiste d'autant plus que la Sphere depuis le premier point de contact s'enfonce toujours successivement par un plus grand segment, jusqu'à ce qu'étant plongée précisément à moitié, elle n'éprouve plus cette augmentation de resistance, parce que les segmens suivans sont toujours plus petits, & n'ont aucune peine à suivre le chemin frayé par celui du milieu.

Cette resistance du fluide qui est toujours plus grande à cause de la grandeur croissante des segmens de la demi-Sphere, est toujours plus grande d'une moindre quantité à cause de la position des parties de la demi-Sphere, toujours plus propre à la division du fluide. Car dans le 1^{er} instant la demi-Sphere

re

re presente au fluide un segment infiniment petit horisontal , infiniment peu propre par sa position à le diviser , & dans le dernier instant , le segment qu'elle presente au fluide est vertical , ou lui est perpendiculaire. Tous les segmens entre le premier & le dernier vont toujours en s'approchant de la position du dernier.

Le mouvement de la Sphere qui n'est supposé que vertical , est donc toujours retardé , mais toujours moins retardé depuis l'instant où elle touche le fluide , jusqu'à celui où elle a son centre sur sa surface , le chemin de la Sphere n'est alors qu'une droite dont les espaces égaux sont parcourus en des temps plus longs , & toujours plus longs d'une moindre quantité. Mais si l'incidence de la Sphere a été oblique , comme son mouvement a une direction verticale , & une horisontale , tout ce qui a été dit sur la verticale subsiste , à cela près qu'il y faut faire entrer l'horisontale , qui profite , pour ainsi dire , des pertes de la verticale. C'est la même chose que si le mouvement horisontal étoit toujours croissant , mais croissant d'une moindre quantité.

De-là il suit que si du centre de la Sphere , lorsqu'elle touche le fluide , on mene sur ce fluide une perpendiculaire , & sur cette perpendiculaire des Ordonnées qui representent le mouvement horisontal croissant d'instant en instant , ces Ordonnées seront celles d'une Courbe , qui aura sa convexité tournée vers la perpendiculaire au fluide , ou Axe. Cette position de la Courbe à l'égard de son Axe est une suite naturelle de ce que
le

le 2^d fluide est supposé plus difficile à pénétrer que le 1^{er}. Le chemin de la Sphere doit s'éloigner de ce 2^d, autant qu'il est possible.

A cause de l'incidence oblique de la Sphere ou de son mouvement horizontal, la Courbe n'est pas terminée lorsque le centre de la Sphere est arrivé sur la surface du 2^d fluide. Ce fluide résiste à sa division dans le sens horizontal, & la demi-Sphere qui n'est pas encore plongée, trouve cette résistance à effuyer, résistance encore croissante, parce que de plus grands segmens de la Sphere entière se plongeront toujours, mais toujours moins croissante, parce que la position des nouveaux segmens qui viendront après la demi-Sphere, sera toujours plus horizontale. Ainsi le chemin de la Sphere continuera à être courbe, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement plongée, après quoi elle ne suivra plus que la droite de la refraction, dernière Tangente de la Courbe totale, comme la droite de l'incidence en étoit la première.

Le chemin total de la Sphere est donc une droite qui devient Courbe, & ensuite une Courbe qui redevient droite, il paroît que la courbure de cette Courbe diminuë depuis son origine jusqu'à l'extrémité, & que sa 2^{de} portion est moins courbe que la 1^{er}. Elle n'est donc pas composée de deux moitiés égales & semblables, comme celle de la Reflexion. D'ailleurs elle est toujours descendante ou montante, au lieu que celle de la Reflexion a une moitié descendante & une montante.

En donnant pour origine à cette Courbe

DES SCIENCES. 1723. 165
de la Refraction ce qui a été ici son extré-
mité, elle devient celle d'une Sphere qui pas-
se d'un Milieu plus difficile dans un plus
aisé. Alors sa concavité est tournée vers ce-
lui-ci.

Nous nous bornons à cette exposition
très-abregée de la Theorie de M. de *Mairan*.
Il a donné sur la Refraction comme sur la
Reflexion des Formules Algebriques gene-
rales, qui comprennent non seulement tout
ce qui est, mais tout ce qu'on peut feindre
ou imaginer sans contradiction. Nous avons
réduit à ce qui étoit le plus Physique & le
plus important l'usage de ces formules, qui
ont une si grande surabondance de verité.

MACHINES OU INVENTIONS
APPROUVEES PAR L'ACADEMIE
EN M D C C X X I I I.

I.

UNE manière inventée par M. *Deschamps*
Entrepreneur des Armes du Roi, pour
mesurer la force de differens Ressorts. Elle
consiste à les charger successivement de dif-
ferens poids au moyen d'une espece de Ro-
maine, & elle a paru bien imaginée, utile, &
fort simple. Cette idée a été employée par l'Au-
teur à perfectionner celle qu'il avoit donnée
en 1718 *, de faire sur un même modèle
toutes les pièces des Platines & des Batteries
des

* V. l'Hist. de 1718. p. 93. & 94.

des Fusils , afin que que quelqu'une étant rompuë ou perduë , on pût aisément la remplacer , & que le Fusil entier ne devînt pas inutile. Il avoit fait reflexion que cela ne suffisoit pas par rapport aux Ressorts , qui quoiqu'égaux & semblables , pouvoient avoir differens degres de force , selon la qualité de l'Acier , ou le degré de trempe. En connoissant leur differente force , il pouvoit ajouter par la trempe à celui qui étoit trop foible , ou ôter par le recuit à celui qui étoit trop roide.

II.

Un Porte-vent de cuir proposé par *M. des Barrieres* pour donner de nouvel air aux Ouvriers qui travaillent aux Mines , soit à celles de Charbon de terre , soit à celles qu'on fait dans les Siéges de places. On sait qu'ils courent risque d'être étouffés par la mauvaise qualité de l'air qu'ils respirent dans ces lieux souterrains , sur tout en certaines saisons. *Agricola* dans son *Traité de Re Metallica* , a déjà donné le même expedient , à cela près qu'il n'a songé qu'à des Porte-vents de bois. Ceux de cuir paroissent préférables en plusieurs circonstances.

I I I.

Des Instrumens d'or , tels que des Ciseaux , Couteaux , Poinçons , qui par l'alliage que *M. Louis Sirlés* joint à ce metal , mou de lui-même & flexible , & par la manière dont il le travaille , sont assés durs pour couper & pour servir dans toutes les occasions où l'on n'a pas besoin de la dureté de l'Acier , & de la finesse de son tranchant. Ils ne seront pas sujets à la Rouille , & auront encore

core l'avantage de la propreté., de l'agrément & de la magnificence.

I V.

Trois Machines de M. *Meynier*, qui ont rapport à l'Astronomie.

La 1^{re} est une Sphere de Carton dans laquelle la Terre est placée au centre, suivant le Système de *Ptolomée*.

Il a disposé autour de la Terre la Lune, le Soleil, Mars, Jupiter & Saturne; & autour du Soleil, Mercure & Venus, conformément au sentiment de quelques Anciens.

Les Planetes superieures y ont chacune leur Epicycle, par le moyen duquel il represente leurs directions, stations & retrogradations.

Il a placé vers le bas de cette Sphere des Cartons diversement inclinés les uns aux autres & au plan de l'Ecliptique sur lesquels les Planetes sont supportées.

Par le moyen de ces Cartons où sont marquées les Períodes des revolutions de chaque Planete, il represente leur mouvement, tant en longitude qu'en latitude, en les faisant tourner avec la main.

On y trouve aussi les jours de la Lune & ses Phases, le lever & le coucher du Soleil pour tous les climats, & l'heure qu'il est à tous les endroits de la Terre.

La 2^{de} est une Horloge dans laquelle est representée la revolution du premier mobile, celle du Soleil de l'Orient vers l'Occident, & son mouvement propre d'Occident en Orient. Cette Horloge, outre les heures Solaires, marque l'heure du passage du point du Belier par le Meridien pour toute l'an.

168 HIST. DEL'ACADEMIE R. DES SC. 1723.
l'année, le lieu du Soleil dans le Zodiaque,
& l'heure de son lever & de son coucher.
Le lieu de la Lune y est aussi marqué par
une Aiguille distincte.

La 3^{me} est un Planisphere de Carton où
sont représentées les Etoiles autour du Pole
Septentrional, par le moyen duquel la hau-
teur de l'Etoile Polaire étant donnée, il dé-
termine la hauteur du Pole, & de combien
cette Etoile est éloignée du Meridien vers
l'Est ou vers l'Ouest, ce qui peut servir à
faire connoître la variation de la Bouffole
pendant la nuit.

On y trouve aussi l'heure en Mer pen-
dant toutes les heures de la nuit.

Toutes ces Machines, qui ont été exe-
cutées par l'Inventeur, ont paru fort in-
genieuses, & ont fait connoître également
son genie dans l'invention, & son adresse
dans l'exécution.

S U I T E D E S
MEMOIRES

D E

MATHEMATIQUE

E T


DE PHYSIQUE.

Tirez. des Registres.

DE L'ACADEMIE ROYALE

D E S S C I E N C E S


DE L'ANNE'E M. DCCXXIII.



A A M S T E R D A M,

Chez **PIERRE DE COUP.**

M D C C X X X.



MEMOIRES

DE

MATHEMATIQUE

ET

DE PHYSIQUE,

TIRE'S DES REGISTRES

de l'Academie Royale des Sciences.

De l'Année M. DCCXXIII.

*OBSERVATIONS METEOROLOG-
IQUES faites en 1722.*

Par M. MARALDI.



N'a observé encore plusieurs fois l'Aurore boreale pendant l'année 1722. Le 7 janvier, le Ciel étant couvert, on voyoit du côté du Nord les nuages proche de l'horizon fort éclairés. Nous avons remarqué la même chose le 8, le 9 & le 12 du même mois.

Cette clarté des nuages étoit fort grande,
MEM. 1723. *A* fort

13 Janvier 1723.

2 MEMOIRES DE L ACADEMIE ROYALE

fort étendue depuis le Nord-est jusqu'au Nord-ouest, & s'élevoit à la hauteur de 25 degrés, ayant duré depuis 6 à 7^h du soir jusqu'à 11. A toutes ces marques on a conjecturé que la clarté des nuages étoit causée par la lumière boreale. On a vû les mêmes apparences le 20 Fevrier, le Ciel étant couvert. Le 5 Septembre la lumière parut fort claire entre les ouvertures des nuages. Nous la vîmes encore le jour suivant 6, le Ciel étant fort sercin. C'étoit une lumière fort claire, constante, formée en arc vers sa partie supérieure sans aucune de ces colonnes qui ont coûtume de s'élever perpendiculairement à l'horison, & de se mêler avec la lumière constante.

Elle parut de nouveau le 10 Septembre fort claire, accompagnée de colonnes. Elle fut encore visible le 16, mais sans colonnes. Enfin on en a vû une foible trace pour la dernière fois de cette année le 14 d'Octobre. C'est la septième année que ce phénomène paroît depuis sa première apparition qui arriva en 1716.

Observations sur la quantité de Pluie de 1722.

	lignes		lignes
En Janvier	4 $\frac{1}{2}$	En Juillet	11 $\frac{1}{2}$
Fevrier	16 $\frac{1}{2}$	Août	26
Mars	16	Septembre . . .	23
Avril	4	Octobre	0
Mai	32	Novembre . . .	10 $\frac{1}{2}$
Juin	19	Decembre . . .	12 $\frac{1}{2}$

La hauteur de la pluie totale de l'année
1722

1722 est de 14 pouces 6 lignes $\frac{1}{2}$. Pendant les six premiers mois de l'année il a plu 7 pouces & 6 lignes, & dans les six derniers mois 7 pouces 0 ligne $\frac{1}{2}$. La pluie de l'année 1722 est donc beaucoup au dessous de celle des années communes qui est de 19 pouces. Cela n'est pas seulement pour cette année, mais il y en a huit de suite qu'il arrive la même chose : car depuis 1713 la quantité de pluie a toujours été beaucoup au dessous de la commune : ainsi il ne faut pas s'étonner si les sources ont fort diminué depuis quelques années à l'égard de ce qu'elles étoient les années précédentes.

Quoi-que la quantité de pluie de l'an 1722 ait été plus grande que celle des années précédentes, il n'y a pas eu cependant une si grande abondance de bleds ; ce qui peut venir en partie de ce que la pluie n'est pas tombée dans des intervalles de temps les plus propres pour la fécondité de la terre, & qu'elle a été distribuée assés inégalement. En effet durant le mois d'Avril il n'a tombé que 4 lignes de pluie, au lieu qu'il y en a eu 32 lignes dans le mois de Mai. Il est peut-être sans exemple dans ce climat qu'il se soit passé un mois entier sans pleuvoir, comme il est arrivé en Octobre, ce mois ayant presque toujours été serein, ce qui a rendu l'automne agréable.

M. *Guillin*, Ingenieur, à *Bergue-St-Vinox*, a fait dans la même Ville les Observations de la quantité de pluie qui est tombée depuis le mois de Février 1719 jusqu'au mois d'Avril de 1722 avec la même methode que l'on pratique à l'Observatoire, & il a envoyé ces

4 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Observations à M. l'Abbé *Bignon*. Depuis le commencement de Fevrier 1719 jusqu'à la fin de l'année, la hauteur de la pluye tombée à *Bergue* est de 17 pouces 10 lignes. Celle de toute l'année 1720 est de 22 pouces 8 lignes $\frac{1}{2}$, & celle de 1721 est de 29 pouces 10 lignes.

Par les Observations faites à *Paris*, la hauteur de la pluye en 1719 ne fut que de 9 pouces 4 lignes. La difference entre l'une & l'autre est au moins de 8 pouces. En 1720 à *Paris* la pluye fut de 17 pouces, & par consequent 5 pouces moins qu'à *Bergue*, & en 1721 elle a été de 14 pouces, plus de 15 pouces moins qu'à *Bergue*. D'où il paroît qu'il plût beaucoup plus à *Bergue* qu'à *Paris*. On avoit déjà remapqué par les Observations faites à *Pontbriant*, comparées avec celles qu'on avoit faites en même temps à *Paris*, que proche de la Mer il plût en plus grande abondance qu'au milieu des terres, peut-être à cause que proche de la Mer les nuages y doivent être plus chargés d'humidité. On a remarqué aussi que dans les pays des Montagnes il en tombe une plus grande quantité que dans les plaines; ce qui vient de ce que les nuages qui sont chassés par les vents, sont arrêtés par les Montagnes, lorsqu'ils les rencontrent, & s'y convertissent en pluye, qui par cette raison y doit être en plus grande abondance que dans les plaines, où il n'y a rien qui arrête ces nuages qui sont chassés par les vents.

Observations sur le Barometre.

La plus grande hauteur du Barometre simple a été à 28 pouces 7 lignes $\frac{1}{2}$: il s'est trouvé dans cet état en Janvier pendant quatre jours, c'est-à-dire, depuis le 2 jusqu'au 5 inclusivement. Le Ciel étoit alors couvert avec un grand brouillard & l'air tranquille. Cette hauteur est peut-être la plus grande où le Mercure soit arrivé dans ce climat depuis que l'on fait ces Observations.

M. *Cassini*, dans son *Traité de la Comete*, remarque que le premier de Janvier 1681, le Barometre étant à 28 pouces 4 lignes $\frac{1}{2}$, c'étoit la plus grande hauteur où il l'avoit vû depuis plusieurs années. M. *de la Hire* ne l'a jamais observé plus haut que 28 pouces 5 lignes. Par les Observations de l'année 1721 nous le trouvâmes le 18 & le 20 de Janvier à 28 pouces 6 lignes ; en 1722 il a été une ligne & demie plus haut qu'il n'avoit été auparavant dans la plus grande hauteur. Dans cette grande élévation le Ciel a été toujours couvert, comme il a continué de faire durant les quinze premiers jours de Janvier. Le jour de la plus petite hauteur du Barometre a été le 31 Decembre par un vent de Sud ouëst violent ; il se trouva ce jour-là à 27 pouces une ligne $\frac{1}{2}$.

Le plus grand froid de l'année marqué par le Thermometre est arrivé le 24 Janvier, ayant descendu ce jour-là à 25 parties. Cette situation est à peu-près l'état moyen entre le temperé qui arrive à 48 degrés, & le plus grand froid qui est à zero.

6 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Dans les plus grandes chaleurs de 1722 le même Thermometre est monté à 72 degrés, ce qui est arrivé le 15, le 16 & le 27 Juin à 3 heures après midi, qui est l'heure de la plus grande chaleur du jour. Le vent étoit ces jours-là Sud ou Sud-est. C'est presque toujours avec ces vents que sont accompagnées les grandes chaleurs de l'été, qui ont été fort moderées durant cette année, le Thermometre n'étant monté qu'à 72, au lieu que dans les plus grandes chaleurs des années précédentes il s'étoit élevé à 82 parties. Cette année les plus grandes chaleurs sont arrivées au mois de Juin, au lieu que dans la plupart des années elles arrivent au mois de Juillet & d'Août.

Déclinaison de l'Aimant.

La déclinaison de l'Aimant observée le 22 Novembre 1722 & le 4 Janvier 1723 avec une Boussole de 4 pouces, a été trouvée de 139 0' Nord-ouest, précisément telle qu'elle a été trouvée avec la même Boussole en 1721 & en 1722. La déclinaison ne varie donc pas depuis trois ans, & par conséquent elle est stationaire. En 1716 nous trouvâmes la déclinaison de 120 30'; & comme elle varioit auparavant de 12 minutes par an, si depuis 1716 elle avoit fait le même progrès qu'elle faisoit auparavant, elle auroit été cette année de 14 degrés. La difference entre l'Observation & le progrès qu'elle auroit dû faire, si elle avoit continué de décliner, est un degré, ce qui seroit sensible. Il est donc certain qu'elle ne continué pas de varier, & qu'elle est stationaire.

DE



DE L'ORIGINE ET DES USAGES

D E

LA PIERRE DE FOUDRE.

Par M. DE JUSSIEU.

R IEN n'est si connu dans la République des Lettres que le mérite que les Anciens & qu'une tradition qui depuis eux s'est même conservée parmi nous, ont attribué à la *Pierre de foudre*.

L'explication du nom de *Cerannia* qu'elle porte, nous apprend qu'ils la croyoient descendre du Ciel dans le moment que le tonnerre éclatoit & tomboit sur quelque endroit que ce fut de la Terre.

Cette prétendue origine la faisoit regarder avec une espèce de respect qui avoit rapport à la majesté du Dieu qu'ils s'imaginoient l'avoir lancée. Aussi *Plin* la met-il dans le nombre des Pierres précieuses.

Mais il n'y a point eu de peuples qui en aient fait plus de cas que ceux du Nord, par la superstition qu'ils attachoient à ces Pierres, qui étoit que comme ils avoient autrefois adoré une Idole qu'ils croyoient présider à la foudre, & qu'ils représentoient avec la foudre à la main sous la figure d'une de ces Pierres taillées en coin, ils conservoient chés eux une de ces sortes de Pierre comme un préservatif contre la foudre, qu'ils

croyoient éloigner de leurs maisons , lorsqu'au premier bruit du tonnerre qu'ils entendoient , ils avoient frappé de ces Pierres trois fois les endroits par lesquels le tonnerre auroit pû entrer.

Helwing, celebre Ministre d'*Angerbourg* en *Prusse*, qui a fait un Traité particulier des Pierres de son pays, dit qu'il lui a fallu recourir au bras séculier pour détruire cette superstition dans le lieu où il exerçoit son Ministère; superstition qui étoit d'autant plus enracinée , qu'elle étoit entretenüe par les découvertes continuelles qui s'y faisoient de ces sortes de Pierres , dont ces peuples ne pouvoient s'imaginer que la figure n'eût quelque chose de mystérieux.

Cette Nation sembleroit s'être accordée en cela avec les *Chinois*, chés lesquels *Rumphius*, qui nous a donné des Figures de ces sortes de Pierres dans son Recueil de Coquilles, nous assure qu'une pareille idée a pour fondement l'Observation qu'ils font sur la figure, sur la qualité & la couleur de ces sortes de Pierres, & sur les endroits sur lesquels il s'en trouve qui sont souvent des troncs d'arbre qu'ils s'imaginent avoir été frappés de la foudre.

Quelque éloigné que nous soyons de semblables idées , nous n'avons pas laissé de croire jusqu'ici que le *Ceraunia* est une Pierre naturelle dont le caractere est d'être figurée ou en coin ou en fer de flèche de la même manière que la figure ovale, la cylindrique, la prismatique & l'orbiculaire sont les caracteres des Cailloux de *Mendoc*, de l'*Emeraude*, de quelques Crystaux & des *Echinites*.

Mer-

Mercati, tout éclairé qu'il étoit dans l'histoire des Fossiles, n'a pas voulu tellement adhérer à l'opinion que ces sortes de Pierres aient été taillées de cette forme, qu'il ait renoncé au sentiment de ceux qui en admettent la possibilité naturelle sous le nom de *jeu de nature*.

Mais aujourd'hui un peu d'attention à deux ou trois espèces de Pierres qui nous viennent, les unes des Isles d'*Amerique*, & les autres de *Canada*, est capable de nous détromper de ce préjugé, du moment que nous apprenons à n'en pas douter; que les Sauvages de ces pays-là se servent à différents usages de Pierres à peu près semblables qu'ils ont taillées avec une patience infinie par le frottement contre d'autres Pierres, faute d'aucun instrument de fer ni d'acier.

Les premiers besoins des Sauvages sont ou de couper & fendre du bois, ou de se faire des armes dont ils puissent tuer des animaux pour leur subsistance, ou de se défendre contre leurs ennemis.

La figure de hache & de celle de coin qu'ils ont donné à quelques Pierres que nous avons tiré d'eux, nous marque assez qu'ils les ont taillées pour les premiers de ces usages, & celle de pointe qu'ils ont donné à quelques pierres à feu que nous voyons adroitement entées sur l'extrémité de certains bois menus & longs, nous font assez connoître qu'ils s'en servent comme de flèches.

J'en rapporte une pièce originale de chacun de ces instruments, l'une qui est en forme de hache, tirée des *Caribes*, la seconde

qui ressemble à un coin, apportée du *Canada*, & la troisième, qui sont trois flèches, chacune ayant pour armure, au lieu d'une pointe d'acier, un fragment triangulaire de pierre à feu, aiguisé par l'angle qui lui sert de pointe, & tranchant des deux côtés.

Lorsque nous voyons donc parmi les Figures de ceux qui ont fait des Recueils de Pierres figurées, celles qui se rapportent à quelqu'une de ces trois formes, & sur tout à celle de coin & à celle de fer de flèche qui ont toujours passé jusqu'ici pour *Pierres de foudre* & pour mystérieuses, nous ne devons point hésiter de les regarder comme instrumens répondant à ceux d'acier auxquels ils ressemblerent, & qui ont été taillés ou par les premiers habitans de ces pays où on les trouve, ou y avoient été apportés par des étrangers qui en faisoient une sorte de commerce. Ce qui donne lieu à cette conjecture est que dans la plupart des pays où se trouvent ces sortes d'instrumens, on n'y voit point ni carrière ni caillou de la même nature qui ait pû servir pour les y fabriquer sur les lieux, & que par conséquent il y avoit beaucoup d'apparence que des habitans d'un pays où se rencontrent des cailloux d'un grain aussi fin & d'une espèce aussi dure, venoient les échanger contre d'autres denrées : & ce qui acheve de confirmer cette conjecture est que la même chose se pratique encore chés les Sauvages, parmi lesquels ceux qui ont plus d'adresse & de patience pour tailler ces sortes d'instrumens, les fournissent aux autres qui savent peut-être mieux s'en servir.

Les

Les peuples de *France* & d'*Allemagne*, & des autres pays du *Nord*, pour ce qui est de la découverte du fer, sont assés semblables à tous les Sauvages d'aujourd'hui, & n'avoient pas moins besoin qu'eux, avant l'usage du fer, de couper du bois, de séparer des écorces, de fendre des branches, & tuer des bêtes sauvages, de chasser pour leur nourriture, & de se défendre de leurs ennemis, ce qu'ils ne pouvoient guere executer qu'avec de tels instrumens, qui n'étant pas comme le fer sujets à la rouille, se retrouvent aujourd'hui dans la terre en leur entier & presque avec leur premier poli.

Comme il est assés ordinaire que des choses d'un genre très-different portent quelquefois le même nom, & que celui de *Pierre de foudre* qui ne devoit convenir qu'à celle que j'ai décrite, se donne encore en *François* à une espece de Marcassite vitriolique, de figure ou oblongue ou arrondie, tantôt hérissée de pointes, tantôt lisse & tantôt à facettes, je suis bien aise d'avertir qu'elle ne doit point être confondue avec cette première, non seulement parce qu'elle ne lui ressemble en rien par rapport à la figure, & qu'au contraire elle en est très-different par les propriétés qu'elle a de fuser & de se convertir en Vitriol, lorsqu'elle est exposée à l'air, au lieu que celle dont je parle, est une vraie Pierre très-dure, d'un grain si fin qu'elle sert de Pierre de touche pour les métaux, & à polir differens Ouvrages.



*SUR LES FIGURES
INSCRITES ET CIRCONSCRITES
AU CERCLE.*


Par M. SAURIN.

* C'EST une propriété de ces Figures, très-connuë des Geometres, que l'Aire d'une Figure inscrite est moyenne proportionnelle geometrique entre l'Aire de l'inscrite & celle de la circonscrite qui ont la moitié moins des côtés. Ainsi, par exemple, l'Exagone inscrit est moyen proportionnel geometrique entre le Triangle équilatéral inscrit & le Triangle équilatéral circonscrit; l'Octogone entre le Quarré inscrit & le circonscrit; le Decagone entre le Pentagone inscrit & le circonscrit, &c. Mais je ne sai si l'on a remarqué de même dans ces Figures une autre propriété qui a du rapport à celle-là, & qui ne merite pas moins d'être remarquée; c'est que l'Aire de toute Figure réguliere circonscrite au Cercle, est moyenne proportionnelle harmonique entre l'Aire de la même Figure inscrite & celle de la circonscrite qui a la moitié moins de côtés; ainsi l'Exagone circonscrit est moyen proportionel harmonique entre l'Exagone inscrit &c.

& le Triangle équilatéral circonscrit; l'Octogone circonscrit entre l'Octogone inscrit & le Quarré circonscrit; le Décagone circonscrit entre le Dodécagone inscrit & le Pentagone circonscrit, &c.

Voici comme je démontre cette propriété, qui s'est présentée à moi par hazard, en examinant par ordre de l'Académie une prétendue Quadrature du Cercle.

Soit mené dans le Cercle BEG le côté BE d'une figure régulière le Rayon CE ; la Tangente EA qui rencontre en A , CB prolongé, & la Tangente BF , rencontrant en F la Tangente EA , il est évident que BEC étant une partie de la Figure inscrite,



BFE une partie correspondante de la même Figure circonscrite, & ACE une partie de la circonscrite qui a la moitié moins de côtés: ce qu'on démontrera de la partie ACE

par rapport aux parties $BFEC$, & BEC sera démontré des Figures entieres.

Les Triangles ACE & BEC ayant même hauteur, sont entr'eux comme leurs bases AC , BC ; il faut donc démontrer que ABF qui est l'excès dont AEC surpasse $BFEC$ est à BFE , excès dont $BFEC$ surpasse BEC , comme AC à BC .

Les Triangles ABF & BFE sont entr'eux comme AF à FE , ou (à cause que FB est égale à FE) comme AF à FB . Mais les Triangles ABF & ACE étant rectangles & ayant l'angle BAF commun, sont semblables. Donc AF est à FB comme AC à CE ; ou CE étant égale à CB , comme AC à CB ; donc les Triangles ABF , BFE , sont entr'eux comme AC à CB . Ce qu'il falloit démontrer.



F X A M E N

D'une MATIERE CUIVREUSE, qui est une espece de Verd-de-gris naturel.

Par M. DE REAUMUR.

* S'IL est des délassemens loüables, ce sont certainement ceux qui contribuent à étendre nos connoissances. Il est rare que les particuliers les choisissent, & au moins aussi rare qu'ils soient du goût des Princes.

II

Il n'en est pourtant point de plus agreable pour S. A. S. Monseigneur le Duc de *Chartres* que ceux de cette espece. Dans les instants qu'il ne doit point aux plus importantes occupations, rien ne l'amuse davantage que ce qui peut lui donner de nouvelles connoissances, sur-tout par rapport à l'Histoire naturelle & à la Physique. Comme ce goût, si estimable, est très-connu, on s'empresse à lui offrir ce que ces Sciences ont de nouveautés curieuses ou utiles. Il y a quelque temps qu'on lui presenta divers morceaux de la Matiere minerale dont je vais parler, & ce sont les ordres que me fit l'honneur de me donner S. A. S. qui m'ont engagé à l'examiner.

Cette matiere a été apportée des *Indes* par morceaux de figures irrégulieres & de différentes grosseurs. Un de ceux qui m'a été remis avoit au moins six pouces & demi de diametre, dans le sens où il en avoit le plus, & environ quatre dans celui où il en avoit le moins. La couleur seule de cette matiere inviteroit à l'observer; elle est du plus beau verd & du plus vif, tirant sur celui des *Emeraudes*. Mais ce verd est principalement remarquable par un œil soyeux & satiné, qu'on ne trouve point dans les verds des Pierres & des Plantes. Cet œil satiné est une suite de la structure de notre Mineral. Quelque part où on le casse, il ne semble qu'un amas de vegetations*; on voit partout des especes de branchages qui par leurs contours imitent ceux des arbrisseaux, ou

au

au moins les plus belles de ces productions de la Chimie auxquelles on a crû devoir donner le nom de *vegetations*. Plusieurs de ces branchages partent d'une même base, & forment ensemble une même touffe *. Chaque morceau de notre Mineral est composé d'un grand nombre de parcelles touffes de différentes hauteurs ; les unes n'ont qu'un pouce, d'autres en ont trois ou quatre ; tantôt c'est du sommet de l'une, tantôt c'est du côté & vers le milieu d'une autre qu'une nouvelle touffe s'élève. Les différents branchages sont assés ferrés les uns contre les autres pour composer une masse compacte ; ils ne laissent guere de vuides considerables, il y a pourtant des endroits où les vuides sont sensibles.

Ces branchages sont la première singularité de la structure de notre Mineral ; leur composition propre en est une autre. Ils sont faits chacun d'une infinité de filets † extrêmement déliés, appliqués les uns contre les autres ; chaque branchage est un paquet de ces filets ‡. De-là vient que la couleur du Mineral a un air soyeux & satiné ; tel que l'auroient des paquets de fil de soye, s'ils pouvoient avoir tout l'éclat d'une matiere naturellement plus compacte & plus polie que la soye. En un mot, sa structure ressemble à celle de l'Amiante & à celle de certains Gyps singuliers formés par filets. Cette matiere est medio-cement dure, à peu-près comme le sont l'Alun & le Vitriol ; mais elle est plus friable entre les doigts : si on l'y frotte, on la divise assés

* Fig. 2. † Fig. 5. ‡ Fig. 4.

allés souvent en petits brins d'une finesse extrême.

Elle est pesante; elle est absolument insipide au goût, mais il est de la prudence de la goûter sobrement. Elle ne se dissout point, ou se dissout peu dans l'eau commune.

La pesanteur de cette matiere dispose naturellement à la regarder comme metallique, & sa couleur conduit à penser qu'elle n'est qu'un Cuivre deguisé, un Cuivre préparé par la nature, comme nôtre Verd-de-gris est un Cuivre préparé par l'art, en un mot qu'elle est une espece de Verd-de-gris naturel. J'ai d'autant moins douté qu'elle ne fut de nature cuivreuse, que j'en ai trouvé de semblable, mais en petite quantité, au milieu de quelques morceaux de Mine de Cuivre du Royaume.

Pour m'assurer davantage de sa nature, j'en suis venu aux essais. J'ai commencé, comme on commence toujours pour préparer les Mines à être essayées, par la faire piler, & réduire en poudre très-fine. On fait qu'avant d'en venir à séparer, par la fusion, la matiere metallique des autres matieres avec lesquelles elle peut être mêlée, qu'on fait rôtir la mine, & que pour de simples essais en petit, cette operation se fait dans une cuillere de fer mise sur le feu; qu'on y chauffe à différentes reprises la poudre minerale jusques à rougir. Cette manipulation change ordinairement la couleur de la poudre minerale. Elle a aussi enlevé à la nôtre sa couleur verte; elle lui en a donné une noire, elle l'a renduë semblable à du charbon pilé.

Pour en venir à l'essai, j'ai mis de cette poudre dans un creuset, exposé d'abord à un

un feu mediocre que par la suite j'ai rendu plus vif, & bien-tôt j'ai eu une nouvelle preuve de sa nature cuivreuse. Il s'est bien-tôt échapé une flamme verdâtre entre les bords du creuset & ceux de son couvercle; une flamme toute pareille à celle qui paroît lorsqu'on brase quelque piece de fer avec du cuivre. Le feu étant poussé ensuite assés vigoureusement, la matiere a fondu. Quand j'ai crû le degré de fusion suffisant, j'ai retiré le creuset du feu, & l'ai laissé refroidir; l'ayant cassé ensuite, j'ai trouvé au fond du creuset un culot assés semblable par sa couleur à du Cuivre de rosette, mais d'une matiere cassante comme du verre.

Il est rare que les matieres minerales contiennent un metal assés peu déguisé pour qu'un essai aussi simple que celui dont je viens de parler le fasse paroître sous sa forme metallique. Il y a même des Mines, de toute espece, qui ne seroient pas mises en fusion par une operation si peu composée. Enfin les Mines de Cuivre fonduës même avec les secours de differents fondans, ne donnent d'abord qu'une matiere cassante comme celle dont je viens de parler, mais qui n'a nullement la couleur du Cuivre, qui est noire, & qu'on appelle aussi du *Cuivre noir*.

La couleur de la matiere venue de ces essais m'a fait conclure que notre Mine contenoit un Cuivre qui pour être revivifié, ne demandoit qu'à être penetré de parties sulfureuses, dont apparemment il avoit été depouillé. J'ai donc crû que pour tout appereil il suffiroit de mettre nôtre poudre minerale dans un creuset où elle seroit entou-
rée

rée de poudre de charbon. J'ai pesé dans les balances d'essai un quintal de cette poudre. On sait que le quintal d'essai est un très-petit poids, & n'est ordinairement qu'un gros. J'ai mis de la poudre de charbon dans le fond d'un petit creuset, j'ai mis au dessus notre quintal ou gros de Mine, & j'ai achevé de remplir le creuset avec de la poudre de charbon, je l'ai ensuite exposé à la forge au feu du soufflet; dans moins d'une demi-heure la matiere a été fondue. Quand le creuset a été refroidi, j'ai trouvé au fond un bouton ou culot de Cuivre malleable qui pesoit soixante-dix de nos petites livres, c'est-à-dire, soixante-dix parties de la masse que j'avois pesée. Probablement elle en eût pesé davantage, si le creuset eût été plutôt tiré du feu, mais je cherchois plus à m'assurer de la qualité de la matiere que de sa quantité.

Le culot de matiere cassante que j'avois eu par mon premier essai, ayant été remis au feu au milieu de la poudre de charbon, y a été aussi revivifiée en véritable Cuivre: il est devenu une matiere malleable.

J'ai voulu essayer la même Matiere par des procédés plus composés qu'on suit, & qu'il est nécessaire de suivre pour d'autres matieres minerales, c'est-à-dire, en repetant les fusions, comme il est enseigné dans *Erker*, & ailleurs, & y ajoutant differens sels. Par le moyen de ces essais, j'ai aussi tiré du Cuivre de notre Mineral, mais bien moins que par le moyen de la seule poudre de charbon.

Nous pouvons donc regarder cette matiere minerale comme un Cuivre qui a été dis-

dissous, & à qui sa matiere huileuse a été enlevée. C'est un verdet naturel, différent pourtant de l'ordinaire, non seulement par sa couleur, mais encore par sa composition. J'ai mis notre Verd-de-gris commun dans un creuset au milieu de la poudre de charbon, il ne s'y est point fondu, il n'y est point redevenu Cuivre. Pourquoi cela ? c'est que notre verdet est du Cuivre dissous par les acides du vin, du Cuivre pénétré par ces acides ; mais pendant cette dissolution la partie huileuse de ce Cuivre n'a point été enlevée. Le verdet artificiel semble donc différer de notre verdet naturel, en ce que le dernier est dépouillé de sa partie huileuse, au lieu que l'autre a conservé la sienne ; peut-être différent-ils encore par la quantité & la qualité des acides dont ils sont pénétrés.

Qu'on tire au moins de ce que nous venons de dire, une remarque pour se conduire dans les essais des Mines de Cuivre, c'est qu'il y en a qu'il faut essayer avec la poudre de charbon seule, & qu'on essayeroit avec moins de succès avec les sels, telles sont celles qui ont été dépouillées de leur matiere sulphureuse.

Nous pouvons donc regarder notre Minéral comme une dissolution de Cuivre qui s'est ensuite cristallisée en formant différents branchages. Aussi avons-nous fait remarquer que les fragments des branches semblent de vrais cristaux, des especes d'Émeraudes moins transparentes que les véritables. Mais la beauté de la couleur des cristaux de notre Mine fait voir que le Cuivre préparé par la nature d'une matiere semblable, peut

peut donner aux pierres transparentes avec lesquelles il sera mêlé la plus belle couleur verte, qu'il en peut faire de véritables Emeraudes.

Si on nous demandoit si ces Crystaux ont été formés par un suc chargé de matiere cuivreuse, qui par son propre poids perçoit des terres, dans les cavités desquelles il déposoit des parties qui s'arrangeoient en branchages; ou si ces touffes ont été formées comme les vegetations chimiques, par un liquide qui s'élevoit, & ne pouvoit porter les parties métalliques que jusques à une certaine hauteur. Si, dis-je, on nous le demandoit, nous répondrions que nous n'avons pas assez de faits pour décider de laquelle des deux manieres s'est faite cette production. Il faudroit même pousser les experiences plus loin que nous ne l'avons fait, pour décider quel est précisément le sel qui a dissous le Cuivre, quoi-que selon les apparences il soit de la nature de l'acide vitriolique.

Les filets, qui rendent la structure de ce Mineral remarquable, ne sont point un phenomene particulier qui ait besoin d'être expliqué, dès qu'il n'est qu'une matiere métallique dissoute par beaucoup de sels; il est ordinaire à bien des sels de se disposer par éguilles. On sait que les *Pyrites* ne sont qu'un composé de soufres & de sels; quand on les garde plusieurs années, & sur-tout si elles sont exposées à l'humidité de l'air, elles s'y dissolvent, leur surface se couvre d'éguilles de sel; souvent ces sels s'y arrangent par touffes composées de filets blancs, qui semblent autant de petites touffes de soye.

Nous

22 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Nous n'avons rien dit d'un autre phénomène, que nous avons observé pendant que nous faisons rôtir notre matière, qui peut-être ne doit pas être oublié, quoi-qu'il ne lui soit pas particulier. Pendant qu'on rôtit la poudre fine de ce Mineral, pendant que sa couleur verte se change en une couleur noire, il s'y fait des bouillonnemens assez singuliers, & ils le font d'autant plus que la poudre a été mise dans un vase plus étroit. On voit, par exemple, mieux ce bouillonnement dans un creuset conique que dans une cuillère de fer. Ces bouillonnemens se font en différents endroits, & continuent pendant quelque temps dans les mêmes endroits où ils ont commencé. La poudre s'élève sur chacun de ces endroits à la hauteur d'un pouce & davantage; au dessous de l'endroit où elle a commencé à faillir, il se forme un petit trou en maniere de tremie, & c'est par ce même trou que de nouvelle poudre sort continuellement. Le bouillonnement qui a commencé, continué, quoi-qu'on retire le creuset du feu. Si ce bouillonnement cesse quelque part, dans le temps que la poudre a encore un degré de chaleur considérable, on n'a qu'à percer la surface en un autre endroit pour déterminer un nouveau jet de poudre à s'y former.

La cause de ce bouillonnement ne peut être attribuée qu'aux parties volatiles qui se dégagent de notre poudre, quand elle a pris un certain degré de chaleur; on les supposera sulfureuses, salines, ou si l'on veut, simplement aqueuses, il n'importe pour l'explication de ce fait. Il suffit qu'on imagine

gine qu'une vapeur cherche à s'élever de tous les petits grains, qu'une partie de la vapeur a la force de percer la surface, qu'elle s'échape, & qu'elle forme une route où de nouvelle vapeur va se rendre. Les petits trous en tremie qui paroissent ensuite sont tout autant de cheminées vers où cette vapeur se dirige; cette espee de fumée emporte les grains qu'elle rencontre en son chemin, elle les enleve même assés haut.

Une vraye preuve que c'est l'évaporation d'une matiere très-volatile qui produit cet effet, c'est que si la poudre est rôtie à un certain point, on a beau la chauffer, il ne s'y formera plus de jets, plus de bouillonnemens. Cet effet doit être d'autant plus considerable que la poudre sera plus legere, & qu'elle fournira plus de vapeurs.

J'ai voulu essayer si la poudre de charbon ne produiroit pas le même effet; elle ne bout point d'elle-même comme la nôtre, mais on peut la déterminer à bouillir, à donner de petits jets, il n'y a qu'à la percer quand elle est très-échauffée: les jets seront moins considerables que ceux de nôtre matiere, mais ils seront semblables.

La poudre de charbon peut encore servir à nous faire voir la vraye cause du bouillonnement de nôtre poudre; je l'ai fait extrêmement chauffer dans un creuset, & j'ai subitement plongé le creuset chaud dans l'eau froide, aussi-tôt le charbon s'est élevé en jets, il s'y est formé grand nombre de bouillonnemens & beaucoup plus considerables que ceux dont j'ai parlé ci-dessus; l'eau imbiboit le creuset; après l'avoir traversé, elle s'é-

levoit en vapeurs , assés fortes pour porter haut la poudre qui s'opposoit à leur passage. La preuve qu'une pareille vapeur s'élevoit du creuset, c'est que quand il a été refroidi, ses parois interieures ont paru très-humides.

On fait aussi que le plâtre, chauffé sur le feu dans quelque vase, y bout; mais j'ignore si on a observé que la cause de son bouillonnement n'est dûë qu'à une vapeur aqueuse qui cherche à s'élever. La preuve en est que l'experience réussit d'autant mieux que le plâtre a été plus long-temps exposé à l'humidité de l'air, & que lorsqu'il a été chauffé jusques à un certain point, ou pendant un certain temps, alors il ne bout plus.

Pour produire cette espece de bouillonnement dans une poudre, il faut donc, comme nous l'avons déjà remarqué, que deux circonstances concourent; savoir, que les parties de la poudre soient legeres & fines, & qu'elles soient propres à fournir quelques vapeurs, ou qu'elles soient humides. Voici la preuve de la necessité de l'une & de l'autre de ces circonstances. J'ai tenté de faire bouillir de la poudre d'os brûlés, elle est très-pesante, aussi n'a t-elle donné aucun bouillonnement, quand elle a eu un degré de chaleur qui eût suffi à faire bouillir le plâtre. J'ai jetté dessus une goutte d'eau, ou pour rapporter plus naïvement l'experience, j'ai craché dessus, aucun bouillonnement ne s'est fait encore dans cet instant; mais ayant mêlé la poudre avec un bâton, afin qu'elle recouvrit la salive que j'y avois jettée, alors les bouillonnemens ont commencé. Il s'en fai-

faisoit de nouveaux par tout où je conduisois la poudre humectée au dessous de la poudre sèche, les bouillonnemens étoient très-considérables, la quantité de la vapeur forçoit la poudre, quoi-que pesante, à s'élever très-haut.

La Glaïse pilée & réduite en poudre très-fine, le Marbre pilé, & en general toute matiere réduite en poudre fine, font voir de pareils bouillonnemens, si ces matieres sont un peu humides; & cela sera commun, comme nous l'avons dit, à toute poudre fine & legere, tant qu'elle laissera évaporer sur le feu une suffisante quantité d'humidité. Des vapeurs d'une autre espee qui s'éleveroient en aussi grande quantité, ou avec autant de force, produiroient le même effet, car cet effet n'est point celui de l'eau, c'est celui de la vapeur en general.

EXPLICATION DES FIGURES.

La FIGURE I. represente un morceau de notre Minéral cuivreux diminué de volume.

La FIG. II. represente une des touffes dont la masse precedente est formée.

La FIG. III. est une portion de touffe grossie à la Loupe.

La FIG. IV. est un des branchages de la touffe, grossi au Microscope, pour faire voir l'arrangement des filets dont il est composé.

La FIG. V. est celle des filets qui composent les branchages.



SECONDE PARTIE.

DU CALCUL

DES DIFFERENCES FINIES.

Par M. NICOLE.

* JE me propose dans ce Memoire, de donner des methodes pour sommer des Suites de grandeurs, dont chaque terme est composé des produits de tant de facteurs qu'on voudra, augmentant selon une loi quelconque, mais uniforme, soit que ces Suites soient formées par des nombres entiers, ou des fractions, & qu'elles soient composées d'un nombre fini de termes pour les grandeurs entieres, & d'un nombre fini ou infini de termes pour les grandeurs rompuës.

Toutes les suites qui peuvent être sommées par la methode que l'on explique dans ce Memoire, ne peuvent l'être par celles que j'ai données sur cette matiere dans un Memoire imprimé en 1717, dans lequel cette seconde partie a été annoncée.

On divise cette seconde partie en deux sections, dont la première regardera les suites composées de nombres entiers, & la seconde celles composées de fractions.

SEC-

Fig. 2.



Fig. 4.



SECTION I.

Des Suites composées de nombres entiers.

Soit cette suite $x, x+n, x+2n, x+3n, x+m, x+m+n, x+m+2n, x+m+3n, x+2m, x+2m+n, x+2m+2n,$

$x+2m+3n$ &c. dans laquelle les facteurs d'un même terme augmentent de la grandeur constante n , & pour devenir les facteurs du terme suivant, ils augmentent de la grandeur constante m .

Lorsque ces deux grandeurs m & n sont

égales, la suite devient $x, x+n, x+2n, x+3n,$

$x+n, x+2n, x+3n$ &c. où l'on voit que le premier facteur du second terme est le second facteur du premier terme, & ainsi des autres. Ce qui est le cas du *Memoire imprimé en 1717*, où l'on a donné une méthode pour prendre la différence de telles suites, & la manière de les intégrer. Cette méthode ne peut satisfaire qu'à un petit nombre de cas, puisque le premier facteur du second terme peut être à telle distance indéterminée qu'on voudra du premier facteur, & ainsi des autres.

PROPOSITION I.

Soit cette expression algebrique $x, x+n$
B 2 com-

28 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
composée de deux facteurs dont on deman-
de la différence, en supposant que l'augmen-
tation faite à x soit m , cette expression de-

vient par cette augmentation $x+m$. $x+m+n$;

la différence de l'une à l'autre est donc $x+m$.

$x+m+n-x$. $x+n$. & en mettant pour

$x+m$, $x+n+m-n$, on aura $x+n+$

$m-n \times x+2n+m-n-x$. $x+n$, la
multiplication étant faite, il vient

$x+n$. $x+2n+x+n$. $m-n+x+2n$.

$m-n+m-n-x$. $x+n=x+n$. $x+2n$

$+x+n$. $m-n \times 2+n$. $m-n+m-n-x$.

$x+n$ qui se réduit à $(A) x+n$. $x+2n+$

$2m-2n$. $x+n+m \times m-n-x$. $x+n$,

& effaçant les termes qui se détruisent, il

vient $2m$. $x+n+m$. $m-n$ pour la diffé-

Soit maintenant cette expression algebr-

que x . $x+n$. $x+2n$ composée de trois
facteurs, dont on demande la différence, en
supposant que la quantité dont x croît est m .

Il est clair que cette expression deviendra

par l'accroissement $x+m$. $x+n+m$. $x+$

$2n$.

$2n + m$, ou $x + n + m - n$, $x + 2n + m - n$, $x + 3n + m - n$ dont il faut retran-

cher x , $x + n$, $x + 2n$. Le produit des deux premiers facteurs est en A . Si donc on mul-

tiplie ce produit par $x + 3n + m - n$, on aura

$x + n$, $x + 2n$, $x + 3n + 2$, $m - n$, $x + n$.

$x + 3n + m$, $m - n$, $x + 3n + m - n$.

$x + n$, $x + 2n + 2$, $m - n$, $x + n + m$.

$m - n - x$, $x + n$, $x + 2n$, cette quantité se réduit, en observant que chaque terme

ait des facteurs consecutifs, à $x + n$, $x + 2n$.

$x + 3n + 2$, $m - n$, $x + n$, $x + 2n + 2$, $m - n$.

$n \times x + n + m$, $m - n$, $x + n + m$, $m - n$.

$2n + m - n$, $x + n$, $x + 2n + 2$, $m - n$.

$x + n + m$, $m - n - x$, $x + n$, $x + 2n$,

ou (B) $x + n$, $x + 2n$, $x + 3n + 3$, $m - n$.

$x + n$, $x + 2n + 3$, m , $m - n$, $x + n + m$.

$m - n$, $m + n - x$, $x + n$, $x + 2n$ qui se réduit, en effaçant les termes qui se détruisent, à cette expression

B. 3

3 m.

$$\begin{array}{r} 3m \cdot x + n \cdot x + 2n + 3m \cdot m - n \cdot x + n + m. \\ \hline \end{array}$$

$m - n$, $m + n$ la différence cherchée.

Pour la différence de cette expression

composée de quatre facteurs $x \cdot x + n \cdot x + 2n$.

$x + 3n$, la quantité m étant toujours l'accroissement des facteurs, on trouvera

$$\begin{array}{r} x + n + m - n \times x + 2n + m - n \times x + 3n \\ \hline + m - n \times x + 4n + m - n - x \cdot x + n. \\ \hline \end{array}$$

$x + 2n$, $x + 3n$, le produit des trois premiers facteurs a été trouvé en B. Si donc

on multiplie B par $x + 4n + m - n$, il viendra

$$\begin{array}{r} x + n \cdot x + 2n \cdot x + 3n \cdot x + 4n + 3 \cdot m - n. \\ \hline x + n \cdot x + 2n \cdot x + 4n + 3m \cdot m - n \cdot x + n. \\ \hline x + 4n + m \cdot m - n \cdot m + n \cdot x + 4n + m - n. \\ \hline x + n \cdot x + 2n \cdot x + 3n + 3 \cdot m - n \cdot x + n. \\ \hline x + 2n \cdot + 3m \cdot m - n \cdot x + n + m \cdot m - n. \\ \hline \end{array}$$

$m + n - x \cdot x + n \cdot x + 2n \cdot x + 3n$, & en réduisant tous les termes à avoir des facteurs consecutifs, on aura

$$\begin{array}{r} x + n \cdot x + 2n \cdot x + 3n \cdot x + 4n + 3 \cdot m - n. \\ \hline x + \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline x+n. & x+2n. & x+3n+3n. & m-n. & x+n & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline x+2n+3m. & m-n. & x+n. & x+2n+3m. & & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline m-n. & 2n. & x+n+m. & m-n. & m+n. & x+n & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline +m. & m-n. & m+n. & 3n+m-n. & x+n. & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline x+2n. & x+3n+3. & m-n. & x+n. & x+2n & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline +3m. & m-n. & x+n+m. & m-n. & m+n & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline -x. & x+n. & x+2n. & x+3n, & \text{qui se réduit} & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline 2x+n. & x+2n. & x+3n. & x+4n+4. & m-n. & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline x+n. & x+2n. & x+3n+6m. & m-n. & x+n. & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline x+2n+4m. & m-n. & m+n. & x+n+m. & & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline m-n. & m+n. & m+2n-x. & x+n. & x+2n. & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline x+3n, & \& \text{en effaçant les termes qui se dé-} & & & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline \text{truisent, il vient } 4m. & x+n. & x+2n & x+3n & & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline +6m. & m-n. & x+n. & x+2n+4m. & m-n. & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline m+n. & x+n+m. & m-n. & m+n. & m+2n, & & \\ \hline \end{array}$$

pour la différence cherchée.

Enfin si l'on cherche la différence de cette quantité composée de cinq facteurs x .

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ \hline x+n. & x+2n. & x+3n. & x+4n, & m \text{ étant} & & \\ \hline \end{array}$$

l'augmentation, on trouvera $x - n. x + 2n.$

$$x + 3n. x + 4n. x + 5n + 5. m + n. x + n.$$

$$x + 2n. x + 3n. x + 4n + 10 m. m - n.$$

$$x + n. x + 2n. x + 3n + 10 m. m - n.$$

$$m + n. x + n. x + 2n + 5 m. m - n. m + n.$$

$$m + 2n. x + n + m. m - n. m + n. m + 2n.$$

$$m + 3n - x. x + n. x + 2n. x + 3n. x + 4n.$$

qui se réduit à $5 m. x + n. x + 2n. x + 3n.$

$$x + 4n + 10 m - n. m. x + n. x + 2n.$$

$$x + 3n + 10. m - n. m. m + n. x + n.$$

$$x + 2n + 5. m - n. m. m + n. m + 2n.$$

$$x + n + m - n. m. m + n. m + 2n. m + 3n.$$

D'où il suit cette Regle generale.

REGLE GENERALE

Pour prendre la difference finie d'une grandeur composée de tant de facteurs qu'on voudra, lesquels augmentent selon une loi arithmetique quelconque; Et la quantité qui exprime l'augmentation que l'indéterminée doit recevoir, étant aussi telle qu'on voudra.

1. La difference cherchée contiendra autant de termes que la grandeur, dont on cher-

cherchoit la difference, contenoit de facteurs.

2. Pour avoir le premier terme, il faut d'abord multiplier par le nombre des facteurs, ensuite par la difference ou l'augmentation que l'indéterminée doit recevoir qui est m , & enfin retrancher le premier facteur.

3. Pour avoir le second terme, il faut multiplier le coefficient du premier par le nombre de ses facteurs, & diviser par 2, en-

suite multiplier par $m - n$, & retrancher le dernier facteur.

4. Pour avoir le troisième terme, il faut multiplier le coefficient du second par le nombre de ses facteurs, & diviser par 3, en-

suite multiplier par $m + n$, & retrancher encore le dernier facteur de ce terme.

5. Pour avoir le quatrième terme, il faut multiplier le coefficient du troisième par le nombre de ses facteurs, & diviser par 4, puis

multiplier par $m + 2n$, & retrancher le dernier facteur, & ainsi de suite.

COROLLAIRE I.

Il suit de ce qui vient d'être dit, que la difference d'une grandeur composée de plusieurs facteurs contient autant de termes moins un que la puissance d'un binôme qui seroit égale au nombre de ces facteurs, & que les coefficients sont aussi ceux du binôme dont on auroit retranché le premier terme.

COROLLAIRE II.

Si l'on suppose $m=n$, tous les termes où $m=n$ se trouve, s'évanouissent, & alors les différences qui ont été trouvées se réduisent à

$$2n. x+n.$$

$$3n. x+n. x+2n.$$

$$4n. x+n. x+2n. x+3n.$$

$5n. x+n. x+2n. x+3n. x+4n.$ &c.
qui est le cas du premier Memoire imprimé en 1717.

COROLLAIRE III.

Si l'on suppose $n=0$, les quantitez composées de plusieurs facteurs deviendront des Quarrés, des Cubes, des 3^{mes}, 4^{mes} ou 5^{mes} puissances, &c. Et en effaçant dans les différences trouvées les quantitez où n se trouve, on aura

$2mx+mm$ pour la difference des Quarrez.

$3mxx+3m^2x+m^3$ pour celle des Cubes.

$4mx^3+6m^2mx+m^4$ pour celle des 4^{mes} puissances.

$5mx^4+10m^2mx^3+10m^3xx+m^5$ pour celle des 5^{mes} puissances.

REMARQUE.

Si l'on examine la maniere dont ces différences

ferences ont été trouvées, & les différentes parties dont elles sont composées, on verra de quelle manière il faut les décomposer, pour retrouver l'expression algébrique dont elles sont la différence. Cette expression algébrique s'appellera *l'intégrale de la différence donnée*.

Mais comme à la différence donnée il peut manquer plusieurs parties, pour qu'elle puisse être intégrée, voici la méthode de découvrir ces parties manquantes, & de trouver l'intégrale d'une différence quelconque.

PROPOSITION II.

Une expression algébrique composée de tant de facteurs qu'on voudra, augmentant selon une proportion arithmétique, trouver son intégrale.

I. Soit la quantité $x+n$, dont on demande l'intégrale (on suppose que la grandeur, dont x croît, est m .) Pour la trouver, soit

supposé $Ax \cdot x+n + Bx$ être l'intégrale qu'on cherche, les coefficients A & B sont indéterminés & constants. Si l'on prend la différence de cette formule, on trouvera

$$2Am \cdot x+n + Am \cdot m-n, \text{ laquelle doit } + Bm.$$

égale à la différence donnée. On aura donc cette équation

$$2Am \cdot x+n + Am \cdot m-n = x+n + Bm.$$

Si l'on compare les termes de cette équation

36. MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

tion qui ont les mêmes facteurs, il resultera ces deux nouvelles équations

$2Am.x+n=x+n$, & $A.m-n+B=0$,
la première donne $A=\frac{1}{2m}$, & la seconde
donne $B=-\times\frac{m-n}{2m}$. Si donc on substitue
dans l'integrale supposée les valeurs de
 A & de B , on aura $\frac{x.x+n}{2m}-\times\frac{m-n}{2m}$ pour
l'integrale cherchée, ce qui est évident; car
si l'on prend la difference de cette quantité,
on trouvera $x+n+\frac{m-n}{2}-\frac{m-n}{2}=x+n$
qui étoit la difference proposée.

II. Soit la quantité proposée $x+n, x+2n$
dont on demande l'integrale, on supposera
que cette integrale est

$$Ax.x+n.x+2n+B.x.x+n+C, \text{ dont la difference est } \\ 3Am.x+n.x+2n+3Am.m-n.x+n+Am.m-n.m+n \\ +2Bm.x+n+Bm.m-n+Cm$$

laquelle difference doit être égale à la difference
donnée $x+n, x+2n$.

Si l'on compare les termes homologues de
cette Equation, on aura $3Am=1$, $3Am.$

$$m-n=-2Bm, \text{ \& } Am.m-n, m+n \\ +Bm.m-n=-Cm, \text{ d'où resulte } A=\frac{1}{3m}$$

$$B=-\frac{m-n}{2m}, C=-\frac{m-n.m+n}{3m}+\frac{m-n}{2m}=$$

$$m-n$$

$\frac{m-n}{6m} \cdot \frac{m-5n}{6m}$, & si l'on substitue dans l'integrale supposée pour A, B, C , les valeurs que l'on vient de trouver, on aura $\frac{x \cdot x+n \cdot x+2n}{3m}$

$\frac{m-n}{2m} \cdot \frac{x \cdot x+n}{6m} + \frac{m-n}{6m} \cdot \frac{m-5n \cdot x}{6m}$ pour l'integrale cherchée, ce qui est visible; car si

l'on en prend la difference, on aura $x+n$.

$$x+2n + m-n \cdot \frac{x+n}{3} + \frac{m-n}{3} \cdot \frac{m+n}{3} - x$$

$$m-n \cdot \frac{x+n}{2} - x \cdot \frac{m-n}{2} + \frac{m-n}{6} \cdot \frac{m-5n}{6} = \frac{x+n}{6}$$

$$x+2n + m-n \cdot \frac{m+n}{3} - \frac{m+n}{2} + \frac{m-5n}{6}$$

$$= x+n \cdot x+2n$$

III. Soit la quantité $x+n \cdot x+2n \cdot x+3n$, dont on demande l'integrale.

On supposera que cette integrale est

$$Ax \cdot \frac{x+n}{3} + B \cdot \frac{x+n}{2} + C \cdot \frac{x+n}{6} + D \cdot x$$

Dont la difference est

$$\begin{array}{r}
 4Am. x + 0. x + 2n. x + 3n + 6Am. m - n. x + n. x + 2n + 4Am. m - n. m + n. x + n + 4m \times m - n. m + n. m + 2n \\
 + 3Bm. x + n. x + 2n \quad + 3Bm. m - n. x + n \quad + Bm. m - n. m + n \\
 + 2Cm. x + n \quad + Cm. m - n \\
 + D. m
 \end{array}$$

Cette

Cette difference est égale à la difference

proposée $x+n$. $x+2n$. $x+3n$. Si donc on compare les termes homologues de cette Equation, on aura $4Am=1$,

$$3B=-6A. \frac{m-n}{m}, 2C=-4A. \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m}$$

$$-3B. \frac{m-n}{m}, D=-A. \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} \cdot \frac{m+2n}{m}$$

$$-B. \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} - C. \frac{m-n}{m}, \text{ d'où résulte}$$

$$A = \frac{1}{4m}, B = -\frac{m-n}{2m}, C = -\frac{m-n}{2m} \cdot \frac{m+n}{m}$$

$$+3 \cdot \frac{(m-n)^2}{4m^2}, \text{ \& } D = -\frac{m-n}{4m} \cdot \frac{m+n}{m} \cdot \frac{m+2n}{m}$$

$$+ \frac{(m-n)^2}{2m^2} + \frac{(m-n)^2}{2m^2} - 3 \cdot \frac{(m-n)^3}{4m^3}$$

$$\text{ces valeurs se reduisent à } A = \frac{1}{4m}, B =$$

$$-\frac{m-n}{2m}, C = \frac{m-n}{4m} \cdot \frac{m-n}{m}, D =$$

$$\frac{m-n}{4m} \cdot \frac{3n}{m} - \frac{3n^2}{m^2}$$

Si l'on substitue dans l'integrale supposée les valeurs de A, B, C, D , que l'on vient de déterminer, on aura pour l'integrale

$$\text{cherchée } \frac{x \cdot x+n \cdot x+2n \cdot x+3n}{4m^2} - \frac{m-n}{2m} \cdot \frac{x \cdot x+n \cdot x+2n}{m}$$

$$+ \frac{m-n}{4m} \cdot \frac{3n}{m} \cdot \frac{x \cdot x+n}{m} + \frac{m-n}{4m} \cdot \frac{3n}{m} \cdot \frac{m-3n}{m} \cdot \frac{x}{m},$$

ce qui est évident, car la difference de cette quantité

quantité est $x + n. x + 2 n. x + 3 n$

$$+ \frac{6. m - n. x + n. x + 2 n}{4} + m - n. m + n.$$

$$x + n + \frac{m - n. m + n. m + 2 n}{4} - \frac{3. m - n. x + n. x + 2 n}{2}$$

$$- \frac{3. m - n. x + n. x + 2 n}{2} - \frac{m - n. m + n}{2} +$$

$$\frac{m - n. m - 5 n. x + n}{2} + \frac{m - n. m - 5 n}{4} + \frac{3 n. m - n. m - 3 n}{4}$$

Le premier terme reste, le second s'évanouit, le troisiéme est $m - n \times m + n - \frac{3 m + 3 n}{2}$

$+ \frac{m - 5 n}{2} = \frac{m - n}{2} \times 0$ qui s'évanouit encore, le quatriéme est $m - n \times \frac{m m + 3 m n + 2 n n}{2}$

$$- \frac{m m + n n}{2} + \frac{3 m n - 9 n n}{4} + \frac{m 2 - 6 m n + 5 n 2}{4}$$

$= m - n \times 0 = 0$. Il ne reste donc que

$x + n. x + 2 n. x + 3 n$; ce qui doit être. Le premier, second & troisiéme terme, &c. sont distingués par la quantité des facteurs.

Application à la Recherche des sommes des Suites.

EXEMPLE I.

Soit la suite 3. 5 + 6. 8 + 9. 11 + 12. 14 + 15. 17 + &c. dont on demande la somme de tant de termes que l'on voudra.

Si

Si l'on examine cette suite, on verra que
 $n=2, m=3$. & qu'un terme quelconque de

cette suite peut être exprimé par $x+2 \times$

$x+4$, c'est donc l'intégrale de cette quantité que l'on cherche; car il est évident que cette intégrale sera la somme de toutes les

grandeurs représentées par $x+2 \times x+4$, lesquelles précèdent ce terme; c'est-à-dire que si $x+2. x+4$ est le quatrième terme, son intégrale sera la somme des trois premiers, & ainsi de suite, car la somme des trois premiers diffère de celle des quatre premiers, de la quantité du quatrième terme, qui est donc la différence de la somme des trois premiers.

L'intégrale de $x+n. x+2n$ a été trouvée

$$(\text{article 2.}) \frac{x \cdot x + n \cdot x + 2n}{3m} \times \frac{m-n \cdot x \cdot x + n}{2m}$$

+ $\frac{m-n \cdot m-5nx}{6m}$. Si donc on substitue pour

m & n leurs valeurs 3 & 2, on aura

$$\frac{x \cdot x + 2 \cdot x + 4}{9} - \frac{x \cdot x + 2}{6} - \frac{7x}{18} + q, \text{ la}$$

quantité q exprime ce qui manque, ou ce qu'il y a de trop à l'expression trouvée, pour qu'elle soit l'intégrale de la suite proposée. Pour trouver la valeur de q , il faut suppo-

ser que $x+2. x+4$ représente le premier terme de la suite, auquel cas la somme de

la

42 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
la suite doit être nulle. Cette supposition
donne $x=1$, & l'intégrale trouvée devient
par-là la substitution de $x=1$, $\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{9}$ —

$$\frac{1 \cdot 3}{6} - \frac{7}{18} = \frac{14}{18} \text{ ou } \frac{7}{9}, \text{ ce qui fait voir que}$$

$q = \frac{7}{9}$ doit être retranché de la grandeur
trouvée.

On aura donc pour l'intégrale cherchée

$$\frac{x \cdot x + 2 \cdot x + 4}{9} - \frac{x \cdot x + 2}{6} - \frac{7x}{18} - \frac{7}{9}$$

Si l'on veut avoir les cinq premiers termes
de la suite proposée, $x+2$, dans le sixième
terme, vaut 18, x est donc 16, en substi-
tuant 16 pour x , on trouve $\frac{16 \cdot 18 \cdot 20}{9}$ —

$$- \frac{16 \cdot 18}{6} - \frac{7 \cdot 16}{18} - \frac{7}{9} = 585 \text{ qui est la}$$

somme des cinq premiers termes. Si l'on
demande les 1000 premiers termes, on

aura le 1001^{me} terme, ou $x+2 \cdot x+4$
 $= 3003 \cdot 3005$ qui donne $x=3001$, les
1000 termes demandés sont donc

$$\frac{3001 \cdot 3003 \cdot 3005}{9} - \frac{3001 \cdot 3003}{6} - \frac{7 \cdot 3001}{18} - \frac{7}{9}$$

$$= 3007504500.$$

COROLLAIRE.

Si la suite proposée avoit été celle des
quarrés des nombres naturels pris à une
distance quelconque, mais toujours égale,

la difference $x+n \cdot x+2n$ seroit devenuë

$xx,$

xx , puisque dans cette supposition $n=0$,

& son integrale $\frac{x \cdot x + n \cdot x + 2n}{3m}$

$\frac{x \cdot x + n \cdot x + n}{2m} + \frac{m - n \cdot m - 5n \cdot x}{6m}$ deviendra

$\frac{x^3}{3m} - \frac{xx}{2} + \frac{1}{6}mx$ qui exprimera la somme de tant de quarrés de nombres naturels qu'on voudra, éloignés entre eux de la quantité m , à quoi il faut ajouter $\frac{1}{2} - \frac{1}{6}$

$m - \frac{1}{3m}$, parce que quand $x=1$, l'integrale

qui doit être nulle, devient $\frac{1}{3m} - \frac{1}{2} +$

$\frac{1}{6}m$. On aura donc $\frac{x^3}{3m} - \frac{xx}{2} + \frac{1}{6}mx$

$+ \frac{1}{2} - \frac{1}{6}m - \frac{1}{3m}$ pour l'integrale exacte.

Si donc on demande la somme des quarrés 1. 16. 49. 100. 169. 256. 361. 484. &c. ou $m=3$, on aura $\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}xx + \frac{1}{6}x - \frac{1}{3}$ pour la somme cherchée depuis le premier terme jusqu'au terme exprimé par xx .

Si l'on demande les quatre premiers, xx dans le cinquième terme vaut 13, donc $x=13$. Si donc l'on substitue cette valeur d' x , on aura $\frac{2197}{9} - \frac{169}{2} + \frac{13}{2} - \frac{1}{9} = 166$, ce qui doit être.

Si $m=1$, la formule deviendra $\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}xx + \frac{1}{6}x$, qui exprimera la somme des quarrés des nombres naturels pris de suite,

44 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
 suite, qui sont 1. 4. 9. 16. 25. 36. 49. &c.
 de maniere que si l'on demande la somme
 des sept premiers, le huitième sera 64, ou
 $x=8$. Si donc on substituë cette valeur, il
 viendra $\frac{512}{3} - \frac{64}{2} + \frac{8}{6} = 140$.

EXEMPLE II.

Soit la suite 2. 5. 8 + 7. 10. 13 + 12.
 15. 18 + 17. 20. 23 + &c. dont on de-
 mande la somme de tant de termes que
 l'on voudra.

Il est clair que dans cet exemple $n=3$,
 $m=5$, & qu'un terme quelconque de cet-
 te suite peut être exprimé par $x+3$. $x+6$.

$x+9$, x ayant successivement les valeurs
 — 1. 4. 9. 14. 19. 24.

$x+3$. $x+6$. $x+9$ est donc la difference
 de la somme que l'on cherche.

L'integrale de $x+n$. $x+2n$. $x+3n$, a

été trouvée (art. 3.) $\frac{x \cdot x + n \cdot x + 1n \cdot x + 3n}{4m}$

$\times \frac{m-n \cdot x \cdot x + n \cdot x + 2n}{2m} + \frac{m-n \cdot m - 5n \cdot x \cdot x + n}{4m}$

+ $\frac{m-n \cdot 3n \cdot m - 3n \cdot x}{4m}$. Si donc on sub-

stituë dans cette formule pour m , 5, & pour n ,
 3, elle deviendra $\frac{x \cdot x + 3 \cdot x + 6 \cdot x + 9}{20}$

$$\times \frac{2. x. x + 3. x + 6}{10} - \frac{2. 10. x. x + 3}{20} - \frac{2. 9. 4. x}{20}$$

qui est l'intégrale cherchée.

Pour savoir s'il ne manque rien à cette intégrale, il faut supposer que $x + 3$, $x + 6$, $x + 9$, représente le premier terme de la suite; auquel cas l'intégrale trouvée doit être nulle. Or lorsque $x + 3 = 2$, l'on a $x = -1$, mettant -1 pour x dans

$$\text{l'intégrale, elle deviendra } \frac{1. 2. 5. 8.}{20}$$

$$+ \frac{2. 1. 2. 5}{10} + \frac{2. 10. 1. 2}{20} + \frac{2. 9. 4. 1}{20} = \frac{72}{20}$$

$= \frac{18}{5}$, ce qui marque que cette quantité est de trop. On aura donc pour l'intégrale exacte.

$$\frac{x. x + 3. x + 6. x + 9}{20} - \frac{2. x. x + 3. x + 6}{10}$$

$$- \frac{2. 10. x. x + 3}{20} - \frac{2. 9. 4. x}{20} - \frac{18}{5}$$

$$\text{qui se réduit à } \frac{x. x + 3. x + 6. x + 9}{20}$$

$$\frac{x. x + 3x + 6}{5} - \frac{x. x + 3}{5} - \frac{18x}{5} - \frac{18}{5}$$

Si l'on veut la somme des trois premiers

termes, il faut examiner ce que vaut $x + 3$, dans le quatrième terme on trouve 17, donc $x = 14$, en substituant 14 pour x , il vient

$$\frac{14. 17. 20. 23}{20} - \frac{14. 17. 20}{5} - 14. 17$$

$$- \frac{18. 14}{5} - \frac{18}{5} = 4230.$$

Si l'on demande les cent premiers termes, il viendra pour cette somme

$$\frac{499. 502. 505. 508}{20} - \frac{499. 502. 505}{5} - 499.$$

$$502 - \frac{18.499}{5} - \frac{18}{5} = 12,981,051,346,$$

244.

COROLLAIRE.

Si la suite proposée avoit été celle des cubes des nombres naturels pris à la distance m , on auroit eu dans ce cas $n=0$. & l'intégrale seroit $\frac{x^4}{4m} - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}mxx$; à quoi il faut ajoûter $\frac{1}{2} - \frac{1}{4m} - \frac{1}{4m}$, parce que quand $x=1$, l'intégrale doit être nulle : or la supposition de $x=1$ donne pour l'intégrale $\frac{1}{4m} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}m$, qui doit par conséquent être ajoûté avec des signes contraires; on aura donc pour l'intégrale exacte $\frac{x^4}{4m} - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}mxx + \frac{1}{2} - \frac{1}{4m} - \frac{1}{4m}$.

Si l'on demande la somme des cubes pris de trois en trois, qui sont 1. 64. 343. 1000, &c. auquel cas $m=3$, ce qui donne $\frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}xx - \frac{1}{3}$ pour la somme de tant de termes que l'on voudra de cette suite. Si l'on veut la somme des quatre premiers, on aura 13 pour le cinquième terme. Donc $x=13$, cette valeur étant substituée, il vient $\frac{28661}{12} - \frac{2197}{2} + \frac{3}{4} \times 169 - \frac{1}{3} = 1408$.

Si

Si l'on demande les cubes des nombres naturels pris de suite, on aura alors $m=1$, & l'intégrale deviendra pour ce cas $\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}xx$, de sorte que si l'on veut les dix premiers cubes des nombres naturels, qui sont 1. 8. 27. 64. 125. 343. 512. 729. 1000. = 3025, le onzième terme sera $\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}xx$, donc $x=11$. Si l'on substitué 11 à la place de x , on aura $\frac{14641}{4} - \frac{1331}{2} + \frac{121}{2}$ 3025 pour la somme cherchée.

E X E M P L E III.

Soit la suite 1. 4. 7. 10 + 5. 8. 11. 14 + 9. 12. 15. 18 + &c. dans laquelle $n=3$ & $m=4$, l'expression generale d'un terme quelconque d'une suite composée de quatre facteurs sera $x+n. x+2n. x+3n. x+4n$, dont l'intégrale sera supposée être, $A. x. x+n. x+2n. x+3n. x+4n + B. x. x+n. x+2n. x+3n + C. x. x+n. x+2n + D. x. x+n + E. x$.

La difference de cette formule est, 5 Am.

$$\begin{array}{r}
 x+n. x+2n. x+3n. x+4n + 10 Am. \\
 m-n. x+n. x+2n. x+3n. + 10 Am. \\
 m-n. m+n. x+n. x+2n + 5 Am. \\
 m-n.
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{m-n}{\quad} \cdot \frac{m+n}{\quad} \cdot \frac{m+2n}{\quad} \cdot \frac{x+n}{\quad} + \frac{Am}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} \\
 & \frac{m+n}{\quad} \cdot \frac{m+2n}{\quad} \cdot \frac{m+3n}{\quad} + \frac{4Bm}{\quad} \cdot \frac{x+n}{\quad} \\
 & \frac{x+2n}{\quad} \cdot \frac{x+3n}{\quad} + \frac{6Bm}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} \cdot \frac{x+n}{\quad} \\
 & \frac{x+2n}{\quad} + \frac{4Bm}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} \cdot \frac{m+n}{\quad} \cdot \frac{x+n}{\quad} + \frac{Bm}{\quad} \\
 & \frac{m-n}{\quad} \cdot \frac{m+n}{\quad} \cdot \frac{m+2n}{\quad} + \frac{3Cm}{\quad} \cdot \frac{x+n}{\quad} \\
 & \frac{x+2n}{\quad} + \frac{3Cm}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} \cdot \frac{x+n}{\quad} + \frac{Cm}{\quad} \\
 & \frac{m-n}{\quad} \cdot \frac{m+n}{\quad} + \frac{2Dm}{\quad} \cdot \frac{x+n}{\quad} + \frac{Dm}{\quad} \\
 & \frac{m-n}{\quad} + \frac{Em}{\quad}, \text{ qui doit \u00eatre \u00e9gale \u00e0 } \frac{x+n}{\quad}
 \end{aligned}$$

$$x+2n, x+3n, x+4n.$$

Si donc on compare les termes homolo-

$$\begin{aligned}
 & \text{velles Equations; } 5 \frac{Am}{\quad} = 1. \quad 10 \frac{Am}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} \\
 & + \frac{4Bm}{\quad} = 0. \quad 10 \frac{Am}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} \cdot \frac{m+n}{\quad} + \\
 & + \frac{6Bm}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} + \frac{3Cm}{\quad} = 0. \quad 5 \frac{Am}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} \\
 & \frac{m+n}{\quad} \cdot \frac{m+2n}{\quad} + \frac{4Bm}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} \cdot \frac{m+n}{\quad} \\
 & + \frac{3Cm}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} + \frac{2Dm}{\quad} = 0. \quad \frac{Am}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} \\
 & \frac{m+n}{\quad} \cdot \frac{m+2n}{\quad} \cdot \frac{m+3n}{\quad} + \frac{Bm}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} \\
 & \frac{m+n}{\quad} \cdot \frac{m+2n}{\quad} + \frac{Cm}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} \cdot \frac{m+n}{\quad} \\
 & + \frac{Dm}{\quad} \cdot \frac{m-n}{\quad} + \frac{Em}{\quad} = 0.
 \end{aligned}$$

D'o\u00f9

D'où l'on tire, $A = \frac{1}{5m} \cdot B = - \times \frac{m-n}{2m}$.

$$C = - \times \frac{2m-n}{3m} \times \frac{m+n}{m} + \frac{m-n}{m} \cdot D = - \times$$

$$\frac{m-n}{2m} \cdot \frac{m+n}{m} + \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} + \times$$

$$\frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} - 3 \times \frac{m-n}{2m} \cdot E = - \times$$

$$\frac{m-n}{5m} \cdot \frac{m+n}{m} + \frac{m-n}{2m} \cdot \frac{m+n}{m} +$$

$$+ 2 \times \frac{m-n}{3m} \cdot \frac{m+n}{m} - \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} +$$

$$+ \frac{m-n}{2m} \cdot \frac{m+n}{m} - \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} -$$

$$- \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} + \frac{m-n}{2m} \cdot \frac{m+n}{m}, \text{ qui se ré-}$$

duit à $A = \frac{1}{5m} \cdot B = - \times \frac{m-n}{2m} \cdot C = -$

$$\frac{2m-n}{3m} \cdot \frac{m+n}{m} + \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} + \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} + \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m}$$

$$= \frac{m-n}{3m} \cdot \frac{m+n}{m} = \frac{m-n}{m} \times \frac{m-n}{3m}$$

$$D = \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} \times \frac{m-n}{2m} \cdot \frac{m+n}{m} \times$$

$$\times \frac{m-n}{2m} \cdot \frac{m+n}{m} \cdot E = \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} + \frac{m-n}{m} \cdot \frac{m+n}{m} \times$$

MEM. 1723. C $\times m-n$

50 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

$$\times \frac{m-2n \times 4}{5m} + \frac{m-n, m+n \times -7m+n}{3m} +$$

$$+ \frac{m-n, 3 \cdot m-n}{2m}.$$

Si maintenant on substitue dans ces valeurs de A, B, C, D & E , pour m & n , leurs valeurs 3 & 2, elles se réduiront à $A = \frac{1}{20}, B = -\frac{1}{8}, C = -\frac{11}{12}, D = -\frac{45}{8}, E = -\frac{593}{24}.$

Si donc on substitue ces valeurs dans l'intégrale supposée, on aura $\frac{1}{20} \times x. x + 3.$

$$x + 6. x + 9. x + 12 - \frac{1}{8} \times x. x + 3.$$

$$x + 6. x + 9 - \frac{11}{12} \cdot x. x + 3. x + 6 -$$

$$\frac{45}{8} \times x. x + 3 - \frac{593}{24} x + q.$$

Pour déterminer la valeur de q , on supposera $x + 3 = 1$, donc $x = -2$; cette valeur d' x doit donc rendre l'intégrale nulle, c'est-à-dire que $\frac{1}{20} \times -2. 1. 4. 7. 10 - \frac{1}{8} - 2. 1. 4. 7 - \frac{11}{12} \cdot -2. 1. 4 - \frac{45}{8} \cdot -2. 1 - \frac{593}{24} - 2 + q = 0$; d'où il suit $-28 + 7 + \frac{22}{3} + \frac{45}{4} + \frac{593}{12} = -q$, qui donne $q = -47$. L'intégrale demandée

est donc $\frac{1}{20} x. x + 3. x + 6. x + 9. x + 12.$

$$-\frac{1}{8}x. x+3. x+6. x+9 - \frac{11}{12}x.$$

$$x+3. x+6 - \frac{45}{8}x. x+3 - \frac{593}{24}x -$$

— 47.

Si l'on veut avoir les deux premiers termes, on aura dans ce cas $x+3=9$; donc $x=6$, & la somme cherchée sera $\frac{11}{20} \times 6. 9.$

$$12. 15. 18 - \frac{1}{8}. 6. 9. 12. 15 - \frac{11}{12}. 6. 9. 12$$

$$- \frac{45}{8}. 6. 9 - \frac{593}{24}. 6 - 47 = 6440.$$

EXEMPLE IV.

Si la suite qu'on se propose de sommer, étoit composée de plusieurs suites multipliées les unes par les autres, il faudroit la réduire à des suites uniformes, avant d'en trouver la somme par la methode generale.

Soit la suite 1. 3 + 2. 5 + 3. 7 + 4. 9 + 5. 11 + 6. 13 + &c. dont on demande la somme.

Cette suite est le produit des deux suites 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + &c. Et 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + &c. en supposant que chaque terme de la première est multiplié par le correspondant de la seconde. Ces deux suites n'ayant pas la même différence, il est évident que dans la suite composée il se trouvera deux différences. Si l'on veut qu'il n'y ait que la même différence, la

§2 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
 suite composée se réduira en deux autres, de
 cette maniere;

$$\begin{array}{l} 1.3+2.4+3.5+4.6+5.7+\&c. \} = 1.3+2.5+3.7+\&c. \\ \text{Et } 1.0+2.1+3.2+4.3+5.4+\&c. \} 7+4.9+\&c. \end{array}$$

La somme de la suite proposée sera donc
 égale aux deux autres suites, dont la pre-

mière a pour formule $x+2 \times x+4$, & la

seconde $x-1 \times x-2$, l'integrale de la

première est $\frac{x \cdot x+2 \cdot x+4}{3} + \frac{x \cdot x+2}{2} +$

$\frac{9}{6}x + q$, & celle de la seconde est

$\frac{x \cdot x-1 \cdot x-2}{3} - \frac{x \cdot x-1}{2} + 2x + p$. Il

ne reste plus qu'à trouver les valeurs de q & p ,
 pour avoir l'integrale exacte de la suite pro-
 posée. Or pour avoir ces valeurs, il faut

supposer que $x-2 \times x+4$ représente

1×3 , & que $x-1 \times x-2$ représente 1×0 ,
 auquel cas les deux suites doivent être nul-
 les. Donc alors $x=-1$ pour la première
 suite, & $x=2$ pour la seconde. Si donc

on substitue dans les integrales pour x ces

valeurs, on aura $\frac{-1 \cdot 1 \cdot 3}{3} + \frac{-1 \cdot 1}{2} + \frac{9 \cdot -1}{6}$

$+ q = 0$, & $\frac{2 \cdot 1 \cdot 0}{3} - \frac{2 \cdot 1}{2} + 2 \cdot 2 +$

$p = 0$, de la première Equation, on tire

$q=3$, & de la seconde $p=-2$. L'integra-

le exacte est donc $\frac{x \cdot x+2 \cdot x+4}{3} + \frac{x \cdot x+2}{2} +$

$\frac{1}{2} x + 3$ pour la première suite, & $\frac{x \cdot x - 1 \cdot x - 2}{3}$

— $x \cdot x - 1 + 2x - 2$ pour la seconde, dont la somme vaut la suite proposée.

Si l'on veut avoir les deux premiers termes de chaque suite, dont la somme vaut les deux premiers termes de la suite proposée,

il faut supposer que les formules $x + 2$

$\times x + 4$ & $x - 1 \times x - 2$ de chacune de ces suites représentent chacune le troisième terme de sa suite, & alors on aura $x + 2 = 3$ pour la première suite, & $x - 1 = 3$ pour la seconde, ce qui donne $x = 1$ & $x = 4$. Si donc on substitue dans les intégrales trouvées pour x ces valeurs, on aura $\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2}$

$+ \frac{1}{2} + 3 = 11$ pour la première, & $\frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3}$

$+ \frac{4 \cdot 3}{1} + 8 - 2 = 2$ pour la seconde, les deux ensemble valent donc 13; ce qui doit être, puisque $1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 = 13$.

MEMOIRE
SUR
LES YEUX GELES;

Dans lequel on détermine la grandeur des
Chambres qui renferment l'humeur
aqueuse.

Par M. PETIT, Medecin.

* M. BRISSEAU, Medecin des Hôpitaux
du Roi, & Professeur dans l'Univer-
sité à Douay, est, je croi, le premier qui a
donné le nom de *Chambre* à l'espace com-
pris entre le Crystallin & la Cornée qui con-
tient l'humeur aqueuse; & comme cet espa-
ce est divisé en deux parties par l'Uvée, il a
donné le nom de *première Chambre* à la par-
tie antérieure, que nous appellerons, avec
le savant Heister †, *Chambre antérieure*, com-
prise entre l'Iris & la Cornée, & il a nommé
seconde Chambre, l'espace compris entre le
Crystallin & l'Uvée, & que nous appellerons
Chambre postérieure.

Quoi-que M. Brisseau, M. Antoine & M.
Heister ayent suffisamment prouvé que la
Cataracte n'a d'autres causes que l'endur-
cissement joint à l'opacité du Crystallin, il se
trouve

* 30 Avril 1723.

† Compend. anatomic. p. 210.

trouve néanmoins encore des personnes qui tiennent pour la membrane. Ils ont eu beau démontrer qu'il est tout-à-fait impossible d'abattre cette prétendue membrane, sans traverser le Crystallin a, en perçant l'Oeil à deux ou trois lignes de la Cornée, comme on le fait pour l'ordinaire; leur démonstration s'est trouvée infructueuse à l'égard de leurs adversaires, qui ont crû éluder la difficulté, en supposant que la Chambre postérieure de l'humeur aqueuse est plus grande que la Chambre antérieure, trompés peut-être par les figures de *Vesale*, de *Brigs*, & d'autres Auteurs.

J'avois bien remarqué dans les différentes dissections des Yeux d'Hommes, de Chiens, de Bœufs, & d'autres animaux, qu'il y avoit un espace rempli d'humeur aqueuse entre le Crystallin & l'Uvée; mais cet espace est si petit dans les Yeux gelés, qu'un de nos plus habiles Anatomistes s'y est (en quelque manière) laissé tromper b; je dis *en quelque manière*, ce que j'expliquerai plus amplement dans un autre Memoire. Si cette opinion se fût trouvée véritable, c'en étoit fait du système de la Cataracte par la membrane, ses sectateurs n'avoient plus de faux-fuyants. Il me paroît pourtant qu'ils ne peuvent tirer aucun avantage d'un si petit espace, & s'il n'est pas plus grand dans l'état naturel que celui que l'on reconnoît par l'épaisseur de la glace

a *Fabricius Abaquapendente* l'a crû de même il y a plus de 100. ans. Voyez sa *Chirurgie* imprimée en 1618 p. 58.

Gallien a crû que le Crystallin touché à l'Uvée: De *T'isu partium*, cap. 4. & 6. De *Oculis*, cap. 4.

b *V. Mem. de l'Acad.* 1721. p. 415. & 416.

glace dans les Yeux gelés, il ne s'en trouve pas assés pour loger & faire agir l'Eguille dont on se sert pour l'operation de la Cataracte, sans courir le risque de blesser l'Uvée ou le Crystallin, quand on perçoit l'Oeil à une ligne ou une ligne & demie de la Cornée.

La facilité que l'on a trouvée de faire geler les humeurs des Yeux^a, a fourni l'occasion de reconnoître la grandeur de l'espace occupé par l'humeur aqueuse; *M^{rs}. Heister & Morgagni* ont fait voir par ce moyen sur les Yeux d'Hommes & sur les Yeux de Cochon, que la Chambre posterieure de l'humeur aqueuse est de beaucoup plus petite que la Chambre anterieure. C'est ce que j'ai aussi démontré, mais avec beaucoup plus de précision, à la Compagnie, le 16. Janvier de cette année, non seulement sur les Yeux d'Hommes, mais encore sur les Yeux de Chiens, de Moutons, de l'œufs, de Chevaux. J'avois déjà fourni sur cette matiere, le 8 Mars 1721, un petit Memoire, en attendant que je pusse en donner un plus ample & plus circonstancié, tel que je le donne aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le détail de mes observations, il faut expliquer ce que j'entends par grand & petit diametre de l'Oeil & par son axe.

J'appelle grand diametre de l'Oeil, une ligne droite horisontale qui traverse l'Oeil en passant par son centre, qui est parallele au grand diametre de la Cornée dans le Bœuf, le Mouton. La ligne *CD* de la première Figure est le grand diametre.

Le

^a On avoit déjà trouvé cette facilité en 1678.

Le petit diamètre est une ligne droite, verticale, qui traverse l'Oeil en passant par son centre, & qui est perpendiculaire au grand diamètre. La ligne *AB* de la première & de la seconde Figure est le petit diamètre; je l'ai nommé ainsi, parce qu'il est le plus souvent plus court que le grand dans le Mouton, le Bœuf, le Cheval, mais on les trouve quelquefois égaux. Ils sont toujours l'un & l'autre plus longs que l'axe, parce que dans ces animaux l'Oeil est aplati dans la partie postérieure.

L'axe de l'Oeil est une ligne droite qui le traverse, en passant par le centre de la Cornée & le centre du Crystallin. La ligne *AB* dans la seconde Figure, & la ligne *CD* dans la 3^{me}, la 4^{me}, la 5^{me}, la 6^{me}, la 7^{me} Figure est l'axe qui dans l'Homme, dans le Singe, dans le Chien, le Loup, le Chat est pour l'ordinaire égale aux diamètres, & quelquefois plus long dans l'Homme & dans le Singe, mais qui dans le Chien, le Loup & le Chat se trouve quelquefois plus court d'un quart de ligne.

Tous les Yeux que j'ai fait geler ont été auparavant dépouillés de leurs muscles, de leur graisse, & de toutes les parties membraneuses qui enveloppent la Sclerotique, & dans cet état ils ont été pesés & mesurés avant d'être exposés à la gelée. Les uns ont été posés sur le Nerf optique, la Cornée en haut, & les autres suspendus avec un fil par le Nerf optique, la Cornée enbas.

Pour rendre ces expériences plus exactes, il faut qu'il fasse un froid considérable, afin que les yeux puissent se geler de manière que

18 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

les humeurs deviennent une glace assés dure. Les Yeux que j'ai exposé aux premières gelées du mois de Février, mon Thermometre étant au 18^{me} degré, n'ont gelé qu'imparfaitement, l'humeur aqueuse étoit gelée dans les deux Chambres, mais la glace ne faisoit pas assés de corps pour en mesurer l'épaisseur, n'étant gelée que par parcelles entremêlées d'humidité. Dans quelques-uns le Crystallin étoit gelé dans sa circonference, dans d'autres il n'étoit point du tout gelé, il paroissoit même plus mol qu'il n'est dans son état naturel, & dans quelques Yeux d'Hommes, de Moutons, de Bœufs l'humeur vitrée étoit gelée par plans de glace qui étoient dans les uns paralleles au diametre de l'Oeil, & dans d'autres aux differents plans de leur axe, dans les uns situés horisontalement, & dans d'autres situés verticalement; j'en ai vû aussi qui ressembloient à des cristaux pyramidaux à quatre ou cinq faces. L'eau se gele quelquefois dans des fioles de ces différentes manieres, lorsque la gelée n'est pas forte,

Les Yeux n'ont commencé à se geler assés bien que lorsque mon Thermometre s'est trouvé au 15^{me} ou au 16^{me} degré, & pour lors il m'a été facile de bien démontrer la glace de la Chambre postérieure, mais ils se sont gelés bien plus fort, lorsque mon Thermometre s'est baissé sur le 13^{me} degré, qui est le plus bas où il se soit trouvé en 1721, & c'est dans ce temps-là que j'ai fait la plus grande partie des observations que je rapporte dans ce Memoire.

Ce n'est pas sans dessein que je parle de ces differents degrés de gelés: c'est de-là que

que dépend le plus ou le moins de justesse & de précision de ces observations.

Les Yeux d'Homme qui ont été bien gelés, étant coupés suivant la longueur de leur axe en deux parties, la glace de l'humeur aqueuse s'est trouvée épaisse dans la Chambre antérieure, près du trou de l'Uvée où elle a le plus d'épaisseur, à cause de la convexité de la Cornée, d'une demi ligne dans les uns, de deux tiers de ligne dans les autres, & dans quelques uns elle avoit une ligne entière. Elle diminue peu-à-peu d'épaisseur à mesure qu'elle s'éloigne du centre de la Cornée, & qu'elle s'approche de la Sclerotique, où elle s'engage sous le biseau de la Cornée, & y finit en vive arrête.

M. Brisseau est encore le premier, si je ne me trompe, qui a remarqué que la Sclerotique & la Cornée sont unies ensemble par une surface inclinée que l'on appelle *biseau* ou *Chamfrain*. Le biseau de la Cornée est dessous, celui de la Sclerotique est appliqué dessus & à la partie externe du biseau de la Cornée, c'est à l'extrémité du biseau de la Cornée que l'Uvée est attachée; c'est-là aussi où finit la glace de la Chambre antérieure.

La glace de la Chambre postérieure étoit épaisse d'un demi-quart de ligne dans les uns, dans les autres d'un demi-tiers, jusqu'à un quart de ligne, & cette épaisseur s'augmentoît peu à peu jusqu'à la circonférence du Crystallin où elle se trouvoit épaisse d'un demi-tiers de ligne dans les uns, d'un quart de ligne dans les autres, jusqu'à trois demi-quarts.

La glace de cette Chambre postérieure se trouve

60 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

trouve assés souvent continuë avec celle de l'humeur vitrée, principalement si l'Oeil a été exposé à une forte gelée, car lorsque l'humeur vitrée vient à se geler, elle se rarefie d'autant plus que la gelée est forte, comme je le prouverai dans la suite de ce Memoire; elle s'avance au de-là, & vers les côtés du Crystallin, pousse les *Processus* ciliaires du côté de l'Uvée, en les détachant du Crystallin, & pour lors la glace qui se forme entre l'Uvée & les *Processus* ciliaires se trouve très mince, & quelquefois il ne s'en trouve point du tout: ce qui arrive de même dans le Chien, le Mouton, le Bœuf & le Cheval; il est facile de distinguer la glace de l'humeur aqueuse, d'avec celle de la vitrée, il y a dans celle-ci quantité de petites fibres blanches.

La glace de la Chambre anterieure dans les Yeux du Chien-dogue, près du trou de l'Uvée, étoit épaisse d'une ligne dans les uns, d'une ligne & demie dans les autres, & diminuant peu-à-peu d'épaisseur, elle alloit finir, comme dans l'Homme, en vive arrête à la circonference de la Cornée.

Elle étoit épaisse dans la Chambre posterieure d'un quart de ligne, jusqu'à un tiers près du trou de l'Uvée, mais elle étoit d'une demi-ligne à la circonference du Crystallin.

J'ai trouvé dans les Yeux d'un Loup, qui a l'Oeil de la même forme que celui du Chien-dogue, la glace de la Chambre anterieure épaisse de cinq quarts de ligne, & celle de la Chambre posterieure d'une demi-ligne près du trou de l'Uvée.

Dans

Dans les Yeux de Mouton, la glace de la Chambre anterieure s'est trouvée épaisse, près du trou de l'Uvée, de cinq quarts de ligne dans les uns; dans d'autres elle étoit de sept quarts, & j'en ai trouvé un où elle étoit épaisse de deux lignes, & diminuant peu-à-peu, elle alloit finir à la circonference de la Cornée, comme dans l'Homme, & tous les animaux à quatre pieds, la Cornée est elliptique à la partie externe dans ces animaux, mais elle est ronde à sa partie interne.

La glace de la Chambre postérieure étoit épaisse dans les uns, d'un quart de ligne, & d'un tiers dans les autres près du trou de l'Uvée, mais elle avoit deux tiers de ligne à la circonference du Crystallin.

Dans les Yeux de Bœuf, j'ai trouvé la glace de la Chambre anterieure épaisse dans les uns de cinq quarts de ligne, dans les autres de sept quarts: j'en ai démontré à la Compagnie qui étoit épaisse de deux lignes & demie dans son milieu, & diminueoit peu-à-peu jusqu'à la circonference de la Cornée où elle finissoit.

Dans la Chambre postérieure la glace étoit épaisse d'un tiers de ligne dans les uns, & d'une demi-ligne dans les autres, près du trou de l'Uvée; elle se trouvoit épaisse de trois quarts de ligne à la circonference du Crystallin.

Dans les Yeux de Chevaux la glace étoit épaisse dans la Chambre anterieure, près du trou de l'Uvée, de trois lignes dans les uns, & dans d'autres de trois lignes & demie, & diminuant peu-à-peu, comme dans les Yeux précédents, s'alloit engager sous le biseau de la Cornée.

La glace de la Chambre postérieure étoit épaisse d'un tiers de ligne, jusqu'à une demi-ligne près du trou de l'Uvée, mais de deux tiers de ligne à la circonférence de la Cornée; ainsi la Chambre postérieure dans le Cheval est plus petite à proportion que dans les Yeux précédents.

Le CrySTALLIN dans tous les Yeux bien gelés étoit dur & blanc. Lorsqu'on le dégagoit de son chaton, étant coupé par la moitié, on voyoit la capsule qui l'envelopoit, qui restoit presque dans sa situation naturelle, & qui ne s'éloignoit que peu de la glace de l'humeur aqueuse. Elle étoit transparente & ferme, & ressembloit à de la Corne très-fine & très-transparente, à laquelle *Vesale* ^a la compare. La partie postérieure de cette membrane crySTALLINE étoit plus fine & plus molle; on ne voyoit point la partie antérieure si tendue ni si ferme dans les Yeux qui n'étoient pas bien gelés, elle étoit molle & ridée après avoir retiré le CrySTALLIN, & pour lors elle ressembloit mieux à une pellicule d'Oignon, à laquelle *Vesale* la compare dans le même chapitre, de même que *Galien* ^b. Ce qui fait assés connoître que quelque fine que soit cette membrane, elle ne laisse pas de se geler, en conservant sa transparence.

On comprendra assés facilement qu'elle se trouve d'autant plus épaisse, qu'elle enveloppe de plus gros CrySTALLINS, elle est pourtant quelquefois plus épaisse dans des Yeux que dans

^a Lib. 7. cap. 14.

^b De Oculis, cap. 3.

dans d'autres de même espece.

Je remarquerai encore une chose particulière, & que l'on ne peut bien voir que dans des Yeux gelés, c'est que l'Uvée dans l'Homme fait une surface plane, ainsi qu'elle est représentée dans la 3^{me} Figure a. *Vesale* b lui donne la même surface. Mais dans les animaux à quatre pieds cette surface est convexe à sa partie antérieure, & cette convexité est d'autant plus grande, que les Yeux sont plus gros, comme on le voit dans la 4^{me}, 5^{me}, 6^{me} & 7^{me} Figure.

Après ce que je viens de dire de la glace de la Chambre postérieure, il semble qu'il n'y a qu'à couper des Yeux bien gelés pour la démontrer: mais j'ai fait voir à la Compagnie qu'il faut apporter beaucoup de soin & d'exactitude pour la découvrir, même dans les Yeux les mieux gelés & les mieux remplis d'humeur aqueuse. L'enduit noir de la partie postérieure de l'Uvée & des Processus ciliaires se communique à la glace, lui cause une ombre qui l'empêche de paroître. Mais une des choses qui contribuent encore à la cacher, c'est que la glace est un corps dur qui ne peut être coupé net par un scalpel, quelque tranchant qu'il puisse avoir, & plus il est tranchant, plus facilement il est émoussé par la dureté de la glace, & pour lors il arrive deux choses. La première est que la glace se brise par petites parcelles: la seconde est que le scalpel émoussé entraîne avec lui

a *Mem. de l'Academie* 1721. p. 417, où *M. Winslow* n'est pas de ce sentiment.

b *Lib. 7, cap. 14,*

lui des parties noires de l'Uvée & des Processus ciliaires qu'il mêle & qu'il confond avec les parcelles de la glace, & fait, pour ainsi dire, une espece de voile qui couvre la glace de la Chambre postérieure; l'Uvée & les Processus ciliaires paroissent confondus avec elle, l'on ne voit qu'un corps brun assés épais, quoique l'Uvée ait tout au plus un douzième de ligne d'épaisseur dans l'Homme avec son enduit noir, mais ôtés le masque qui la cache, on la découvre facilement, il n'y a pour cela qu'à prendre un Oeil bien gelé, le couper par son axe en deux parties, & avec la pointe d'un instrument enlever la glace de la Chambre antérieure, puis détacher l'Uvée le plus délicatement que l'on peut de la glace de la Chambre postérieure, après quoi cette glace qui paroissoit un corps noir se manifeste, & l'on peut en mesurer l'épaisseur, quoi-qu'elle ait encore un peu de noirceur que l'Uvée lui a laissé.

L'on peut encore s'en assurer d'une autre maniere, car sans couper l'Oeil par son axe, il n'y a qu'à enlever la Cornée toute entiere, on ôte la glace de la Chambre antérieure, puis on emporte l'Uvée, & l'on trouve la glace de la Chambre postérieure.

La noirceur de l'Uvée n'est pas la seule cause qui empêche qu'on ne trouve avec facilité la glace de la Chambre postérieure, principalement dans l'Homme, il se rencontre encore des difficultés par rapport à la quantité de l'humeur aqueuse qui se trouve plus ou moins grande, non seulement à proportion de la grandeur des Yeux, mais encore dans les Yeux de même grandeur.

On

On trouve pour l'ordinaire dans les Yeux de l'Homme la pesanteur de 3 grains & demi, jusqu'à 4 grains & demi d'humeur aqueuse : s'il n'y en a que trois grains & demi, cela doit diminuer la quantité de la glace de près du quart. L'on trouve encore bien moins de glace dans les Yeux qui ont été gardés quelques jours après la mort. Si l'on ne prend les Yeux d'Homme, de Chien, & d'autres animaux tout nouvellement morts, on les trouve toujours flétris, après en avoir ôté la graisse, les muscles, & tout ce qui enveloppe le globe de l'Oeil. Si l'on pose ces Yeux du côté du Nerve optique, la Cornée s'enfonce vers le Crystallin, plus ou moins, selon le temps que l'animal est mort, & que la dissipation qui s'est faite des humeurs, est plus ou moins grande. Si au contraire on suspend ces Yeux flétris par le Nerve optique, les humeurs s'appesantissent du côté de la Cornée, la rendent convexe, & la partie postérieure de la Sclerotique se trouve gaudronnée & froncée. Mais lorsque ces Yeux sont gelés, ils ne paroissent plus flétris, ils sont au contraire fort tendus, l'on ne trouve plus d'affaissement à la Cornée des Yeux posés du côté du Nerve optique, & la Sclerotique des Yeux suspendus par le Nerve optique a perdu son froncis. Malgré ce gonflement, on ne doit pas s'attendre de trouver dans la Chambre postérieure de ces Yeux, la même épaisseur de glace que l'on trouve dans les Yeux qui n'ont point été flétris : car, comme les Yeux ne se flétrissent que par l'évaporation des humeurs qu'ils contiennent, que l'humeur aqueuse est la première à se dissiper,

diffiper, comme l'experience le confirme, & que plus la gelée est forte, plus il se dissipe d'humeur aqueuse, comme nous le verrons ci-après, lorsque l'humeur vitrée vient à se geler, elle se rarefie avec d'autant plus de facilité vers la partie antérieure qu'elle y trouve moins de résistance, elle pousse le CrySTALLIN du côté de l'Uvée, & diminue la Chambre postérieure, de manière que j'ai eu bien de la peine à y trouver de la glace, & quelquefois je n'en ai point trouvé du tout. On ne doit donc pas s'étonner si quelques personnes n'ont point trouvé de Chambre postérieure.

Ce ne sont pas seulement les Yeux flétris qui se gonflent & se dilatent en gelant, cela arrive aussi à ceux qui n'ont pas eu le temps de se flétrir; car comme les membranes prêtent & peuvent s'étendre, les Yeux grossissent à proportion de la rarefaction de la glace. Je me suis convaincu de cette vérité par un grand nombre d'expériences: il suffira d'en rapporter trois, faites sur des Yeux de Bœuf.

Dans la première experience, l'Oeil que j'ai pris étoit fort peu flétri; il pesoit une once 36 grains, il avoit 18 lignes trois quarts de grand diametre, 18 lignes & demie de petit diametre, & 16 lignes & un quart d'axe. Je l'ai posé sur une assiette de fayence du côté du Nerf optique, à huit heures du matin, mon Thermomettre étant au 14^{me} degré. Je l'ai laissé sur une fenêtre jusqu'au lendemain huit heures du matin. Lorsque je l'ai retiré, le Thermomettre étoit resté au 14^{me} degré; il étoit bien gelé, dur & fort tendu,

la

la Sclerotique noire, la Cornée opaque & blanchâtre: il pesoit 7 dragmes 65 grains, ainsi il avoit diminué de 43 grains; il avoit 19 lignes de grand diametre, 18 lignes trois quarts de petit diametre, & 17 lignes d'axe. Il étoit donc augmenté d'un quart de ligne dans son grand diametre, autant dans son petit diametre, & de trois quarts de ligne dans son axe. J'ai coupé cet Oeil en deux parties par son axe. J'ai trouvé les humeurs fort bien gelées, la glace de la Chambre anterieure étoit épaisse de deux lignes, & la glace de la Chambre postérieure étoit épaisse d'une demi-ligne pres du trou de l'Uvée, le CrySTALLIN opaque, blanc & fort dur, ayant huit lignes de diametre, & six lignes d'axe ou d'épaisseur.

Dans la seconde experience, l'Oeil de Bœuf pesoit 7 dragmes 67 grains; il n'étoit point flétri, il avoit 18 lignes de grand & de petit diametre, 15 lignes & deux tiers d'axe. Je l'ai suspendu avec un fil par le Nerf optique, mon Thermomettre étant au 14^{me} degré & demi à neuf heures & demie du matin. Je l'ai retiré le lendemain à neuf heures du matin, il étoit bien gelé, dur comme une pierre, la Sclerotique toute noire, la Cornée opaque & blanchâtre: le froid avoit augmenté d'un demi-degré pendant la nuit. mon Thermomettre étoit au 14^{me} degré.

Cet Oeil gelé pesoit 7 dragmes 20 grains, il étoit donc diminué de 47 grains. Il avoit 18 lignes & demie de grand & de petit diametre, & 16 lignes & demie d'axe: il étoit augmenté de demi-ligne dans chacun de
ses

68 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
ses diametres, & de près d'une ligne dans
son axe.

La glace de la Chambre anterieure étoit épais-
se de sept quarts de ligne, & la glace de la Cham-
bre posterieure seulement d'un tiers de ligne
près du trou de l'Uvée; le Crystallin
avoit sept lignes & demie de diametre,
& cinq lignes deux tiers d'axe ou d'é-
paisseur.

Dans la troisième experience, l'Oeil de
Bœuf n'étoit point flêtri, il pesoit 7 dragmes
24 grains, il avoit 17 lignes & un quart de grand
& petit diametre, 15 lignes d'axe. Je l'ai
exposé à la gelée, suspendu avec un fil par
le Nerf optique, à onze heures du matin,
mon Thermometre au 13^{me} degré. Je l'ai
retiré le lendemain à sept heures du matin,
la Sclerotique étoit toute noire, la Cornée
blanche opaque, tout l'Oeil arrondi, dur
comme une pierre: il pesoit 6 dragmes 40
grains. Il étoit donc diminué de 56 grains
en vingt heures. Il avoit 18 lignes de grand
& petit diametre, & 16 lignes trois quarts
d'axe: il étoit donc augmenté de trois quarts
de ligne dans chacun de ses diametres, &
d'une ligne trois quarts dans son axe.

La glace de la Chambre anterieure avoit
deux lignes d'épaisseur, & avoit été poussée
au de-là du biseau de la Cornée en quel-
ques endroits, où l'Uvée s'est trouvée détachée
de la Cornée & de la Sclerotique.

La glace de la Chambre posterieure n'a-
voit qu'un quart de ligne près du trou de
l'Uvée.

Le Crystallin étoit blanc, dur, opaque, il
avoit des fosses & des cannelures irréguliè-
res

res qui étoient en plus grande quantité, & plus profondes à sa partie postérieure qu'à sa partie antérieure; marque certaine qu'il avoit été violemment comprimé. C'est ce qui arrive toujours dans les fortes gelées, & même dans les Yeux bien gelés avec la glace & le salpêtre.

Ce Crystallin avoit sept lignes trois quarts de diamètre, & cinq lignes un quart d'épaisseur: il pesoit 42 grains. Je l'ai laissé dégeler par lui-même dans mon Cabinet, où il s'est dégelé en trois quarts d'heure. Il est devenu plus mol qu'il n'est pour l'ordinaire, transparent, plein de petites bulles d'air renfermées sous la membrane cristalline; il n'a ni diminué ni augmenté de poids en dégelant.

Il y a plusieurs choses à remarquer dans les trois exemples que je viens de rapporter. La première est qu'ils ont tous trois diminué de poids, & ils ont d'autant plus diminué de poids, que la gelée a été plus forte, ce qui est conforme aux expériences de M. *Gauteron*, de la Société de Montpellier ^a, & de M. de *Mairan*, de cette Académie ^b: ce dernier en a donné d'excellentes raisons. La seconde, qu'ils ont augmenté de volume, & qu'ils ont d'autant plus augmenté de volume que la gelée a été plus forte. Le premier a moins augmenté que le second, & celui-ci moins que le troisième. Il semble néanmoins que le premier auroit dû augmenter plus que le second.

puis-

^a *Mem. de l'Acad. des Sc. 1709. p. 324.*

^b *Differt. sur la glace. p. 136.*

70 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
puisque mon Thermometre marquoit d'abord moins de froid au second Oeil qu'au premier; mais j'ai assés souvent observé, en exposant des Yeux & des liqueurs à la gelée, qu'ils ont mieux gelé, lorsque mon Thermometre étoit au 16 ou au 17^{me} degré, que d'autres Yeux & d'autres liqueurs que j'avois exposés au 14 ou au 15^{me} degré. J'ai recherché d'où pouvoit provenir une chose si particulière, & voici ce que j'ai remarqué.

Si mon Thermometre se baissoit du 17 au 16^{me} degré, le vent étant au Nord ou au Nord-est ou à l'Est, pour lors la gelée se trouvoit plus forte que lorsque mon Thermometre passoit du 14 au 15^{me} degré, le vent se changeant du Nord à l'Oüest ou au Sud-oüest ou au Sud, & c'est à peu-près ce qui est arrivé aux deux Yeux dont je viens de parler; car le premier a été exposé, lorsque le froid commençoit à diminuer, mon Thermometre avoit monté du 13 au 14^{me} degré, le vent étant au Nord-oüest. Le second au contraire a été exposé, lorsque le froid augmentoit, mon Thermometre étant descendu du 15 au 14^{me} degré & demi, & de-là au 14^{me}, le vent étant passé au Nord.

La troisième chose que nous avons à observer sur nos trois Yeux gelés, c'est que leur volume s'est plus augmenté par leur partie postérieure que dans tout le reste de leur circonférence, & que l'augmentation a été à proportion plus grande dans le troisième que dans le second, & dans le second que dans le premier, & je l'ai toujours

jours remarqué dans tous les Yeux de Bœufs, de Moutons & de Chevaux, que j'ai fait geler, ce que je n'ai point observé dans les Yeux d'Hommes & de Chiens, qui ont pour l'ordinaire l'axe aussi long que les diamètres. J'ai vu au contraire que lorsque l'axe s'est trouvé plus long que les diamètres, comme il arrive quelquefois dans l'Homme, ces Yeux grossissoient plus par leur côté que par leur partie postérieure, & que lorsque les Yeux d'Hommes se trouvoient quarrés ou aplatis par leur côté (ce qui est pour l'ordinaire produit par la compression des muscles droits) ils s'arrondissoient en gelant. Enfin tous les Yeux que j'ai fait geler ont affecté de prendre une figure plus arrondie.

Cet effet ne se remarque pas seulement dans les Yeux des animaux à quatre pieds que l'on fait geler, on le voit encore dans ceux que l'on met tremper dans l'eau, dans le vin, & dans d'autres liqueurs; à mesure qu'ils deviennent plus tendus, ils s'arrondissent par leur partie postérieure plus à proportion que par leur côté, car si les diamètres deviennent plus longs d'un quart de ligne, l'axe s'allonge d'une demi-ligne ou trois quarts de ligne.

J'en ai recherché la cause dans l'épaisseur & la force de la Sclerotique, j'ai trouvé qu'elle est plus épaisse dans sa partie postérieure que vers ses côtés, mais il n'est pas aisé de se persuader que cette épaisseur lui donne plus de facilité de s'étendre, vu que dans les Yeux d'Hommes elle est aussi plus épaisse à sa partie postérieure que vers les côtés,

côtés, & ces Yeux d'Hommes se gonflent par les côtés où elle est plus mince plutôt que par sa partie postérieure. Voilà ce qui rend ce phénomène difficile : car quoi que l'on puisse dire en général que les Yeux grossissent & se gonflent par les endroits où les membranes s'étendent le plus facilement, néanmoins il n'est pas facile de concilier ce qui arrive aux Yeux d'Hommes, & d'animaux à quatre pieds ; ainsi ce fait demande encore beaucoup d'observations & d'expériences pour pouvoir en donner une explication plausible, ce qui sera le sujet d'un autre Memoire que je donnerai, lorsque j'aurai fait toutes les observations & les expériences dont j'ai besoin. Je parlerai dans ce Memoire des Yeux gelés par la glace & la neige, mêlés avec différents sels & différentes liqueurs ; des différentes évaporations des humeurs des Yeux à différente température de l'air, & des Yeux trempés pendant quelque temps dans différentes liqueurs.

La quatrième chose que nous avons à observer, c'est que la glace de la Chambre postérieure est moins épaisse dans le troisième exemple que dans le second, & dans le second que dans le premier, ainsi la glace de la Chambre postérieure a été d'autant moins épaisse que la gelée a été plus forte. L'on fait que la rarefaction des liqueurs dans la gelée dépend de l'air qu'elles contiennent, qu'elles ont d'autant plus de force à se raréfier, que la quantité de ces liqueurs est plus grande, puisqu'il y a plus d'air. Cela étant, il faut que l'humeur aqueuse cède à
la

la force de l'humeur vitrée. Il y a dans l'Homme vingt fois autant d'humeur vitrée qu'e d'humeur aqueuse; dans le Bœuf il y en a dix fois, & neuf fois autant dans le Mouton. L'on verra dans mon Memoire des découvertes sur les Yeux, les proportions des humeurs bien déterminées dans toutes les especes d'animaux dont je parlerai.

Lorsque l'on fait geler un Oeil de Bœuf, je suppose que l'humeur vitrée se dilate avec seulement quatre fois autant de force que l'humeur aqueuse, elle pousse & fait avancer le CrySTALLIN en devant, la flexibilité des Processus ciliaires les fait avancer en devant encore plus que le CrySTALLIN; c'est pour cette raison qu'on les trouve presque toujours détachés du CrySTALLIN, l'humeur aqueuse est obligée de leur ceder la place, elle est chassée de la Chambre postérieure dans la Chambre antérieure avec d'autant plus de force & en plus grande quantité que la gelée est plus grande; elle est souvent contrainte de s'échapper jusques sous la Sclerotique, en détachant l'Uvée de la Cornée, & dans cette occasion le CrySTALLIN souffre d'étranges compressions, comme on le remarque dans le troisième exemple.

De-là on doit inferer qu'il est difficile de déterminer avec précision, par les Yeux gelés, la véritable grandeur de la Chambre postérieure, d'autant plus qu'il s'évapore, en gelant, une portion de l'humeur aqueuse. Néanmoins pour peu qu'on soit attentif à ce qui se passe dans un grand nombre d'Yeux gelés à differents degrés de froid, on peut, en quelque manière, la déterminer sans beau-

coup s'éloigner de la précision. C'est sur ce fondement que je crois pouvoir assurer que la Chambre postérieure, dans les Yeux de l'Homme & du Mouton, contient à peu près le tiers de toute l'humeur aqueuse. Dans le Chien il y en a le quart; il s'en trouve autant dans le Bœuf, mais dans le Cheval il n'y en a environ que la cinquième partie. Je rapporte pourtant ceci sans répondre de la précision, & seulement afin qu'on puisse voir en quelque manière à quoi l'on doit s'en tenir sur la grandeur respective de ces Chambres, qui peut varier comme toutes les autres parties du corps dans les animaux de même espèce, & cela est d'autant plus probable, que j'ai trouvé dans les Yeux des Cornées plus convexes les unes que les autres, quoi que la corde de l'arc qu'elles forment fût de la même longueur. Je ferai voir dans un autre Memoire la grandeur des Chambres de l'humeur aqueuse sans le secours de la gelée, & je démontrerai que le Crystallin est rarement éloigné de l'Uvée plus d'un quart de ligne.

La dernière chose que nous avons à observer, est que les Crystallins n'ont point augmenté de volume, l'air ne leur a pourtant point manqué. La première pensée qui m'est venue là-dessus, est que le Crystallin se trouve si fort comprimé entre l'humeur vitrée & l'humeur aqueuse, que l'air qu'il contient n'a pu se dilater avec facilité, d'autant plus qu'il est le dernier à ressentir la force de la gelée, & cette raison paroît suffire, & n'avoir pas besoin d'autre démonstration. J'ai pourtant voulu voir ce qui arrive aux
Cry-

CrySTALLINS gelés à part. J'ai trouvé qu'ils ont diminué de volume plutôt qu'augmenté, & l'on ne doit pas s'en étonner; car comme les liquides n'augmentent leur volume en gelant, qu'à proportion de la dilatation de l'air qu'ils contiennent, tant que les parties du liquide conservent leur mouvement, les particules d'air ne se dilatent point par le froid, ce qui est prouvé par les liquides qui ne se gèlent point. Quelque grand froid qu'il fasse, on ne les voit point augmenter de volume, ils diminuent au contraire d'autant plus que la gelée est plus forte, mais lorsque les parties d'un liquide viennent à perdre leur mouvement, les particules d'air s'unissent les unes avec les autres, forment des molécules qui se dilatent d'autant plus à proportion de la quantité des particules d'air qui les composent, & augmentent par ce moyen le volume du liquide.

De ce que je viens de dire, il est facile de déduire la raison pourquoi nos CrySTALLINS n'augmentent point de volume en gelant; la matière dont ils sont formés est trop visqueuse, elle empêche que ses particules d'air ne puissent facilement se communiquer, & s'unir les unes avec les autres, ce qui est nécessaire pour en augmenter le volume.

J'ai pourtant remarqué que lorsque les CrySTALLINS se sont dégelés, il s'est trouvé des bulles d'air très-petites sous la membrane crySTALLINE, & qu'il y en avoit encore de plus petites dispersées dans la substance des CrySTALLINS, mais il y a apparence que ces bulles se sont formées, lorsque les CrySTALLINS se sont dégelés; effectivement ils étoient

d'une très grande mollesse après-êtré dégelés, ce qui marque un peu de desunion dans les parties. C'est ce qui arrive pour l'ordinaire dans le dégel des corps mols, & dans ce dérangement il y a une petite quantité de particules d'air qui peuvent s'unir les unes avec les autres, & former des bulles, mais qui ne font pas assés de volume pour produire une augmentation sensible dans les Crystallins, car je n'en ai point trouvé qui aient augmenté de volume en dégelant.

EXPLICATION DES FIGURES

qui representent les Yeux gelés de differents animaux.

La première Figure represente un Oeil de Bœuf, vû par sa partie anterieure.

AB, le petit diametre de l'Oeil.

CD, le grand diametre.

E, la Cornée.

La seconde Figure represente un Oeil de Bœuf vû de côté.

AB, l'axe de l'Oeil.

CD, le grand diametre.

E, la Cornée.

Toutes les autres Figures representent des Yeux gelés, coupés par leur axe.

La troisième Figure est l'Oeil d'un Homme.

La quatrième est l'Oeil d'un Chien.

La cinquième est l'Oeil d'un Mouton.

La sixième est l'Oeil d'un Bœuf.

L

La septième est l'Oeil d'un Cheval.

Les Lettres de chacune de ces Figures
représentent les mêmes parties.

AB, le grand diametre de l'Oeil.

CD, son axe.

C, la Cornée.

EE, la glace de l'humeur aqueuse dans
la Chambre antérieure.

FF, l'Uvée qui fait une surface plane dans
l'Oeil de l'Homme, & convexe dans les au-
tres animaux.

G, le Crystallin.

HH, la glace de l'humeur aqueuse dans
la Chambre postérieure.

I, I, l'extrémité des Processus ciliaires
qui ont été détachés du Crystallin par la
gelée.

L, L, la glace de l'humeur vitrée.

M, le Nerf optique représenté dans sa si-
tuation naturelle dans tous les Yeux.

METHODE GENERALE

Pour transformer les Nombres irrationaux en series de Fractions. rationnelles les plus simples & les plus approchantes qu'il soit possible.


L'en explique à cette occasion un endroit important d'Archimede, qui paroît n'avoir pas été entendu par ses Commentateurs.


Par M. DE LAGNY.

LORSQUE le rapport de deux grandeurs est exprimé ou en tout, ou seulement en partie par des nombres irrationaux, l'on ne doit regarder cette expression que comme une espece de formule exemplaire, au moyen de laquelle on peut approcher indéfiniment du rapport cherché en nombres entiers; l'esprit n'apperçoit clairement & ne connoît parfaitement en ce genre que cette dernière expression. Aussi l'exacte & peut-être trop scrupuleuse Antiquité rejettoit entièrement les nombres irrationaux, non seulement comme n'étant pas de véritables nombres, mais comme ne pouvant servir à former;

37 Mars 1723.

Fig. 2.





mer aucune idée précise du rapport cherché, ni même dans une infinité de cas une idée tant soit peu approchante, comme il arrive dans les Polynomes irrationaux liés de plusieurs signes radicaux qui s'affectent les uns les autres, & qui sont mêlés de signes $+$ & $-$. Tel est, par exemple, le rapport du côté du Pentagone au côté du Quindecagone, inscrits dans le même cercle, car le diamètre étant 4, le côté du Pentagone $= \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$, & le Quindecagone $= \sqrt{7 - \sqrt{5} - \sqrt{30 - 6\sqrt{5}}}$, mais même dans les irrationaux les plus simples, comme $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, &c. il y a une obscurité essentielle, ou, pour parler plus exactement, une inintelligibilité nécessairement attachée à cette espèce d'expression.

Le Traité d'*Archimede* sur la mesure du Cercle, le dixième Livre des *Elemens* d'*Euclide*, & presque tout l'Ouvrage de *Diophante* fournissent des preuves évidentes de la manière de penser des Anciens sur ce sujet.

Le premier, au lieu d'opérer sur $\sqrt{3}$, s'est servi de deux valeurs approchées $\frac{265}{153}$ & $\frac{1351}{780}$, dont la première donne la valeur de $\sqrt{3}$ par défaut, & l'autre par excès, l'une & l'autre à très-peu-près, car le carré de $\frac{265}{153}$ est $\frac{70.225}{23.409}$
 $= 3 - \frac{2}{23409}$, & le carré de $\frac{1351}{780} = \frac{1.825.201}{608.400}$
 $= 3 + \frac{1}{608.400}$.

Quels détours n'a pas pris le second dans son dixième Livre, pour exprimer les rapports

ports des grandeurs incommensurables ? Il finit par celui du côté du quarré à sa diagonale. Rapport fameux chés les Anciens, & cité comme tel par de grands Philosophes.

Le troisiéme donnant la regle pour résoudre les Equations du second degré, ajoûte comme condition nécessaire & essentielle, ce qui exclud les irrationaux, & en effet tout le merite de la methode de *Diophante* consiste à éviter par certaines hypotheses ingenieuses les nombres irrationaux qui se présentent les premiers, & pour ainsi dire d'eux-mêmes & naturellement dans les questions numeriques indéterminées.

Ce n'est que depuis environ deux siècles qu'on a inventé les expressions des nombres irrationaux, avec la methode d'operer qu'on a d'abord appelé l'*Algorithme*, & qu'on auroit dû appeller la *Logistique* de cette espece de nombres. Ces expressions & cette logistique sont utiles & même nécessaires pour abreger le calcul & les démonstrations, mais, encore une fois, lorsqu'il s'agit d'exprimer les rapports de deux ou de plusieurs grandeurs, il faut, si l'on veut se rendre intelligible, avoir recours aux nombres rationaux, & même aux nombres entiers. Par exemple, le rapport de l'aire du quarré, à l'aire du quarré de la Diagonale, est exactement exprimé par le rapport de 1 à 2, mais le rapport du côté de ce même quarré à sa Diagonale est exprimé très-imparfaitement & intelligiblement par le rapport de 1 à $\sqrt{2}$; & comme il est démontré qu'il est absolument impossible de trouver deux nombres quarrés entiers & déterminés, tels que le plus grand soit

soit précisément double du plus petit, tout ce que peut faire de mieux une intelligence finie quelconque, c'est de trouver *régulièrement, indéfiniment, & sans aucun tâtonnement* (remarquez ces trois conditions, & sur-tout la dernière) c'est, dis-je, de trouver ainsi la serie de tous les nombres quarrés pris deux à deux, tels que la différence du plus grand au double du petit, soit par excès, soit par défaut, soit la plus petite qu'il soit possible, & il est évident que cette différence ne sauroit être plus petite que l'unité. Telle est la serie suivant $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{17}{12}, \frac{19}{12},$ &c. dont les quarrés des numérateurs comparés aux quarrés des dénominateurs, sont

$$\begin{array}{rcl} 1 & = 2 \times & 1 - 1. \\ 9 & = 2 \times & 4 + 1. \\ 49 & = 2 \times & 25 - 1. \\ 289 & = 2 \times & 144 + 1. \\ 1681 & = 2 \times & 841 - 1. \end{array}$$

Et ainsi de suite à l'infini, suivant la formu-

le generale & exemplaire $\frac{a^2}{b}$ & $\frac{1a+2b}{1a+1b}$

Et il est évident que pour continuer cette serie à l'infini, & par conséquent pour approcher indéfiniment du rapport de $\sqrt{2}$ à 1, ou de la valeur de $\sqrt{2}$, il ne faut absolument aucun tâtonnement, puisque l'on n'emploie jamais dans l'operation que l'addition & la duplication sans aucune division ni extraction des racines; qui sont les deux seules operations où il entre en general essentiellement du tâtonnement, qui est ce qui fatigue & rebute le plus les calculateurs, comme étant une operation indigne des Sciences exactes.

On ajoûte ordinairement des tranches d'un certain nombre de zero pour continuer l'approximation par extraction de racines. Cette methode suppose en general une expression *purement arbitraire* des nombres, suivant une progression geometrique continuë quelconque. L'usage a introduit la progression *décuple*. Mais outre qu'il est évident qu'on devroit exclure des méthodes mathématiques tout ce qui est purement arbitraire, pour ne suivre que la méthode démonstrativement la plus simple & la plus naturelle, ou plutôt la seule methode naturelle & raisonnable. Il y a deux défauts dans cette methode d'addition de zero. Le premier est le tâtonnement qui est inséparable en general de l'extraction des racines. Le second & le plus essentiel, c'est que l'on ne peut, en la suivant, trouver absolument rien de réglé dans la suite des chiffres du numerateur. Il est aisé de démontrer cette impossibilité qui empêche la serie d'être *régulière*; car si la suite des numerateurs étoit réglée ou geometriquement ou arithmétiquement, ou d'une manière mixte quelconque de progressions connues, l'on pourroit intégrer la serie en nombres rationaux, puisque la serie des dénominateurs est réglée en progression geometrique continuë de 10 à 1, & par conséquent le nombre irrationnel donné à transformer en serie ne seroit pas irrationnel. Ce qui est absurde & contre l'hypothese. Reprenons pour exemple $\sqrt{2}$. Si l'on continuë l'extraction de la racine quarrée de 2, en ajoûtant à 2 tant de tranches qu'on voudra, par exemple huit tranches de deux zero.

zero chacune, l'on trouvera pour racine 1

$$\frac{41.421.356 + \&c.}{100.000.000 + \&c.}, \text{ c'est-à-dire } 1 + \frac{4}{10} + \frac{1}{100} + \frac{4}{1000} + \frac{2}{10000} + \frac{1}{100.000} + \frac{3}{1.000.000} + \frac{5}{10.000.000} + \frac{6}{100.000.000}, \&c.$$

Et dans toute autre extraction de racine irrationnelle d'une Equation quelconque, l'on trouvera pour racine $a + \frac{b}{10} + \frac{c}{100} +$

$$+ \frac{d}{1000} + \frac{e}{10.000}, \&c.$$

L'on épuiserait inutilement non seulement toutes les Lettres de nôtre alphabet, mais celles de cent alphabets de cent Langues toutes différentes, & tous les alphabets possibles, sans pouvoir jamais trouver de suite réglée dans les numerateurs.

Si au contraire l'on substitue l'ordre simple & naturel à l'arrangement arbitraire, non seulement la serie sera parfaitement réglée, suivant la nature de l'Equation qui a produit l'irrationnel donné. Mais on la trouvera sans aucun tâtonnement, & l'on abregera indéfiniment plus le calcul que par cette addition arbitraire & mecanique des tranches de zero, & c'est une maxime constante & generale en matière de methodes arithmétiques & algebriques, *Que la methode fondée en raison démonstrative & nécessaire est en tout sens & à tous égards indéfiniment preferable aux methodes fondées sur l'arbitraire.*

Si l'on suit la methode ordinaire, l'on exprimera moins exactement par de plus grands

84. MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
nombres un rapport qui peut s'exprimer plus
exactement par de plus petits. Ce qui est
absurde & un vrai paralogisme de calcul, &
il est surprenant qu'on ne s'en soit point
aperçu.

Les nombres d'approximation ainsi trou-
vés par addition de tranches de zero, & par
la continuation de l'extraction des racines,
ou même en general par toute autre metho-
de plus ou moins praticable, peuvent & doi-
vent uniquement servir de materiaux pour
trouver enfin la seule bonne & véritable se-
rie, en y appliquant la methode du Triangle
des rapports que je donnai à l'Academie le
2 Decembre 1705. L'exemple que je vais
donner tombe de lui-même & directement
dans ce cas simple du Triangle des rapports ;
mais c'est un cas particulier.

Archimede nous fournit le premier modelle
de transformation d'un nombre irrationnel
 $\sqrt{3}$ en fractions rationnelles. Il s'agissoit
d'exprimer en nombres les rapports du dia-
mètre du Cercle aux perimetres des Poly-
gones inscrits & circonscrits de 3, de 6, de
12, de 24, de 48 & de 96 côtés, afin de
déterminer assés exactement, pour la prati-
que, le rapport du diamètre à la circonfé-
rence.

On pourroit demander pourquoi *Archime-*
de a préféré pour le nombre des côtés des
Polygones réguliers, cette progression geo-
metrique continuë, 3, 6, 12, 24, 48, 96, à
celle-ci qui paroît bien plus simple 4, 8, 16,
32, 64, 128. Je réponds que le rapport par-
fait d'égalité entre le côté de l'hexagone ins-
crit & le rayon est apparemment ce qui l'a
dé-

déterminé au choix de la première progression. Mais le côté du Triangle équilatéral inscrit au Cercle étant au rayon comme $\sqrt{3}$ à 1, *Archimede* ne pouvoit exprimer ce rapport qu'en substituant, comme il a fait, deux fractions rationnelles qui exprimassent cette valeur $\sqrt{3}$ à très-peu près & en très-petits nombres, l'une par défaut, & l'autre par excès, afin d'avoir des limites suffisantes.

Il choisit $\frac{265}{153} +$ & $\frac{1351}{780} -$. Ce choix est fait

avec beaucoup d'art, & aucun des Cominentateurs, que je sache, ne s'est apperçu de la methode qui peut l'y avoir conduit.

Il est pourtant, ce me semble, plus important, plus utile & plus satisfaisant pour le Lecteur, de trouver le chemin qu'ont suivi les grands Geometres pour parvenir à leurs nouvelles découvertes, que de se laisser simplement convaincre par la démonstration. On devient en quelque manière soi-même inventeur; l'on apprend du moins à le devenir.

Voici donc les différents pas qu'*Archimede* fit apparemment dans cette recherche.

1.^o Il est évident que s'il étoit possible d'exprimer exactement la valeur de $\sqrt{3}$, ce seroit par une fraction dont la valeur seroit plus grande que 1, & plus petite que 2, & dont le quarré du numerateur contiendroît exactement trois fois le quarré du dénominateur, mais cela étant absolument impossible, *Archimede* ne pouvoit rien faire de mieux que de trouver methodiquement & régulièrement la suite de chaque deux nom-

bres quarrés, tels que le quarré du plus grand ne surpassât ou ne fût surpassé par le triple du quarré du plus petit que le moins qu'il soit possible.

Lorsque cet excès & ce défaut ne sont chacun que d'une unité, il est évident que c'est la plus petite différence possible, & c'est ce qui arrive dans la transformation de $\sqrt{2}$.

en la serie ci-dessus $\frac{1+}{1}, \frac{2-}{2}, \frac{7+}{5}, \frac{17-}{12},$
 $\frac{41+}{29},$ &c.

La même chose arrive dans $\sqrt{5}$, qui se transforme dans la serie $\frac{2+}{1}, \frac{9+}{4}, \frac{38+}{17}, \frac{161-}{72},$

$\frac{682+}{305},$ &c. & dans $\sqrt{10}, \sqrt{17},$ &c. & en general dans $\sqrt{aa+1}.$

Le second cas est lorsque l'une des deux différences est seulement d'une unité dans le quarré multiple, & que l'autre différence est plus grande, comme il arrive dans $\sqrt{3}$, où l'excès dans le quarré triple n'est que d'une unité; mais le défaut est de 2.

Entin le troisième cas est lorsque ces différences sont en general toutes deux plus grandes que l'unité, mais pourtant les plus petites qu'il soit possible.

La dernière perfection de la methode dans la resolution des Equations qui ont des racines irrationelles, est de trouver ces racines si approchées, que la difference de l'homogene de comparaison qui en résulte soit toujours moindre que l'unité & par excès & par défaut: Il n'y a point d'autre limitation qui ne soit arbitraire. Celle-ci est
 fon

fondée sur la nature même des nombres.

Il y a apparence qu'*Archimede* reconnut d'abord simplement par induction & en tâtonnant, que la première espece de fraction qui se presente pour $\sqrt{3}$, c'est $\frac{1}{2}$, car le quarré 4. du numerateur 2 excède d'une unité le triple du quarré 1 du dénominateur 1: en effet $4 = 3 \times 1 + 1$.

La seconde fraction qui se presente ensuite est $\frac{1}{3}$, car le quarré 25 du numerateur 5 est surpassé de 2 par le triple du quarré 9 du dénominateur 3; en effet $25 = 3 \times 9 - 2 = 27 - 2$.

La troisième fraction est $\frac{1}{4}$, qui donne $\frac{49}{16}$ & $49 = 3 \times 16 + 1$.

On trouvera de même la quatrième fraction $\frac{19}{11}$ qui donne $\frac{361}{121}$ & $361 = 3 \times 121 - 2$.

Et la cinquième $\frac{26}{15}$, qui donne $\frac{676}{225}$ & $676 = 3 \times 225 + 1$.

Et la sixième $\frac{71}{41}$, qui donne $\frac{5041}{1681}$ & $5041 = 3 \times 1681 - 2$.

Voilà donc déjà un commencement de serie alternative par excès & par défaut, trouvé simplement par induction.

$$\frac{2-}{1}, \frac{5+}{3}, \frac{7-}{4}, \frac{19+}{11}, \frac{26-}{15}, \frac{71+}{41};$$

Or suivant l'excellente remarque de *M. Descartes* dans sa *Geometrie*: Dès qu'en matiere de series ou progressions l'on a un certain nombre de termes connus, l'on a bien-tôt toute la suite, c'est-à-dire la methode de continuer.

88 MÉMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
tinner la serie à l'infini; il ne s'agit plus que
 d'un peu de sagacité pour découvrir l'ordre,
 la liaison. l'analogie dans ces premiers ter-
 mes de la serie.

On voit ici une serie de six termes alterna-
 tivement excédants & défailants: J'en for-
 me deux series de trois termes chacune, l'une
 toute d'excédants, & l'autre toute de dé-
 failants:

$$\text{Excédants } \frac{2-}{1}, \frac{7-}{4}, \frac{26-}{15}, \&c.$$

$$\text{Défailants } \frac{5+}{3}, \frac{15+}{11}, \frac{71+}{41}, \&c.$$

Et c'est le second pas qu'il falloit faire.

Le troisiéme est donc d'examiner l'ordre,
 la liaison, l'analogie qui regnent dans chacu-
 ne de ces deux series. C'est en general ce
 qu'il y a de plus difficile; mais il est aisé ici
 de s'appercevoir que chaque numérateur sui-
 vant est égal au double du numérateur pré-
 cédent plus le triple du dénominateur aussi
 précédent, & que chaque dénominateur sui-
 vant est égal au double du dénominateur
 précédent plus le numérateur aussi préce-
 dent.

Ainsi dans la première serie, en conside-
 rant les numerateurs de la serie $\frac{2-}{1}, \frac{7-}{4}, \frac{26-}{15},$

$$\begin{aligned} \text{Je vois que } 7 &= 2 \times 2 + 3 \times 1 = 4 + 3 = 7. \\ &\& 26 = 2 \times 7 + 3 \times 4 = 14 + 12 = 26. \end{aligned}$$

Et en considerant les dénominateurs de la
 même serie,

$$\begin{aligned} \text{Je vois que } 4 &= 2 \times 1 + 2 = 2 + 2 = 4. \\ \text{que } 15 &= 2 \times 4 + 7 = 8 + 7 = 15. \end{aligned}$$

Dans

Dans la seconde serie $\frac{1}{3}, \frac{19}{11}, \frac{71}{41}$, &c. c'est précisément la même analogie; car en considérant les numerateurs,

Je vois que $19 = 2 \times 5 + 3 \times 3 = 10 + 9 = 19$.
que $71 = 2 \times 19 + 3 \times 11 = 38 + 33 = 71$.

Et en considérant les dénominateurs,

Je vois que $11 = 2 \times 3 + 5 = 6 + 5 = 11$.
que $41 = 2 \times 11 + 19 = 22 + 19 = 41$.

Ce n'est jusqu'ici qu'une induction; & pour avoir une entière & parfaite certitude, il y a un quatrième pas à faire, c'est de supposer

en general la fraction generatrice $\frac{a}{b}$, telle

que dans la première serie l'on ait $aa = 3bb + 1$, & que dans la seconde serie l'on ait

la fraction generatrice $\frac{A}{B}$, telle que $AA = 3$

$BB - 2$, afin d'examiner ensuite si les deux

fractions resultantes en general $\frac{2a+3b}{1a+2b}$ &

$\frac{2A+3B}{1A+2B}$ conservent *indéfiniment* la même

propriété, en sorte que la fraction $\frac{a}{b}$ repre-

sentant un terme quelconque de la première

serie, on soit assuré que la fraction $\frac{2a+3b}{1a+2b}$

doive infailliblement représenter le terme im-

mediatement suivant de la même serie, & de

même pour $\frac{A}{B}$ & $\frac{2A+3B}{1A+2B}$ dans la seconde

serie. Or ce qui se démontre aisément, car

le quarré du numerateur $2a+3b$ est $4aa$

+ 12

+ $12ab + 9bb$. Le quarré du dénominateur $1a + 2b$ est $1aa + 4ab + 4bb$, dont le triple est $3aa + 12ab + 12bb$.

La différence du quarré du numerateur au quarré du dénominateur est $1aa - 3bb$.

Or par l'hypothese $1aa = 3bb + 1$. Donc cette différence $1aa - 3bb = 1$. Ce qu'il falloit démontrer pour la première serie.

On démontrera de même dans la seconde serie que la différence sera $3BB - 1AA$, & comme par l'hypothese $1AA = 3BB - 2$, cette différence sera $= 2$. Ce qu'il falloit démontrer pour la seconde serie.

Je puis donc continuer *indéfiniment* ces deux series, en me servant de la formule

exemplaire $\frac{a}{b}$ & $\frac{2a+3b}{1a+2b}$, ou $\frac{A}{B}$ & $\frac{2A+3B}{1A+2B}$.

& je trouverai les deux series suivantes.

Première Serie. $\frac{2}{1}, \frac{7}{4}, \frac{26}{15}, \frac{97}{56}, \frac{362}{209}, \frac{1351}{780}, \&c.$

Seconde Serie. $\frac{5}{3}, \frac{19}{11}, \frac{71}{41}, \frac{265}{153}, \frac{989}{571}, \frac{3691}{2631}, \&c.$

Ordre des termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c.

Et voilà les deux fractions d'*Archimede* trouvées $\frac{1351}{780}$ qui est le sixième terme dans

la première serie, & $\frac{265}{153}$ qui est le quatrième terme dans la seconde serie. La question me paroît pleinement approfondie par rapport à *Archimede*. Il est aisé de trouver ensuite la methode generale pour tous les nombres quarrés irrationaux.

Le

Le premier est $\sqrt{2}$, qui exprime le rapport de la diagonale du carré à son côté = 1.

Le second est $\sqrt{3}$, qui exprime le rapport du côté du Triangle équilatéral inscrit dans le Cercle au rayon du même Cercle = 1, & c'est de ce rapport de $\sqrt{3}$ à 1 transformé en serie de fractions rationnelles que dépend immédiatement la détermination très prompte & très-simple du rapport du diamètre à la circonference, tel que je l'ai donné dans les Memoires de l'Academie en 1719, page 176. & suivantes par la Tangente de 30 degrés, & qu'on pourroit encore abréger & perfectionner par la Tangente de 15 degrés, qui se réduit à trouver la serie de $2 - \sqrt{3}$ aussi aisée & plus prompte que celle de $\sqrt{3}$.

Le troisième est $\sqrt{5}$, qui entre nécessairement dans l'expression du rapport du côté du pentagone au rayon du cercle, & de même pour les polygones de 10, de 20, de 40, de 80, &c. côtés.

Le quatrième est $\sqrt{6}$, qu'on peut transformer ou *mediatement* par $\sqrt{2}$ & $\sqrt{3}$, ou *immédiatement* par la formule exemplaire qui lui est propre.

Le cinquième est $\sqrt{7}$, qui entre nécessairement dans l'expression du rapport du côté de l'heptagone au rayon, & des polygones de 14, 28, 56, 112, &c. côtés, comme je pourrai le démontrer dans un Memoire particulier sur l'Heptagone; & ainsi des autres irrationaux du second degré, où l'on peut remarquer l'analogie du nombre des côtés du Polygone régulier dans l'expression de son rapport au rayon avec le nombre carré irrationnel correspondant, &c.

Voici

92 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Voici ces formules exemplaires dans une parfaite analogie.

Pour $\sqrt{1}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{1a+1b}{1a+1b}$ rationel.

Pour $\sqrt{2}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{1a+2b}{1a+1b}$

Pour $\sqrt{3}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{2a+3b}{1a+2b}$

Pour $\sqrt{4}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{2a+4b}{1a+2b}$ rationel.

Pour $\sqrt{5}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{2a+5b}{1a+2b}$

Pour $\sqrt{6}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{2a+6b}{1a+2b}$

Pour $\sqrt{7}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{2a+7b}{1a+2b}$, ou $\frac{3a+7b}{1a+3b}$

Pour $\sqrt{8}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{2a+8b}{1a+2b}$, ou $\frac{3a+8b}{1a+3b}$

Pour $\sqrt{9}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{3a+9b}{1a+3b}$ rationel.

&c. &c. &c.

Pour $\sqrt{13}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{3a+13b}{1a+3b}$, ou $\frac{4a+13b}{1a+4b}$

&c. &c. &c.

Pour $\sqrt{41}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{6a+41b}{1a+6b}$, ou $\frac{7a+41b}{1a+7b}$

&c. &c. &c.

Pour $\sqrt{46}$ $\frac{1a}{1b}$ & $\frac{6a+46b}{1a+6b}$, ou $\frac{7a+46b}{1a+7b}$

En general tout irrationel du second degré peut s'exprimer par $\sqrt{aa+b}$, & par $\sqrt{AA-B}$.

$\sqrt{AA-B}$. Dans le premier cas soit $aa+b=c$ & $a=d$, la formule sera $\frac{a}{b}$ & $\frac{ad+cb}{1a+ab}$; puis supposant $ad+cb=e$ & $1a+ab=f$, on aura $\frac{ae+cf}{1e+af}$ pour second terme; puis supposant $ae+cf=g$ & $1e+af=b$, on aura pour troisième terme $\frac{ag+cb}{1g+ab}$ & ainsi de suite à l'infini.

Dans le second cas pour $\sqrt{AA-B}$, on supposera de même $AA-B=C$ & $A=D$, & l'on aura $\frac{A}{B}$ & $\frac{AD+CB}{1A+AB}$, &c. universellement pour $\sqrt{aa+b} = \frac{1x}{1y}$ en supposant $aa+b=c$, l'on aura $\frac{ax+cy}{1x+ay}$.

Il est aisé d'observer l'analogie dans la série des formules ci-dessus: elle comprend également les nombres irrationaux du second degré, & les nombres rationaux. Ce qui est une propriété assez singulière, & en même temps une preuve de la bonté de la méthode.

REMARQUE I.

On peut d'abord former quatre séries d'approximation dans chaque cas particulier d'irrationnel du second degré, deux séries sur chacune des deux formules exemplaires, dont l'une est la formule par excès, & l'autre

94 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
 tre la formule par défaut. Par exemple dans
 $\sqrt{41}$, l'on peut former les quatre series sui-
 vantes; car supposant $a=6$ & $b=1$, & se
 servant de la formule exemplaire $\frac{a}{b}$ &
 $\frac{6a+41b}{1a+6b}$, on formera la première serie
 $\frac{6}{1}, \frac{77}{12}, \frac{954}{49}, \frac{11833}{1848}, \frac{146766}{22921}, \&c.$

La même première formule $\frac{6a+41b}{1a+6b}$ & $\frac{1a}{1b}$,
 supposant $a=7$, donne la seconde serie
 & $b=1$
 $\frac{7}{1}, \frac{81}{13}, \frac{1031}{161}, \frac{12787}{1997}, \frac{158599}{24769}, \&c.$

La seconde formule $\frac{7a+41b}{1a+7b}$ & $\frac{1a}{1b}$, en
 supposant $a=7$ donne la troisième serie
 & $b=1$
 $\frac{7}{1} \mid \frac{90}{14} \text{ ou } \frac{45}{7} \mid \frac{1204}{188} \text{ ou } \frac{301}{47} \mid \frac{16116}{2520} \text{ ou } \frac{2017}{315} \mid \frac{216272}{33776}$
 ou $\frac{13517}{2711} \mid \&c.$

Enfin la même seconde formule $\frac{7a+41b}{1a+7b}$,
 en supposant $a=6$, donne la quatrième serie
 & $b=1$

$\frac{6}{1} \mid \frac{83}{13} \mid \frac{1114}{174} \text{ ou } \frac{557}{87} \mid \frac{14912}{6332} \text{ ou } \frac{1849}{289} \mid \frac{200136}{37256} \text{ ou}$
 $\frac{25017}{3907} \mid \&c.$

REMARQUE II.

Mais ce qui doit paroître surprenant, & qui est un vrai paradoxe, c'est que chacune de ces deux formules $\frac{6a+41b}{1a+6b}$ & $\frac{7a+41b}{1a+7b}$ fournira une infinité d'autres series qui approcheront toutes & chacune indéfiniment de la valeur cherchée $\sqrt{41}$, en supposant a égal à un nombre quelconque, & b égal aussi à un autre nombre quelconque, avec cette seule condition ou restriction que a soit plus grand que b ; par exemple, on peut supposer $a=100$, & $b=7=13=91$, &c. $=99$, & la force, ou, pour ainsi dire, la vertu de la formule est telle qu'on approchera toujours indéfiniment, quelque extravagante que paroisse d'abord la supposition, soit par excès, comme de $\frac{100}{7} = \sqrt{41}$, ou par défaut, comme de $\frac{100}{97} = \sqrt{41}$.

REMARQUE III.

Il y a évidemment un choix à faire de la meilleure, non seulement des quatre series primitives, mais de l'infinité des autres series possibles. Tout se réduit enfin à la serie formée par le Triangle des rapports, qui est la plus simple & la meilleure de toutes.

$$\frac{6}{1} \mid \frac{13}{2}, \frac{32}{5}, \frac{397}{67}, \mid \frac{826}{129}, \frac{2049}{320}, \frac{25414}{3969} \mid \&c.$$

Et

96 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
Et qui se forme ainsi par la suite des quod-
tients generateurs $6|2, 2, 12|2, 2, 12|$
à l'infini, en continuant par $2, 2, 12$.

La serie des numerateurs, $6|13, 32, 397|$
 $826, 2049, 25414|$ se forme ainsi:

A.	B.	C.	D.	
6.	13.	32.	397.	
	$2A+1.$	$2B+1A.$	$12C+1B.$	
	E.	F.	G.	&c.
	826.	2049.	25414.	
	$2D+1C.$	$2E+1D.$	$12F+1E.$	

La serie des dénominateurs $1, 2, 5, 67,$
 $129, 320, 3969, \&c.$ se forme ainsi & de
même que celle des numerateurs.

a.	b.	c.	d.	
1.	2.	5.	67.	
	$2a+0.$	$2b+1a.$	$12c+1b.$	
	e.	f.	g.	&c.
	129.	320.	3969.	
	$2d+1c.$	$2e+1d.$	$12f+1e.$	

REMARQUE IV.

La methode d'*approximation* ne doit être
employée que dans le cas où la methode
d'*exactitude* est impossible. Il est vrai d'un
côté que celle-ci est infiniment plus parfaite
que

que l'autre, quoi-que la difference ou l'erreur puisse devenir indéfiniment petite; mais c'est par rapport au temps qu'il faudroit employer dans l'approximation pour atteindre à l'exactitude. Ce temps est infini. Il faudroit l'éternité toute entière. En ce sens la methode d'*exactitude* est infiniment plus parfaite que celle d'approximation, mais d'un autre côté celle-ci est d'un usage indéfiniment plus frequent & plus étendu que l'autre, parce que dans tout genre & toute espece de problemes ou d'Equations au dessus du premier degré, il y a une infinité plus de cas où les racines cherchées sont irrationnelles, qu'il n'y en a où elles sont rationnelles. Ainsi il y a une espece de compensation pour le prix de ces deux genres de methodes par rapport au calcul.

REMARQUE V.

1.° On étendra dans d'autres Memoires cette methode d'approximation à tous les nombres irrationaux simples & composés de tous les degrés à l'infini.

2.° On fixera dans chaque cas les limites d'approximation.

3.° On abregera indéfiniment l'operation & le calcul par de nouvelles series dérivées de la serie fondamentale qui donne tous les termes de suite, en trouvant les termes, suivant un nouvel ordre d'exposans en progression arithmétique ou geometrique quelconque ou composé de ces deux progressions. C'est précisément comme on abrege l'addition des simples unités une à une par l'addi-

tion ordinaire, & comme on abrege l'addition par la multiplication & la formation des puissances.

4.^o Après avoir trouvé en nombres entiers les racines approchées de toutes les Equations par ma methode des progressions arithmetiques de tous les degrés à l'infini, on appliquera la methode d'approximation à toutes ces mêmes Equations, en sorte que *sans aucun tâtonnement* on réduira à moins d'une unité la différence de l'homogene de comparaison resultant de la racine approchée trouvée à l'homogene donné, quelque immense que pût être d'abord cette différence, & c'est, ce me semble, à quoi se réduit tout ce qu'on peut souhaiter dans la Science du Calcul.

OBSERVATIONS ANATOMIQUES

*Sur quelques mouvemens extraordinaires
des Omoplates & des Bras.*

Et sur une nouvelle espece de Muscles.

Par M. WINSLOW.

*. **L**A Myologie des extremités du Corps humain est la partie de l'Anatomie que l'on croit la plus facile & la plus connue.

* 7 Avril 1723;

nuë. La dissection de ces Muscles n'embarasse pas même les Comménçants. Leur démonstration se fait communément d'une manière à faire croire qu'un coup d'œil suffira pour en comprendre la mécanique & l'usage. Et comme plusieurs grands Maîtres avoient travaillé là-dessus, je croyois aussi cette matière presque épuisée, & par conséquent assez sterile pour un Academicien, jusqu'à ce que *M. l'Abbé Bignon* me fit l'honneur de m'engager à un nouvel examen des articulations, comme il paroît par les *Memoires de l'Academie de l'année 1719.*

Je commençai d'abord par quelques-uns des Muscles de l'Omoplate. Ensuite je découvris dans plusieurs autres des usages dont personne n'avoit parlé, comme on peut voir dans les *Memoires imprimés depuis.* Je ne peux m'empêcher à cette occasion de marquer ma douleur au sujet de la perte que j'ai faite, aussi-bien que toute l'Academie, par la mort de feu *M. Varignon*, qui m'avoit fort encouragé par le contentement qu'il me témoignoit de mon entreprise, & encore plus par une espece de convention de travailler avec moi sur cette matière, qu'il aimoit & qu'il avoit autrefois étudiée avec beaucoup de plaisir.

Il se presente aujourd'hui une occasion très-particulière d'admirer l'artifice de quelques mouvemens extraordinaires des omoplates & des bras, qu'il n'est pas si aisé de comprendre que l'on pourroit s'imaginer. En voici l'histoire.

Un *Venitien* nommé *Dominique Create*, âgé de 64 ans, un peu maigre & d'une taille

100 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
mediocre, fait les tours suivans avec ses
omoplates & ses bras.

1.^o Il fait saillir très-considerablement les
bouts ou les angles inferieurs de ses omo-
plates, & les éloigne du dos, enforte que
les omoplates soulevent la peau, forment
un creux considerable entre elles, & paroîs-
sent comme des ailerons ou des moignons
d'aîle pointuës. *Voyez la premiere Figure.*

Il remuë les omoplates dans cette attitu-
de avec une grande vitesse en haut, enbas,
de côté & d'autre, & de plusieurs autres
mouvemens combinés de ceux-ci.

2.^o Il approche les omoplates l'une de
l'autre, de manière que leurs bases se tou-
chent tout-à-fait & couvrent l'épine du dos.
Il les approche avec tant de force, qu'en
mettant une canne ou un bâton le long de
l'épine du dos, il l'embrasse entierement a-
vec les omoplates, & les tient si fermement,
qu'une autre personne ayant empoigné le
bâton ou la canne ainsi embrassés, souleve
par-là tout le corps du *Venitien* de terre.
Voyez la seconde Figure.

Par le même mouvement d'omoplates il
embrasse le bout d'une grosse corde attachée
au plancher, & en retirant ses jambes, il
demeure suspendu en l'air, & se laisse ba-
lancer, ou pour ainsi dire voltiger sans quit-
ter la corde. Par ce moyen il manie enco-
re fort adroitement un fleuret au dessus de sa
tête, en courbant le corps en devant. Il
joué aussi très-aisément du drapeau avec ses
omoplates. Tout ceci, comme encore de
casser une noix avec les épaules, n'est que
la suite d'un même mouvement.

3.^o Il se donne une espece d'estrapade, & cela d'une manière assés surprenante. Voici comme il s'y prend. Il se tient debout, & après s'être lié les mains par un mouchoir assés près l'une de l'autre, desorte qu'elles ne puissent pas se quitter, il leve un pied après l'autre pour passer ses mains par dessous, & les porter derriere le dos il fait ensuite plusieurs mouvemens & efforts pour les jeter plus en arriere & en haut; ce qu'ayant réitéré plusieurs fois, il les passe de derriere en haut par dessus la tête, & les fait revenir sur le devant où elles étoient quand il commençoit, & cela sans qu'elles se soient quittées. Ayant fait ces tours de bras plusieurs fois de suite, il les fait autant de fois à contre-sens, c'est-à-dire, il jette les bras de devant en haut par dessus la tête, & de-là en arriere, d'où il les fait revenir par dessous les pieds & en devant où il finit. *Voyez la troisième & la quatrième Figure.*

4.^o Il tourne le bras droit en manière de moulinet sur l'articulation de l'épaule, comme s'il étoit tout-à-fait disloqué, de manière que le bras, qui est toujours étendu, passe directement en arriere, & de-là en haut, de même qu'en devant & en bas. Il fait ces tours avec une grande vitesse, & les ayant faits plusieurs fois dans un sens, il les repasse autant de fois à contre-sens.

M de Reaumur, qui s'est toujours signalé dans la Compagnie par ses recherches infatigables & ses excellentes découvertes, mais sur-tout par sa maniere de travailler en vrai Physicien, & conformément à l'intention de notre auguste Fondateur, de glorieuse me-

moire, m'exhorta de donner une explication anatomique de ces tours, & me temoigna ensuite que *M. l'Abbé Bignon* seroit bien-aisé que j'en fisse un Memoire pour l'Assemblée publique.

Sur cela je vis nôtre *Venitien* en particulier chés *M. Sauré*, très-habile Chirurgien-Juré à *Paris*, que j'avois prié de le faire venir chés lui, comme c'étoit lui qui me l'avoit indiqué par rapport à mon travail sur les Muscles. J'examinai là à mon aise & de près par la vûë & par le maniement toutes les differences de mouvemens & d'attitudes qui se presentoit avant, pendant & après chaque tour qu'il faisoit. Je fis principalement les observations suivantes.

1.^o La conformation des omoplates, des clavicules, des bras, du dos & de la poitrine paroît assés naturelle.

Je fais exprès cette remarque pour distinguer les tours de nôtre *Venitien* comme naturels, d'avec ceux qui se font par des os dérangés des cartilages écornés & des ligamens forcés dès la jeunesse.

2.^o Pour éloigner ses omoplates du dos en manière d'aîlerons, il tournoit les bras en arriere, & joignoit derriere le dos ses deux mains par un certain entrelacement de ses doigts. Il avoit en même temps le dos voûté & la tête baissée. Dans cette attitude la partie supérieure du Muscle Trapeze paroissoit très-legerement bandée & le Biceps gonflé.

3.^o Pour joindre les omoplates & pour leur faire embrasser ou tenir un bâton, une épée, une corde, &c. il tournoit aussi les bras en arriere,

arriere, & joignoit les mains, mais avec cette difference, qu'il tenoit toujours les bras exactement étendus & très-roides, soit qu'il fût debout pour embrasser la corde ou le bâton, soit qu'il se baissât pour prendre & manier l'épée & le drapeau. Dans cette attitude des bras, le Biceps de chacun étoit extrêmement gonflé, bandé & dur, & le moignon de chaque épaule étoit baissé.

4.^o A l'égard du mouvement d'estrapade, il se faisoit si vite, que l'on ne pouvoit pas bien fixer la vûe pour suivre distinctement les différentes attitudes qui se succedoient, & il étoit comme impossible à nôtre *Venitien* de tenir pendant tant soit peu de temps les bras en place ou en repos dans quelques uns des espaces qu'ils parcouroient entre leur attitude presque horizontale derriere le dos, & leur attitude perpendiculaire sur la tête.

5.^o Le mouvement de moulinet étoit encore plus prompt, & ne permettoit aucune inspection assés distincte pour faire des observations sur les attitudes successives des bras ainsi mus. Tout ce que je pûs remarquer ici, est qu'il disoit avoir besoin de faire encore ce tour à contre-sens pour raccommoder son bras; & il le fit outre cela ensuite tirer & secouer par une autre personne pour la même raison. Il observoit à peu près la même chose après le mouvement d'estrapade. Il étoit plus long à se mettre en train pour ces deux sortes de mouvemens quand il avoit froid que quand il avoit chaud.

Après l'exposé historique des principaux tours du *Venitien*, & l'examen que j'en ai fait, il faut voir comment on les peut ex-

104 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
plier par l'Anatomie, & quelle utilité on
peut tirer de cette curiosité.

A l'égard de la saillie extraordinaire des
omoplates en manière d'aîlerons, on pour-
roit avec quelque raison croire qu'il n'y a
que le plan supérieur du Muscle Trapeze qui
puisse produire cet effet, en agissant sur l'o-
moplate comme sur un levier de la troisième
espece. Dans ce cas le point d'appui seroit
à la partie supérieure de l'omoplate, qui se-
roit fixée à cet endroit en partie par le bras
arrêté en arrière, & en partie par la portion
supérieure du Muscle Grand-dentelé. Le
plan supérieur du Trapeze seroit la puissance
qui, en tirant l'acromion en haut, souleve-
roit en même temps comme une espece de
poids ou de résistance l'angle inférieur de l'o-
moplate avec la peau. C'étoit ainsi que je
croyois d'abord avoir trouvé l'explication de
ce phénomène vu de loin : mais en l'exami-
nant de près, je me sentis bien puni, pour a-
voir voulu aller à trop grand pas contre mon
ordinaire ; car je trouvai très peu de résistan-
ce dans le Muscle Trapeze, & je vis avec
étonnement une grande contraction dans
le Muscle Biceps, dont on borne commu-
nément l'usage à la flexion de l'avant-bras.
Cependant je fus très-ravi de trouver encore
un nouvel emploi de ce muscle, outre ceux
que j'avois déjà découverts & publiés dans
les Memoires de l'Academie de 1720.

Ce nouveau phénomène du Muscle Biceps
me parut d'abord fort extraordinaire, mais
après avoir bien confronté sa situation natu-
relle avec l'attitude que le Venitien donne à
ses bras dans cette occasion, je crois l'avoir
com-

compris de la manière suivante. Quand on tient les mains jointes derrière le dos, ayant les coudes fléchis, il faut nécessairement que la partie antérieure de l'os du bras soit tournée vers les côtes, & les autres parties à proportion, comme il paroît aisés évidemment par la situation forcée du coude & du pli de chaque bras dans cette attitude. On sçait que le Muscle Biceps est attaché par son extrémité inférieure à l'avant-bras, & par deux extrémités supérieures à l'omoplate, savoir au dessus de sa cavité glénoïde & à la pointe de son avance nommée *coracoïde*; on fait aussi que le corps de ce muscle est placé le long de la partie presque antérieure de l'os du bras. Ainsi dans l'attitude présente, l'os du bras étant contourné de la manière que je viens de dire, ce muscle est aussi tourné vers les côtes, & paroît même en arrière, comme on voit par la première Figure. Il s'ensuit de là qu'étant contracté ou raccourci dans cette situation, & son extrémité inférieure étant fixée par l'avant-bras qui est arrêté derrière le dos, il doit mouvoir l'omoplate sur la tête de l'os du bras en manière de levier de la première espèce, c'est-à-dire, appliquer sa partie supérieure aux côtes, & par le même mouvement en écarter sa partie inférieure. Pour rendre cet écartement plus sensible, il faut pousser les mains fortement contre le dos. En observant cette dernière circonstance, que j'expliquerai dans la suite, il est facile à chacun, principalement à ceux qui sont maigres, de faire le même tour, mais non pas dans le même degré que le *Vénitien*.

Le second tour de cet homme ou son adreſſe d'approcher ſes omoplates, & de tenir fortement entre elles différentes choſes, me parût d'abord plus difficile à comprendre que le premier. On dit communément que les omoplates ſont tirées vers l'épine du dos par les muſcles nommés *Rhomboïdes*, & par une portion du Trapeze: mais il eſt aſſés évident qu'ils ne peuvent pas ſe raccourcir juſqu'à joindre tout-à-fait les omoplates, & que ſ'ils le pouvoient, ils empêcheroient les omoplates d'embraffer. Avant l'examen particulier de ce tour, je croyois en avoir trouvé tout l'artifice dans les ſeuils muſcles appellés *grands Dorsaux*, & je penſois que les bras étant tirés en arrière par la portion ſupérieure de ces muſcles, pourroient pouſſer les omoplates vers l'épine du dos. Mais en regardant de près, je fus auſſi ſurpris que dans l'examen du premier tour, de n'y ſentir preſque aucun effort, & de voir encore le Muſcle Biceps employé & être extraordinairement gonflé. Je compris bien-tôt par-là que la mécanique de ce ſecond tour étoit preſque la même que celle du premier, & que le Muſcle Biceps étoit encore ici le principal acteur ou moteur, mais par une direction différente. Car l'oſ du bras étoit ici tourné de manière que le Biceps étoit ſitué dans un ſens preſque oppoſé à celui qu'il avoit dans le premier tour; les coudes étoient preſque tournés l'un vers l'autre; les bras étoient très-étendus & les mains jointes. Dans cette attitude les deux Biceps ſe mettant en contraction, & étant fixés par leurs extrémités inférieures, meuvent encore les omoplates ſur leur

leur articulation en manière de levier de la première espèce, mais autrement que dans le premier tour, car ils tirent l'apophyse coracoïde & la partie supérieure du col de chaque omoplate directement en dehors, & par-là, poussent leurs bases vers l'épine du dos, & les approchent. Pour serrer fortement les omoplates ainsi jointes, il faut que les bras soient fermement étendus, les mains jointes & les coudes en même temps contournés vers l'épine du dos avec effort, comme je l'expliquerai plus en détail dans la suite de ce Memoire. Le Muscle Coraco-Brachial y contribué aussi.

Le mouvement d'estrapade n'est pas si difficile à expliquer qu'il est à imiter. Le plus rude & le seul extraordinaire de ce tour est de lever les bras derrière le dos, & de les hausser tout de suite pour les faire passer au dessus de la tête sans dégager les mains liées. Tout le reste est très-ordinaire, & on comprend facilement que pour passer les mains liées par dessous les pieds, il ne faut que pouvoir bien plier une jambe, & se tenir en même temps ferme sur l'autre. En faisant cette espèce d'estrapade à contre-sens, la grande difficulté se rencontre au même point, savoir quand il faut renverser les bras de devant en arrière par dessus la tête, les mains liées ensemble. Ainsi de tout le cercle que les bras décrivent par ce mouvement, c'est environ le tiers qui renferme toute la difficulté, & qui est compris en arrière entre le dos & la tête.

Avant que d'expliquer ce mouvement, il faut faire souvenir que l'articulation de l'os

du bras avec l'omoplate est sphéroïde & semblable à ce que les faiseurs d'instrumens de mathématique appellent *genou*; que la tête hémisphérique de l'os du bras est posée obliquement, & qu'elle est tournée un peu de dedans en arrière, & non pas directement vers les côtes, comme les figures ordinaires du squelette le représentent. Elle est ainsi tournée pour répondre à la cavité articulaire de l'omoplate qui est située à proportion. Il faut encore avant que d'expliquer ce tour, faire disparaître une difficulté très-chimérique, qui néanmoins est ici la plus éblouissante, & cache, pour ainsi dire, celle qui mérite plus d'attention. Car en regardant ce tour, on est d'abord porté à croire que le mouvement des bras autour du centre de leur articulation avec les omoplates n'est que simple, uniforme & à peu-près semblable à celui des rayons de roue autour de l'essieu. Mais pour peu que l'on y fasse attention, sans même savoir l'Anatomie, on voit bien que l'on ne pourroit faire ce mouvement uniforme sans tordre & déchirer les parties molles qui lient & soutiennent l'articulation. De plus il n'y a point d'organe pour accomplir un tel mouvement, quand même il seroit possible. Ainsi il ne faut pas encore le confondre avec celui d'une estrapade réelle qui dérange l'articulation & blesse considérablement les parties qui l'environnent. Une vraie connoissance de la structure & de la mécanique de cette articulation & de ces parties dissipe entièrement la fausse apparence que la vitesse du mouvement favorise, & elle découvre ce qui s'y passe réellement,

ment , de la manière suivante.

L'un & l'autre bras n'a qu'un simple mouvement de rayon dans les trois quarts plus ou moins du cercle de ce tournoyement autour du centre de l'articulation, comme il est facile à chacun de voir, en portant le bras directement, successivement & lentement en haut, en devant, en bas & en arrière. Mais dans l'espace ou dans le tiers de cercle de la circonvolution qui reste à faire de derrière en haut, ce mouvement devient composé & comme triple. La colonne de l'os du bras, en parcourant cet espace en ce tiers de cercle, fait en même temps deux petits mouvemens differents autour de son axe; car étant parvenuë de devant par enbas en arrière par un simple mouvement de rayon de rouë, elle commence là à se tourner peu-à-peu en manière de pivot autour de son axe jusqu'à un certain degré où elle fait encore un petit tour de pivot à contre-sens pour revenir au simple mouvement de rayon. Ceux qui se laissent facilement emporter & éblouir par une seule nouveauté vraie ou fausse, ne songeroient pas à ces deux petits tours essentiels que la vitesse du mouvement dérobe à la vûë, & ils forgeroient là-dessus un système très specieux, quoi-que faux.

Après avoir découvert cette difficulté apparente, celle qu'on peut regarder comme réelle est le grand renversement des bras derrière les épaules & la tête. Un peu d'attention à ce que je vais dire, en facilitera l'explication. On fait que plusieurs

110 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
mouvemens du bras ne se font pas tant par son articulation avec l'omoplate que par les différentes attitudes changeantes de l'omoplate qui les favorisent. Cela est assés évident par l'inspection des épaules de ceux qui sont maigres pendant qu'ils font différents tours de bras. Une longue habitude rend les articulations plus aisées, les ligamens plus souples & les muscles plus agissans, comme quantité d'exemples ordinaires le prouvent assés, sans parler des habitudes forcées. Par dessus tout cela, le *Vénitien* ayant l'avantage de pouvoir reculer ses omoplates très-considérablement, il a aussi plus de facilité à renverser ses bras. Il paroît même qu'il ne recule pas les deux épaules dans le même temps, mais l'une après l'autre, pour ne pas les froisser ou blesser par leur rencontre. Il faut encore observer qu'il fait plusieurs mouvemens préparatifs avant que d'en venir à celui d'estrapade, pour rendre les muscles & les ligamens souples, & pour exprimer une quantité suffisante de la lymphe mucilagineuse qui arrose ces articulations, & les rend plus glissantes.

Le mouvement de moulinet dépend de la même mécanique que celui d'estrapade, mais il est plus aisé quand il est une fois en train, parce qu'il se fait par un seul bras & tout de suite sans obstacle. Ce mouvement paroît aussi en quelque manière dans ceux qui tournent la fronde.


Je remets à la suite de ce Memoire
l'ex-

Fig. 2.



Fig. 4.





DES SCIENCES. 1723. III

l'explication de plusieurs autres phenomenes par rapport aux Muscles coadjuteurs des mouvemens qui ont paru dans ces tours du *Venitien*. J'y joindrai mes Remarques sur l'utilité qui en resulte, avec la découverte de la nouvelle espece de Muscles que j'ai annoncée dans le titre.



P R O-

PROPOSITION ELEMENTAIRE

SUR

LES TRIANGLES.

Par M. DE BEAUFORT.

* THEOREME.

En tout Triangle la somme des quarrés de deux côtés est égale à deux fois la somme des quarrés de la moitié du troisième côté, & de la ligne menée du milieu de ce côté à l'angle opposé.

DEMONSTRATION.

§. Soit le Triangle ABC , dans lequel la ligne AD est menée de l'angle A au milieu D du côté BC : je dis que la somme des quarrés de AB & AC est double de la somme des quarrés de AD & CD .

Je distingue dans cette proposition trois cas que je vais démontrer.

‡ Le premier est, lorsque le côté AB est égal à la ligne AD .

Le

* 24 Avril. 1723.

† Fig. 4.

‡ Fig. 2.

* Le second, quand ce côté est plus grand.

† Le troisiéme, quand il est plus petit.

* Fig. 3. † Fig. 4.

PREPARATION.

Ayant du centre A & du rayon AD décrit dans tous les cas le cercle $DEHG$, & prolongé CA en G , & BA en H .

* On aura pour le premier cas $\overline{AB} + \overline{AC}$

$$= \overline{AB} + \overline{AE} + \overline{EC} + 2\overline{AE} \times \overline{EC}$$

$$= 2\overline{AD} + \overline{EC} \times \overline{CG} = 2\overline{AD} + \overline{DC} \times \overline{CB}$$

$$= 2\overline{AD} + 2\overline{DC}.$$

† On trouvera pour le second cas $\overline{AB}$

$$+ \overline{AC} = \overline{AF} + \overline{FB} + 2\overline{AF} \times \overline{FB} + \overline{AE}$$

$$+ \overline{EC} \times 2\overline{AE} + \overline{EC} = 2\overline{AD} + \overline{DB}$$

$$\times \overline{BK} + \overline{DC} \times \overline{CK} = 2\overline{AD} + \overline{DC} \times \overline{CB}$$

$$= 2\overline{AD} + 2\overline{DC}.$$

‡ Dans le troisiéme cas, on voit aussi que

$$\overline{AB} + \overline{AC} = \overline{AE} + \overline{EC} + 2\overline{AE} \times \overline{EC}$$

$$+ \overline{AF} - \overline{BF} \times 2\overline{AF} - \overline{FB} = 2\overline{AD}$$

$$+ \overline{DC} \times \overline{KC} - \overline{DB} \times \overline{KB} = 2\overline{AD} + \overline{DC}$$

$$\times \overline{CB}$$

* Fig. 2. † Fig. 3. ‡ Fig. 4.

$\times CB = 2\overline{AD}^2 + 2\overline{DC}^2$. *Ce qu'il falloit démontrer.*

R E M A R Q U E.

§ Lorsque le côté AB est égal au côté AC , la ligne AD est perpendiculaire au côté BC , & la démonstration qui se trouve la même en devient plus aisée, & fournit un moyen facile de prouver la propriété du Triangle rectangle, comme on le voit dans le corollaire suivant.

C O R O L L A I R E.

§ Dans le Triangle isocelle ABC on a $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2\overline{AD}^2 + 2\overline{DC}^2$, donc dans le Triangle ADC rectangle $\overline{AC}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{DC}^2$. On prouvera la même chose en menant DE qui coupe AC en deux également, ce qui donnera selon le Theoreme $\overline{AD}^2 + \overline{DC}^2 = 2\overline{DE}^2 + 2\overline{CE}^2 = 4\overline{CE}^2 = \overline{AC}^2$. *Ce qu'il falloit démontrer.*

R E M A R Q U E.

J'ai évité de me servir dans cette démonstration de la propriété du Triangle rectangle que je voulois déduire de la propriété generale que je viens de prouver dans tous les Triangles. Voici

§ Fig. 5.

§ Fig. 6.

Voici encore un corollaire qui se tire du Theoreme, & que je mets ici par l'utilité dont il peut être. M. de Lagny s'en est servi pour trouver l'angle que font les asymptotes de l'hyperbole qui donne les Logarithmes ordinaires. On en peut voir la démonstration qu'il a donnée page 413. des Memoires de l'Academie de l'année 1706.

COROLLAIRE.

La somme des quarrés des côtés d'un parallelogramme est égale à la somme des quarrés des diagonales.

Dans le parallelogramme $ABCD$, * on voit que $\overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 = 2\overline{AE}^2 + 2\overline{BE}^2$, & $\overline{BC}^2 + \overline{CD}^2 = 2\overline{CE}^2 + 2\overline{BE}^2$. Donc $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + \overline{CD}^2 + \overline{AD}^2 = \overline{BD}^2 + \overline{AC}^2$,
Ce qu'il falloit démontrer.

* Fig. 7.






EX-


EXPERIENCES

Qui montrent avec quelle facilité le FER & l'ACIER s'aimantent, même sans toucher l'AIMANT.

Par M. DE REAUMUR.

* CEUX qui ont le plus travaillé sur l'Aimant, regardent le Fer comme une espece d'Aimant imparfait. Il tient à bien peu qu'il n'en ait les propriétés, puisqu'un simple & presque instantané contact de cette pierre les lui communique : il les acquiert même seul sans toucher l'Aimant. Les fameuses Croix des Clochers d'*Aix* & de *Chartres* ont allés appris qu'exposé à l'air pendant une longue suite d'années, il semble se convertir en véritable Aimant. Mais il ne lui faut pas un temps considerable pour en prendre plus foiblement les vertus ; une barre de Fer posée verticalement a bien-tôt deux poles comme l'Aimant, dont l'un attire une des pointes de l'Aiguille aimantée, & dont l'autre repousse la même pointe ; on fait qu'on peut trouver dans chaque cheminée de quoi faire cette experience ; les pinces y sont propres, pourvu qu'on ait l'attention de ne les pas renverser de haut embas.





bas. M. *Robault* rapporte qu'ayant fait rougir un morceau d'Acier long & délié, & l'ayant ensuite trempé en le tenant perpendiculaire à l'horison, il a trouvé à chacun de ses bouts la vertu d'un des poles de l'Aimant, jointe à celle d'attirer assés bien la limaille de Fer.

Le Fer & l'Acier sont ici pour nous la même chose. Il y a une façon dont ils s'aimantent beaucoup plus sûre & plus commune que la précédente, & cependant plus connue des ouvriers en Fer que des Physiciens. Dans les boutiques des Serruriers, des Couveliers, des Taillandiers, on ne voit qu'outils aimantés; presque tous ceux dont ces Ouvriers se servent pour couper ou percer le Fer à froid, comme ciseaux, forets, poinçons, se chargent de limaille de Fer dès qu'on les en approche; il y en a même qui enlèvent aussi-bien de petits clouds qu'ils le feroient si on les eût fait toucher par un Aimant mediocre; les limes même se trouvent souvent aimantées: en un mot, cela est propre à tous les ouvrages qui entament le Fer.

Quelque commune que soit cette manière dont l'Acier s'aimante, je ne sache point que les Physiciens l'aient encore examinée. En general on étudie trop la Physique dans son cabinet. Elle m'a paru meriter attention, & m'a insensiblement engagé à faire diverses expériences que je rapporterai dans ce Memoire. Tout ce qui a rapport aux propriétés de l'Aimant, nous offre des faits surprenants; mais le nombre de tant de faits connus ne doit pas nous faire negliger ceux qui se pre-

sen-

118 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
sentent de nouveau. Plus nous en rassem-
blerons, & plus nous serons en état de ren-
dre raison de ceux que nous savions déjà, ou
de juger si les explications que nous en don-
nions sont les veritables.

J'ai commencé par examiner si les outils
dont je viens de parler, tiennent leur pro-
priété d'attirer le Fer du Fer même qu'ils ont
coupé ou percé, ou s'ils ne la doivent point
à la trempe. J'en ai fait forger de différen-
tes espèces & de différentes grandeurs en cha-
que espèce; je les ai fait tremper, & j'ai essa-
yé si immédiatement après la trempe ils é-
toient en état d'attirer la limaille. Je n'en
ai trouvé aucun à qui elle eût donné cette
propriété, au moins sensiblement; à peine en
ai-je vû qui enlevassent un grain de limaille
ou deux, & peut-être eussent-ils fait davan-
tage avant d'être trempés.

L'expérience de M. *Robault* déjà citée,
m'a même engagé de repeter celles-ci plu-
sieurs fois, & cela, parce qu'outre les poles
qu'il a reconnus à la verge d'Acier qu'il a
trempée verticalement, il lui a trouvé la ver-
tu d'attirer une quantité de limaille de Fer
assés considerable. J'ai pourtant eu beau
tremper l'Acier dans les circonstances qu'il
décrit, je n'ai jamais vû que la trempe lui
ait donné aucune vertu d'attirer sensiblement.
Je ne doute pas néanmoins que le morceau
d'Acier dont il a parlé, n'eût la propriété
qu'il lui a attribuée, mais apparemment que ce
n'étoit pas de la trempe qu'il la tenoit. Nous
verrons dans la suite bien des circonstances
qui auroient pû la lui donner, auxquelles
apparemment M. *Robault* n'aura pas pris garde.

Il est donc sûr que les outils d'Acier qui viennent d'être trempés, n'ont nullement la vertu d'attirer le Fer, mais il ne faut qu'un instant pour la leur donner. Qu'on prenne un ciseau ou un poinçon au sortir de la trempe, qu'on pose le taillant de l'un ou la pointe de l'autre sur un morceau de Fer, n'importe sous quelle inclinaison, & qu'on donne ensuite un coup de marteau sur l'autre bout de l'outil, en voilà assés, on a aimanté sa pointe ou son taillant; qu'on presente cette pointe ou ce taillant à de la limaille, elle l'attirera, elle s'en herissera. Il a suffi à l'outil de couper le Fer pour prendre la vertu de l'attirer. Après le premier coup de marteau, cette vertu est encore foible; on l'augmente si on applique une seconde fois la pointe de l'outil sur un morceau de Fer, & qu'on frappe sur l'autre bout une seconde fois. Cette operation simple, répétée un nombre de fois, ajoutera toujours à la nouvelle force attractive; mais il y a un terme par de-là lequel on repeteroit inutilement l'operation, la vertu de l'outil n'y gagneroit plus rien. Ceux dont on s'est servi pendant plusieurs mois ne sont pas plus forts que ceux dont on ne s'est servi que pendant un jour, & même que ceux dont on ne s'est servi que pendant quelques quarts d'heure.

Il y a pourtant diverses circonstances qui contribuent à augmenter cette force; mais avant de les rapporter, cherchons quelle est la cause de cet effet singulier; pourquoi un morceau de Fer, qui n'a sensiblement aucune des propriétés de l'Aimant, aimante néanmoins

120 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
moins l'Acier par qui il est percé ou coupé,
aussi-bien que le pourroit faire un Aimant
foible? Les expériences qui me restent à rap-
porter, seront peut-être plus naturellement
placées à la suite des conjectures que j'ai à
proposer sur la cause de cet effet, elles pour-
ront servir à les appuyer.

Je suppose qu'on ne sauroit douter que la
vertu attractive de l'Aimant ou du Fer ai-
manté ne dépende de la matière magnetique
qui circule dans l'Aimant & autour de l'Ai-
mant, & de même dans le Fer & autour du
Fer aimanté. Ceux qui raisonnent sur des
idées claires, ne me le contesteront pas. Au
reste je ne m'embarasse à present ni de la fi-
gure de cette matière, ni d'examiner si elle
entre par un des poles, & sort par l'autre,
ou si elle entre par l'un & par l'autre, ni
comment cette matiere attire, si c'est en
chassant le fluide qui est entre le Fer & l'Ai-
mant, ou simplement en poussant le Fer.
Toutes ces questions regardent un Traité
general de l'Aimant, que je n'ai ici en vûë
en aucune sorte. Il suffit qu'on m'accorde
que la vertu attractive de l'Aimant est l'effet
des tourbillons de matière magnetique qui
circulent dedans & autour de cette pierre;
que le Fer quand il s'aimante, acquiert de
pareils tourbillons; & que de-là il suit que,
toutes choses d'ailleurs égales, plus la quan-
tité de matière qui compose un tourbillon
devient grande, & plus la vertu attractive de-
vient forte.

Je fais encore une autre supposition, qui
ne m'est pas moins necessaire que la préce-
dente. Je demande à present qu'on me l'ac-
corde ;

corde; peut-être ferai-je voir qu'on ne m'aura rien accordé de trop, que je pouvois même demander davantage. Cette seconde supposition est que le Fer dans lequel les propriétés de l'Aimant ne se manifestent point, est cependant actuellement rempli de matière magnetique qui y circule, & qui peut être y est en quelque sorte emprisonnée; je veux dire que dans l'interieur de tout Fer il y a actuellement de la matière magnetique qui y forme une infinité de petits tourbillons differents qui ont chacun leurs poles particuliers, & que la plupart des passages, par où cette matière pourroit s'échaper, sont peut-être bouchés.

Cette seconde supposition admise, rien n'est plus aisé que de comprendre comment un outil d'Acier s'aimante, lorsqu'il perce un morceau de Fer. Dans l'instant que le coup de marteau tombe sur l'outil, la pointe de cet outil presse les parties de Fer, elle les sépare les unes des autres, & continuë de presser les parties séparées; les tourbillons qui se trouvoient dans le chemin qui a été ouvert, sont donc dérangés; ceux même qui se trouvoient entre les parties du Fer qui se sont rapprochées sont alors trop comprimés: la matière de ces tourbillons est donc forcée de prendre d'autres directions; savoir, celles où elle trouve moins de resistance; & ce sont sans doute celles qui la conduisent à enfler l'outil d'Acier; ses parties plus dures, plus roides que celles du Fer, n'ont point, ou ont été très-peu comprimées, pendant que les autres l'ont été considérablement. Qu'on se souviene aussi que nous avons

122 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
démontré ailleurs que les parties de l'Acier trempé sont plus écartées les unes des autres que celles de l'Acier non trempé. La matière magnetique a donc plus de facilité à entrer dans l'Acier qu'à continuer à circuler dans le Fer, ou peut-être même se trouveoit elle déjà genée à décrire de trop petits tourbillons; elle s'y ouvre de nouveaux passages, ou aggrandit ceux qui y étoient déjà; & toute cette matière tendant à prendre la même route, l'Acier se trouve dans le même cas où il seroit, si on l'eût appliqué contre un des poles d'un Aimant foible.

Si on repete l'operation, on augmente la vertu attractive de l'outil; de nouvelle matière sera forcée à le penetrer; elle s'ouvrira de nouveaux chemins, ou elle aggrandira ceux qui étoient ouverts; la circulation de la matière magnetique se fera plus librement, ou, ce qui est la même chose, plus abondamment dans l'Acier, par conséquent sa vertu d'attirer sera augmentée. Mais après qu'on aura repeté cette operation un certain nombre de fois, on ne doit plus trouver d'accroissement dans la force attractive de l'Acier. La pointe a beau percer de nouveau Fer, elle a beau rompre de nouveaux tourbillons, forcer de nouvelle matière magnetique à sortir, cette matière trouve assés de passages tout formés dans l'Acier, sans avoir besoin de s'en faire de nouveaux: elle a plus de facilité à suivre les premiers qu'à s'en ouvrir d'autres.

Ces faits, ce me semble, se déduisent très-naturellement de nôtre seconde supposition; si on avoit cependant quelque peine à admettre.

tre, que la pression, que souffrent les parties voisines de l'outil qui coupe ou perce le Fer, suffit pour déranger les tourbillons que nous avons supposé entre ses parties, cette difficulté pourroit être levée par une expérience déjà connuë, & que j'ai répétée bien des fois. L'existence des tourbillons magnetiques est incontestable dans l'Acier aimanté; qu'on donne quatre à cinq coups de marteau, même assés légers, sur l'Acier qui s'est aimanté en coupant le Fer, ou en touchant quelque Aimant foible, on lui ôte toute, ou presque toute sa vertu attractive: ces coups ont donc la force de détruire les tourbillons de matière magnetique, quoiqu'ils pressent peut-être beaucoup moins les parties du Fer sur lesquelles ils tombent, que le ciseau ne presse les parties qui s'opposent à son action.

Mais la supposition que nous avons faite des tourbillons de matière magnetique emprisonnée en quelque sorte dans le Fer même, paroîtra peut-être une difficulté considerable contre nôtre explication. Ce métal ne semble pas propre à s'opposer au cours de la matière magnetique; cette matière qui le penetre si aisément, peut-elle y être en quelque sorte emprisonnée? Il est vrai que des torrents de matière magnetique, tels qu'en fournit l'Aimant, peuvent sur le champ s'ouvrir des passages dans le Fer, mais lorsque cette matière coule moins rapidement, ce n'est qu'à la longue qu'elle aimante du Fer au point nécessaire, pour le mettre en état d'attirer d'autre Fer. Les obstacles qui sont forcés par des torrents, résistent à des rui-

seaux ; les parties du Fer opposent des résistances au passage de la matière magnetique, qui ne peuvent être vaincues qu'après un temps considérable, lorsque les courants de cette matière sont foibles. Ce que nous disons de la matière qui tend à entrer dans le Fer ; nous le pouvons dire de celle qui tend à en sortir ; le Fer aimanté perd sa vertu attractive d'une infinité de manières différentes. Quand il la perd, les passages qui donnoient entrée à la matière, se bouchent ; ces passages attendent-ils à se boucher, que toute la matière qu'il contenoit fût sortie ? La sortie n'est-elle pas fermée à celle-ci, quand l'entrée est fermée à l'autre ? Les coups de marteau, par exemple, qui sur le champ font perdre au Fer la vertu d'attirer, étrecissent ou bouchent sur le champ les ouvertures par où cette matière magnetique couloit librement.

Enfin quoi-qu'il puisse se faire que de petits tourbillons, des tourbillons foibles de matière magnetique se trouvent renfermés dans le Fer, on regardera sans doute l'existence de ces tourbillons comme prise gratuitement, & seulement en faveur du phenomene que nous avons voulu expliquer. Dès qu'elle y satisfait, & qu'il n'y a nul inconvenient à l'admettre, c'en seroit assés en bonne Physique pour la recevoir ; mais les experiences que nous rapporterons dans la suite, concourront à bien établir l'existence de ces petits tourbillons. Pour expliquer même dès-à-present l'idée que ces experiences m'ont donnée du Fer, je dirai que je le regarde comme un Aimant imparfait, & cela, non seulement parce qu'il a de la disposition à prendre

dre les propriétés de l'Aimant, mais je le regarde principalement comme tel, en ce qu'il est continuellement pénétré d'une grande quantité de matière magnetique. Peut-être en a-t-il moins que l'Aimant, c'est ce que j'ignore; mais je crois qu'il en a une quantité très-considérable. Je ne veux pas seulement parler des petits tourbillons de matière magnetique que j'ai supposé circuler dans l'intérieur du Fer, je lui en crois d'autres qui entrent continuellement dans sa substance, qui ensuite en sortent; en un mot, je lui crois, comme à l'Aimant, un atmosphere, mais moins étendu. Si on me demande pourquoi le Fer, avec cette abondance de matière magnetique, ne produit pas les effets de l'Aimant? C'est qu'il manque de poles aussi-bien déterminés que ceux de l'Aimant. C'est de ces poles que l'Aimant tire sa force, c'est par eux que passe la plus grande partie de la matière qui y circule; il ne peut presque rien vers son Equateur pendant que ses poles soutiennent des poids considérables. Un Aimant dont les poles seroient mieux marqués que ceux d'un autre, aura plus de force, quoi-que la même quantité de matière magnetique circule dans l'un & dans l'autre. Si donc on conçoit que le Fer est, pour ainsi dire, un Aimant brouillé, un assemblage d'une infinité de petits Aimants, qu'il ressemble à une masse de poudre d'Aimant; en un mot, que le Fer a presque par tout des poles insensibles, il sera aisé de concevoir que quoi-qu'il se fasse autour de ce métal & dans son intérieur une grande circulation de matière magnetique,

qu'il n'en doit pas avoir plus de force attractive, parce que les tourbillons, les courants ne concourent pas vers le même endroit.

Je fis, sans le chercher, l'expérience qui m'a donné cette idée du Fer. Pendant que j'éprouvois jusques à quel point on pouvoit aimer des outils d'Acier, en leur faisant couper ou percer ce métal, j'étois proche d'une enclume, sur laquelle je posois les petits morceaux de Fer, avec lesquels j'essayais la force de mes Aciers aimantés. Je mis sur ma main un des morceaux de Fer qui venoit d'être attiré, étant sur l'enclume; l'Acier aimanté n'eut plus la force d'enlever ce Fer, lorsqu'il fut sur ma main; il ne pût même se charger d'un morceau beaucoup plus léger. Je posai les morceaux que je voulois faire attirer sur d'autres corps, comme sur du bois, sur du papier, l'outil n'eut pas plus de prise sur eux que lorsqu'ils étoient dans ma main: mais aussi-tôt qu'ils eurent été remis sur l'enclume, l'Acier enleva le plus gros des morceaux avec autant de facilité qu'il avoit auparavant. La même expérience répétée & variée ensuite de diverses façons, m'a donc fait voir que l'Acier aimanté avoit plus de force pour attirer le Fer posé sur d'autre Fer, que pour attirer le même Fer, lorsqu'il est posé sur tout autre corps. J'ai trouvé même que cette différence de force alloit quelquefois si loin, que la force étoit triple ou quadruple dans les circonstances avantageuses de ce qu'elle étoit dans les autres.

J'ai en même temps fait une autre remar-

marque sur ces experiences, qui me paroît également digne d'attention; c'est que l'Acier aimanté non seulement attire plus pesant, lorsque le Fer qu'on lui donne à attirer est posé sur du Fer, mais que sa vigueur encore est d'autant plus augmentée, que la piece de Fer qui sert de support à celui que l'on veut qui soit attiré est plus grosse. Ce que l'Acier aimanté a enlevé de dessus une enclume, il ne l'enleve pas de dessus une barre de Fer qui est plate. De déterminer en quelle proportion cette force diminue par rapport à l'épaisseur du support, c'est ce que je n'ai pas fait, & qui n'est peut-être pas aisé à faire d'une manière bien certaine; mais j'ai vu souvent que le Fer qui étoit enlevé de dessus l'enclume, pesoit plus du double de celui qui étoit enlevé de dessus une barre ordinaire.

Ces experiences nous découvrent clairement une circulation de matière magnetique qui se fait autour du Fer; elles forcent à reconnoître que ce métal a comme l'Aimant un atmosphere; car sans ces tourbillons, sans cet atmosphere, il ne paroît pas qu'on puisse rendre de raison probable de l'augmentation de force qui survient au Fer aimanté, & ces tourbillons, cet atmosphere étant accordés au Fer, non seulement ce phenomene s'en déduit naturellement, il s'en déduit même necessairement. Pour en être convaincu, il ne faut que se rappeler une experience connue depuis long temps; savoir, que si on éprouve ce que peut porter un morceau de Fer ou d'Acier aimanté, & qu'ensuite on l'approche d'un Aimant, jus-

qu'à faire entrer au moins un de ses bouts dans l'atmosphère de cet Aimant, si on essaye alors sa force, on la trouvera beaucoup plus considérable qu'elle n'étoit auparavant, il soutiendra un poids plus pesant: mais pour peu qu'on le retire de cet atmosphère, il ne lui restera plus que sa première force; le poids dont il s'étoit chargé sera trop lourd, il le laissera tomber. De même un Aimant foible mis dans le tourbillon d'un Aimant plus fort, y acquiert de la force qu'il ne conserve qu'autant qu'il reste dans cet atmosphère; c'est même une des singularités de l'Aimant que M. *Descartes* a expliquées.

La cause de ces derniers effets n'est point équivoque, on ne peut absolument l'attribuer qu'à la matière magnetique qui circule autour de l'Aimant; une partie de cette matière se détourne, elle prend sa route vers le Fer aimanté, ou vers l'Aimant le plus foible; plus de matière magnetique les penetre alors, ou, ce qui est la même chose, leur force attractive est augmentée.

L'augmentation de force qui se fait dans le Fer ou l'Acier aimanté, lorsque le Fer qu'on lui veut faire attirer est posé lui-même sur d'autre Fer, ne paroît être qu'un cas de l'expérience précédente. Si l'Acier devient plus fort, c'est que la quantité de la matière magnetique qui circule autour de lui est augmentée. Or d'où vient cette nouvelle matière? qui la fournit? C'est sans doute le Fer qui sert de support. On en doit donc conclure que ce Fer a comme l'Aimant un atmosphère de matière magnetique.

Une

Une circonstance de cette expérience, dont nous n'avons pas encore parlé, contribue à établir cet atmosphere. C'est que si on éloigne un peu de l'enclume le Fer aimanté qui s'y est chargé de ce qu'il pouvoit porter, aussi-tôt il devient trop foible, il laisse tomber son fardeau. La parité alors est entiere entre cet Acier & celui qu'on éloigne du tourbillon d'un Aimant où on l'avoit placé. Qu'on ne croye pas que le mouvement qu'on donne à cet Acier, en l'élevant, contribue à lui faire abandonner ce poids; si on l'agite même beaucoup davantage, en le transportant à fleur de l'enclume, il le conservera toujours.

Si l'Acier ou le Fer aimanté porte beaucoup plus pesant, quand il est proche d'une grosse masse de Fer, que quand il est auprès d'une baire; c'est donc que la grosse masse a un atmosphere qui fournit davantage de matière magnetique.

Dès qu'il sera établi qu'il se fait autour de tout Fer & dedans tout Fer une circulation de matière magnetique, mais que cette matière est partagée en une infinité de petits tourbillons qui ont des poles differents, il paroîtra moins merueilleux que l'attouchement presque instantanée d'une Pierre d'Aimant mette le Fer en état d'attirer d'autre Fer. Les torrens qui sortent de la Pierre ouvrent des routes dans une certaine direction, qui est celle du cours de ces torrens, & ces routes une fois ouvertes, la matière même qui circuloit autour du Fer, les ensuit. Il avoit de son propre fonds allés de cette matière, il n'étoit question que de la

réunir, que de la diriger, que de la mettre en état de concourir à produire le même effet.

Mais ce sont les seuls tourbillons de matière magnetique renfermés dans l'interieur du Fer que nous avons fait agir sur les outils d'Acier qui percent ou coupent le metal. Nous avons dit que la violence qu'on leur fait, que la force qui les comprime, les contraint à prendre d'autres directions, & que la plus commode, la plus facile, celle qui offre, pour ainsi dire, une pente plus naturelle, est au travers de l'Acier qui n'a point été comprimé comme le Fer. En raisonnant sur cette explication, il m'a paru que si elle étoit juste, nous devions avoir encore un moyen d'aimer le Fer ou l'Acier sans lui faire toucher l'Aimant, ni couper d'autre Fer. Puisqu'elle suppose le Fer pénétré de tourbillons de matière magnetique qui peuvent être comprimés & forcés à prendre d'autres directions lorsqu'on les presse, il s'ensuit que si on fait violence aux tourbillons, qu'on les forcera à se réunir. Or dès qu'on pliera & repliera plusieurs fois un morceau de Fer dans le même endroit avant de l'y casser, on contraindra les tourbillons qui se trouveront en cet endroit à se réunir avec des tourbillons voisins, & par conséquent on donnera à ce même endroit une vertu attractive. Pour voir si l'expérience s'accommoderoit avec cette conséquence, j'ai pris un morceau de fenton de Fer de *Berry*, c'est-à-dire, de Fer très-doux, je l'ai serré dans un étau à quatre à cinq pouces d'un de ses bouts; prenant ensuite à deux mains le bout le plus long, qui étoit
au

au dessus de l'étau, je l'ai plié & replié différentes fois dans le même endroit, & enfin il s'y est cassé; mais comme il étoit très-doux, ce n'a été qu'après avoir bien eu la torture. Aussi tôt qu'il a été cassé, j'ai présenté la cassure de chaque bout à de la limaille de Fer, & j'ai vu avec plaisir qu'elles s'en sont entièrement couvertes: elles en eussent moins attiré si elles n'eussent touché qu'un Aimant foible.

Je ne m'en suis pas tenu à cette première expérience, j'ai eu même la devoir varier de bien des manières. J'ai fait des épreuves pareilles sur des barres très-grosses, & sur du fil de Fer assés fin, sur du Fer doux & sur du Fer cassant, sur de l'Acier trempé & sur de l'Acier non trempé. Voici ce que ces nouveaux essais m'ont appris de plus remarquable. Toutes choses d'ailleurs égales; plus le Fer qu'on a cassé est doux, plus il est fibreux, plus il s'est laissé tourmenter avant de se casser, & plus vigoureusement se trouve-t-il aimanté dans ces cassures. Les pressions réitérées plus de fois forcent une plus grande quantité de matière magnetique à prendre les mêmes routes; la matière en est, pour ainsi dire, mieux exprimée de certains endroits, elle est toute chassée vers d'autres. Le Fer à lames, le Fer cassant, s'aimante plus foiblement; mais l'Acier trempé s'aimante encore moins. Pour l'Acier non trempé, l'Acier recuit, il s'aimante plus ou moins, selon qu'il est plus ou moins doux. Enfin en general je n'ai point trouvé de Fer dont la cassure n'attirât au moins quelques grains de limaille, si on l'essaye dans l'in-

stant qu'elle vient d'être faite; j'ajoute cette dernière circonstance, parce que la vertu attractive s'affoiblit peu-à-peu, & quelquefois ne dure pas plus d'un jour.

Selon la grosseur, la figure, la longueur des morceaux de Fer, on trouve aussi différents degrés de force attractive dans les cassures. Cette vertu n'est presque pas sensible dans du fil de Fer de la grosseur des Aiguilles ordinaires à tricoter; elle n'augmente pas pourtant proportionnellement à la grosseur des barres; plus une barre est grosse, & moins elle se laisse plier de fois avant de se casser; du Fer en lame, & sur-tout du fil de Fer, appelé *fil de Fer à Chaudronnier*, choisi de la grosseur du petit doigt, sont les Fers qui donnent les cassures les mieux aimantées. Ce qui est sur-tout essentiel, c'est que le morceau de Fer qu'on casseait une certaine longueur, sans quoi on ne trouvera aucun effet sensible. Un exemple seul conduira sur cet article. Si on prend un fil de Fer à Chaudronnier long d'un pied, qu'on le casse à peu-près au milieu, les deux bouts formés par la cassure attireront bien la limaille. Si au contraire on casse un pareil fil de Fer à un pouce ou deux d'un de ses bouts, la cassure du petit morceau n'attirera point du tout la limaille, pendant que la partie du long bout qui tenoit à ce petit morceau attirera la limaille très-vivement.

Au reste il est à remarquer que ce n'est précisément que le bout fait par la cassure qui s'aimante, que l'autre n'est nullement aimanté. En suivant le même raisonnement qui m'avoit conduit à soupçonner que ce bout
cassé,

cassé, après avoir soutenu plusieurs tortures, auroit une vertu attractive, j'ai crû en devoir conclure qu'on pouvoit fortifier cette vertu, & cela en pliant & repliant le Fer en divers endroits, pris à diverses distances de ce bout; que c'étoit un moyen de forcer de nouvelle matière magnetique à se diriger vers ce bout. Pour m'assurer si les faits s'accommoderoient encore avec des consequences si necessaires de l'hypothese, que tout jusques ici a paru établir, j'ai choisi un fil de Fer, gros environ comme le petit doigt, & long de près de deux pieds & demi. Après l'avoir ferré dans l'étau, je l'ai plié & replié dans le même endroit à diverses reprises, & l'ai enfin cassé dans cet endroit, qui étoit éloigné d'à peu-près cinq pouces d'une des extremités du fil. Par cette division, j'ai donc eu deux brins de fil, l'un long d'environ cinq pouces, & l'autre d'environ deux pieds & un pouce. L'un & l'autre de ces brins s'étoient bien aimantés à leur cassure, aussi étoient-ils d'un Fer très-doux. Les bouts de chaque brin, qui avoient été faits par la cassure, enlevoient de dessus l'enclume un de ces petits clouds appelez *broquettes*, mais de la plus petite.

Le plus long des deux brins étoit celui que j'avois destiné pour suivre mon experience; je le ferrai dans l'étau environ un pouce & demi au dessus du bout aimanté; alors je le pliai & repliai proche de cet endroit plusieurs fois, mais sans le casser. Après l'avoir tiré de l'étau, j'essayai si la vertu attractive avoit été augmentée, & il me parut qu'elle l'étoit. Je repetai la même ma-

œuvre pour m'assurer de cette augmentation, & pour voir jusqu'où elle iroit, c'est-à-dire, que je ferrai le fil de Fer un peu au dessus de l'endroit où je l'avois tourmenté, & je continuai de même à le plier & replier en huit endroits differents, qui tous étoient entre le bout aimanté & le milieu du fil. Après les nouvelles tortures données à un nouvel endroit du Fer, j'éprouvois s'il s'étoit fait quelque augmentation dans la force attractive; il me parut qu'il n'y en avoit point eu qui n'y eût ajoûté: mais l'effet de toutes ces operations ensemble n'étoit pas équivoque, elles mirent le bout aimanté en état d'enlever quatre clouds, égaux chacun à celui qu'il portoit immédiatement après qu'il avoit été cassé.

Pour suivre cette experience, & pour voir jusqu'où pourroit aller cette augmentation de force, je continuai à plier & replier mon fil de Fer en differents endroits; je le pliai d'abord vers le milieu; ce fut ensuite entre le milieu & le bout non aimanté. Les effets qui arriverent alors, n'en paroîtront peut-être pas moins singuliers pour n'avoir pas été de ceux que j'avois prévu. Les nouvelles tortures que je donnai à mon fil, ne fortifierent point le bout aimanté; il me sembla même qu'elles l'avoient affoibli, & l'operation repetée un peu plus loin m'en convainquit; je ne pûs plus douter que le bout aimanté ne se fût affoibli. J'essayai aussi-tôt si le second bout n'avoit point gagné ce que le premier avoit perdu, & je trouvai effectivement que ce second bout commençoit à enlever la limaille, ce qu'il n'avoit fait en aucune

cune façon pendant que le premier étoit dans toute sa vigueur. Je continuai à tourner mon Fer en differents endroits, dont le dernier étoit toujours le plus proche du second bout, & je vis qu'à mesure que je multipliois ces operations, que sa force attractive augmentoit aux dépens de celle du premier bout. Il en acquit assés pour enlever les quatre clouds, & à peine en resta-t-il à l'autre suffisamment pour se charger de quelques grains de limaille.

Cette experience nous apprend une nouvelle manière d'aimer le Fer, au moins aussi singulière que les précédentes, & même de l'aimer mieux, pourvu que ce Fer soit liant, & qu'il soit sous une forme qui permette de le plier avec quelque facilité. Il n'en est point qui y soit plus propre que celle du fil de Fer. Mais la même experience fait voir que pour le bien aimer, il faut que toutes les inflexions qu'on lui donne se trouvent plus proches d'un de ses bouts que de l'autre. Il n'est pas trop aisé d'expliquer pourquoi, lorsque ces inflexions s'éloignent du milieu, elles déterminent la matière magnetique à prendre plutôt sa route vers le bout le plus proche que vers celui qui est déjà aimanté; vers le côté aimanté elle semble devoir trouver des chemins tous ouverts, mais plus longs. Est-ce que la longueur du chemin est pour elle une plus grande résistance à vaincre que celle qu'elle trouve à s'ouvrir de nouveaux chemins? Il s'en suivroit de-là que la matière magnetique a continuellement des obstacles à surmonter pendant qu'elle se meut dans le Fer. Si on

sup-

suppose, avec la plûpart des Physiciens, que les canaux par où elle coule sont herissés de poils; que la force nécessaire pour se faire passage a été celle qu'il lui a fallu employer pour les coucher; la force dont elle a besoin pendant sa circulation est celle qui est nécessaire pour tenir ces mêmes poils couchés; ils sont sans doute de même nature que le Fer dont ils font partie, ou dont ils ne font que des parties plus fines; ils ont par conséquent du ressort, & ce ressort tend à leur faire reprendre des positions différentes de celles où la matière magnetique les a mises. Dès que la matière magnetique s'est ouverte passage vers le second bout du fil de Fer, ce passage peut suffire, & pour cette matière & pour une partie de celle qui passoit par l'autre bout. Dans le Fer aimanté les passages les derniers ouverts sont toujours les plus libres. La preuve en est que peu à peu ces passages se ferment à la matière magnetique, puisqu'une force d'attirer très-sensible, ou, ce qui est la même chose, une circulation sensible est quelquefois détruite en moins de vingt-quatre heures, comme nous l'avons dit ci-dessus.

J'ai voulu voir ce qui arriveroit à un fil de Fer qu'on tourmenteroit d'abord par son milieu, & ensuite à des distances égales de part & d'autre de ce milieu. Les plis & replis faits au milieu, & à des endroits qui n'en étoient pas éloignés, n'ont pas donné de vertu attractive sensible aux bouts; mais quand j'ai replié ce Fer environ au tiers ou au quart de la distance qui est entre ce milieu & chaque bout, alors l'un & l'autre
bout

bout se sont aimantés, mais bien plus foiblement que si tous les plis & replis eussent été faits d'un seul côté; ils ne portoient pas chacun le tiers ou le quart de ce qu'un des bouts eût porté, s'il eût eu seul la force d'attirer.

Il est certain que si, après avoir plié le Fer à plusieurs reprises entre un des bouts & le milieu, on le plie par de-là le milieu, qu'on diminuë le degré de force qu'on avoit donné au bout le plus proche des premiers plis, mais je n'ai pas toujours trouvé la même diminution, & il ne m'est pas toujours arrivé, comme dans la première expérience, de faire passer toute la force d'un bout dans l'autre.

Si peu de chose suffit pour donner au Fer la vertu d'attirer, peu de chose aussi la lui peut faire perdre. Nous avons vû que des inflexions en sens contraire, faites d'un pouce & demi, ou de deux pouces en deux pouces, ont augmenté la force attractive d'un fil de Fer, gros comme le petit doigt. Si après avoir donné un certain degré à cette force, on veut multiplier les inflexions, quoi-qu'on les fasse entre le milieu & le bout aimanté, on affoiblit la force de ce bout; on parvient même presque à la détruire, en les multipliant jusqu'à un certain point. Trop de plis réitérez retrecissent à la fin les passages; le cours de la matière magnetique n'est plus assés libre. Le Pere *Grimaldi* avoit déjà observé aussi qu'un fil de Fer aimanté par un véritable Aimant, perd sa vertu magnetique. si on lui fait souffrir des inflexions réitérées, ou des frotte-
mens

mens continus. Enfin nous avons dit ci-dessus, que quelques coups de marteau ôtent à un outil la vertu d'attirer qu'il a acquise en coupant le Fer; ils la font perdre de même au Fer qui tient cette vertu des inflexions. Trop d'inflexions produisent à la fin l'effet des coups de marteau.

On ne doit pas s'attendre à aimanter un fil de Fer, en le frappant à coups de marteau; ils forcent à la vérité la matière à refluer, mais ils ne lui laissent aucune place commode où elle puisse se loger, tout ce qui se trouve sous le marteau est à peu-près également comprimé. Il n'en arrive pas de même au Fer qui n'est plié qu'un certain nombre de fois, pendant les inflexions, certaines fibres sont moins distendues que les autres, elles restent plus au large. Mais il y a pourtant une manière d'aimanter le Fer à coups de marteau, quoiqu'assez foiblement: si on ne le pouvoit point du tout, ce seroit une objection considérable contre l'explication dont nous avons fait usage jusqu'ici. Le fil de Fer ne peut être aimanté, parce que toutes ses fibres sont pressées en même temps. Mais cette raison ne doit pas empêcher d'aimanter à coups de marteau une barre large qu'on aura attention de ne frapper qu'au milieu ou près d'un de ses bords avec la panne d'un marteau; dans ce cas la matière chassée a où se loger à son aise dans le Fer même. Aussi ai-je reconnu qu'une barre de Fer frappée fortement, avec les précautions dont nous venons de parler, acquiert la vertu attractive, moins cependant que le Fer qui est plié & replié à diverses

verses reprises. C'est donc encore là une autre façon d'aimer le Fer sur le champ, sans lui faire toucher l'Aimant. Mais c'est une des plus foibles, soit que la matière, chassée trop brusquement, sorte de la barre par divers chemins; soit que les coups ne concourent pas assez à lui faire prendre une même direction.

Dans cette façon foible d'aimer le Fer, il y a pourtant une circonstance à remarquer, qui seule donneroit beaucoup de probabilité à tout ce que nous avons dit de la matière chassée des fibres du Fer les plus comprimées pour aller en occuper d'autres où elle soit moins à l'étroit. Cette circonstance est que tout le bout de la barre n'est pas aimanté, il ne l'est jamais vis-à-vis les endroits qui ont soutenu les coups de marteau. S'il n'y a eu qu'une moitié de la largeur de la barre sur laquelle les coups soient tombés, il n'y aura que la moitié du bout qui répond à ce qui n'a pas souffert de percussions, qui soit aimanté. Si on a eu attention à faire tomber les coups au milieu de la largeur de la barre; que ces coups forment une trace dirigée selon la longueur de cette barre, & de part & d'autre de laquelle le Fer n'ait point été frappé, le bout du Fer ne sera aimanté que dans les deux endroits qui répondent à ce qui n'a pas été frappé, ou dans un de ces endroits, mais jamais le milieu ne le fera.

Cela s'accorde parfaitement avec ce que nous avons dit, pour rendre raison de la manière dont on désaimante un fil de Fer, en poussant trop loin le nombre des inflexions.

flexions. A force de les multiplier, on chafse la matière magnetique qui étoit dans le Fer, elle ne peut plus y circuler à son aise. En lui ôtant de sa souplesse, en l'écroutissant, on exprime la matière magnetique. En veut-on une preuve? Qu'on mette recuire le fil de Fer qui, pour avoir été replié trop de fois, a perdu la vertu magnetique qu'il avoit acquise, & qui n'est plus en état d'en prendre de nouvelle; qu'on fasse, dis-je, recuire ce fil de Fer; aussi tôt qu'il anra été recuit, on pourra lui redonner toute la force d'attirer qu'il avoit ci-devant. Pendant le recuit, le feu écarte les parties du Fer les unes des autres, la matière magnetique trouve de grands espaces où elle se loge; mais quand le Fer vient à se refroidir, cette matière s'y trouve renfermée, elle y est peut-être en quelque sorte emprisonnée, les parties du Fer se rapprochent, & lui bouchent apparemment plusieurs passages par où elle sortoit librement; & c'est à cette matière, renfermée dans le Fer, que sont probablement dûs la plupart des effets que nous venons de rapporter.

Quoi-que nous croyions qu'il y a plus de matière magnetique dans le Fer chaud que dans le Fer froid, nous ne pensons pas cependant que le Fer chaud soit plus en état de s'aimanter lui-même ou d'aimanter l'Acier, que ne l'est le Fer froid; si nous l'eussions pensé, nous eussions bien-tôt trouvé dans les boutiques des ouvriers en Fer de quoi nous défaire de cette erreur. Nous avons dit que tous les outils qui coupent ce métal à froid sont aimantez; mais nous dirons à présent qu'au

qu'au contraire tous les outils qui coupent le Fer à chaud, n'ont nulle vertu attractive. Il y a plus : c'est qu'on fait perdre cette vertu à un outil aimanté, si on lui fait couper du Fer rougi par le feu.

Que l'Acier ne s'aimante point, en coupant un Fer rouge, c'est encore un effet qui s'accorde parfaitement avec ce que nous avons voulu établir sur les tourbillons emprisonnez en quelque sorte dans le Fer. Le taillant de l'outil a beau presser le Fer chaud, il ne met pas pour cela la matière magnétique à l'étroit, il ne la force point à s'ouvrir une route au travers de ses pores, les parties du Fer rouge sont écartées les unes des autres, elles présentent de toutes parts des passages ; d'ailleurs ses parties tiennent peu ensemble, elles résistent foiblement à la force qui tend à les séparer.

Il y a un peu plus de difficulté à expliquer pourquoi l'Acier aimanté perd sa vertu en coupant le Fer chaud. Peut-être faut-il l'attribuer à ce qu'il s'échauffe alors lui-même ; qu'il se fait une agitation dans ses parties, qui produit autant de changement dans leur situation qu'il en faut pour boucher des passages par où la matière magnétique avoit son cours. Quoi-que les parties de l'Acier qui pénètre dans le Fer chaud, deviennent plus écartées les unes des autres, les canaux, dans lesquels circuloit la matière magnétique, sont dérangez. Enfin si on veut, on supposera que dans l'instant de la percussion, l'outil fait, pour ainsi dire, corps avec le Fer chaud, & que les routes étant plus libres dans le Fer chaud, que dans l'Acier, qui

qui alors a un degré de chaleur bien inferieur à celui du Fer, la matière magnetique de l'Acier l'abandonne pour circuler dans le Fer.

La première de nos expériences, & celle qui a donné occasion à toutes les autres, c'est celle des outils d'Acier qui s'aimantent en coupant le Fer; j'ai cru devoir éprouver si ces mêmes outils ne s'aimanteroient pas en coupant d'autres corps de différentes duretez. J'ai essayé sur de la limaille des ciseaux qui avoient coupé beaucoup de bois, d'autres qui avoient coupé du Cuivre, & enfin d'autres qui avoient coupé des pierres plus dures que le Fer. Je leur ai trouvé à tous quelque vertu attractive, plus foible cependant dans les outils qui n'avoient coupé que du bois, que dans ceux qui avoient coupé du Cuivre. Ces expériences n'ont rien de contraire à celles que nous avons rapportées, & aux explications que nous en avons données, puisque nous avons vû que le Fer ou l'Acier frappé par le marteau, ou pressé, ou tourmenté de quelque façon que ce soit, prend un certain degré de vertu attractive. On pourroit pourtant en conclure que c'est inutilement que nous avons fait passer de la matière magnetique du Fer qui est coupé dans le ciseau qui le coupe; que les ciseaux qui coupent le Fer ne s'aimantent plus vigoureusement que ceux qui coupent le bois, ou même le Cuivre, que parce qu'ils sont plus pressés, que parce qu'ils agissent contre un corps plus dur. Deux remarques vont lever ce doute, & prouveront que l'explication doit subsister en son entier. La première est que l'outil, en coupant des pierres plus dures que le Fer, ne
s'ai-

s'aimante pas , à beaucoup près , aussi fortement qu'en coupant le Fer. La seconde est que si avec ces mêmes outils qui ont coupé pendant long-temps du bois, du Cuivre, des pierres, ou coupé seulement une demi-ligne épais de Fer; qu'on donne à ces outils un seul coup pour leur faire couper le Fer, on leur fera prendre dans l'instant plus de huit à dix fois autant de force qu'ils n'en avoient pû acquérir. Ce surplus si considérable ne vient donc pas de la résistance qu'oppose le Fer qui a été entaillé, mais de la matière magnetique qu'il a fournie.

La figure des outils d'Acier contribué à augmenter la force attractive qu'ils prennent en coupant le Fer. Un ciseau dont le taillant est plat, s'aimante moins vigoureusement qu'un poinçon dont la pointe est conique. On peut le remarquer, en comparant les effets de differents outils, mais j'en ai fait l'épreuve de la façon la moins équivoque. J'ai fait forger une seconde fois le taillant d'un ciseau, je l'ai fait changer en une pointe conique, & alors il a attiré plus fortement. Toutes choses, d'ailleurs égales, la grosseur de l'outil contribué aussi à augmenter sa force.

Ce qui pourtant est sur-tout nécessaire à l'outil, c'est d'avoir une certaine longueur; on a beau lui donner du diametre, s'il est extrêmement court, il ne s'aimante point, ou presque point. J'ai fait forger des poinçons qui n'avoient qu'un pouce de longueur, & qui avoient huit ou neuf lignes de diametre, ils n'attiroient que quelques grains de limaille, après avoir percé bien du Fer. Au lieu

lieu que des poinçons longs de trois à quatre pouces, & qui n'avoient pas une ligne ou une ligne & demie de diametre, attireroient de petits clouds. Nous avons fait faire une remarque pareille sur les Fers qu'on aime à en les cassant. Lorsqu'un des bours faits par la cassure est court, il n'attire rien, ou presque rien; il faut une certaine longueur au Fer pour donner assez d'entrée à la matière magnetique, la grosseur n'y supplée pas; l'augmentation de la force attractive que peut prendre un morceau de Fer, n'est nullement proportionnelle à sa masse. L'on en trouvera une raison assez satisfaisante, si on fait attention que cette force est d'autant plus grande, que la matière qui la produit passe en plus grande quantité par un même endroit. De-là vient que certains Aimants armez sont cent ou deux cens fois plus forts qu'avant d'être armez. Prenons deux cylindres de Fer de masse égale, mais dont l'un soit beaucoup plus long que l'autre, & supposons qu'il entre dans l'un & dans l'autre une égale quantité de matière magnetique; ce qui est tout ce que nous pouvons supposer de plus favorable au plus gros cylindre, puisqu'il a moins de surface. Si la matière qui entre dans l'un & dans l'autre, & qui sort de l'un & de l'autre, vient se réunir aux deux bouts, qui sont les deux poles, il est sûr que celui qui a le moins de diametre fera plus puissant que celui qui en a le plus en raison renversée des bases ou des quarrés de diametres, puisque la quantité de matière qui passera par chacun des points de l'un, sera à la quantité de matière qui passera par chacun

chacun des points de l'autre dans ce rapport. Il y a peut-être encore bien d'autres circonstances qui contribuent à augmenter la force du petit cylindre, mais elles nous meneroient loin, & il suffit ici d'avoir entrevû que la différence des longueurs peut produire des augmentations de force attractive.

En commençant ce Memoire, nous avons fait mention des pelles & des pincettes qui se trouvent ordinairement aimantées, ou qui ont deux poles, dont l'un attire une des pointes de l'Aiguille, & repousse l'autre, & dont l'autre pole produit des effets contraires. Nous finirons par quelques remarques que nous avons faites sur cette experience, & par quelques autres experiences qu'elle nous a donné occasion de faire, qui montrent avec quelle facilité le Fer s'aimante. L'experience des pelles & des pincettes ne manquera jamais, si on a attention à quelques circonstances, savoir de les presenter à l'Aiguille, dont le support soit posé sur quelque plan fixe, & de les tenir toujours verticalement, ou à peu-près, & dans le même sens où elles étoient placées dans la cheminée; alors on ne manquera pas de trouver les deux poles, dont l'inférieur attirera la pointe de l'Aiguille qui se dirige vers le Sud, & le supérieur celle qui se dirige vers le Nord. On trouvera quelquefois les mêmes poles, si on tient ces Instrumens horizontalement, & qu'on les fasse glisser auprès de l'Aiguille; quelquefois aussi on ne les retrouvera pas, mais il sera rare qu'on les trouve, si on renverse ces instrumens de haut en bas. Peut-être que ces circonstances aux-

quelles on n'a pas toujours fait assés d'attention, ont fait regarder cette experience comme incertaine, & ont empêché qu'on la suivît davantage. Il m'a paru qu'on étoit convaincu que les pincettes & les pelles devoient leurs poles à la situation où elles ont été pendant un long-temps; ç'a été au moins le sentiment de M. *Robault*.

Mais en repetant ces experiences, j'ai reconnu qu'il n'y avoit guere de Fer moins propre à les faire que ceux des pelles & des pincettes. J'ai voulu essayer en combien de temps une barre de Fer, une verge de Fer, & tout morceau de Fer droit, posé verticalement, acquereroit deux poles qui feroient sur l'Aiguille aimantée le même effet que ceux de l'Aimant; & j'ai été surpris, lorsque j'ai vû qu'il ne falloit précisément qu'un instant à tout Fer droit pour les acquerir. On peut bien appeller un instant le temps qu'il faut pour retourner une barre de Fer, le haut embas, & il n'en faut pas davantage. Ayant placé, comme je l'ai dit ci-dessus, le support de mon Aiguille aimantée sur un plan fixe, j'ai présenté à une des pointes de cette Aiguille, tantôt le bout inferieur de cette barre, & tantôt le bout supérieur; & selon le bout de cette barre que j'avois approché de l'Aiguille, j'ai élevé ou abaissé cette barre, en la tenant verticalement, desorte que chacun de ses points a été successivement à la hauteur de l'Aiguille; le bout inferieur de cette barre attiroit la pointe de l'Aiguille qui est ordinairement tournée vers le Sud, & vers le bout supérieur il y avoit un pole qui attiroit au contraire

traire la pointe du Nord. Si sur le champ je retournois la barre le haut embas, sur le champ les poles étoient changés, c'étoit toujours le bout d'embas qui attiroit la pointe du Sud. La même expérience avoit été faite long-temps avant moi par le Pere *Grimaldi*, comme il paroît par l'article 51 de la sixième proposition de son *Traité de la Lumière*. Au reste ce que nous venons de dire d'une barre, nous l'avons expérimenté sur toutes sortes de morceaux de Fers droits, comme sur du fenton, des verges de vitres, du fil de Fer, &c.

Il suit de ces expériences que le Fer a une grande disposition à être aimanté; que la matière magnetique le penetre bien aisément, & change avec une grande facilité l'arrangement qu'elle avoit donné à ses pores, ou aux parties de ses pores, pour s'y menager des passages, puisqu'elle peut changer sur le champ les poles qu'elle lui a donnés. S'il ne se fait pas un changement de poles si subit dans les pelles & dans les pincettes qu'on retourne le haut embas, c'est à leur figure qu'il faut en attribuer la cause, la courbure de ces Instrumens oppose un obstacle au cours de la matière magnetique. On croiroit peut-être que cette courbure a moins de part à cet effet que la position dans laquelle elles ont été pendant long temps; que cette position a donné à la matière magnetique la facilité de se faire des routes qu'elle ne peut changer dans un instant. Le Pere *Grimaldi* même, dans l'article 52 de la proposition que nous venons de citer ci-dessus, assure qu'une barre qui a

resté long-temps droite , n'a plus l'espece d'indifference dont nous avons parlé, à attirer par chacun de ses bouts l'une ou l'autre pointe de l'Aiguille; & cela peut être, puisque par la suite des siècles une barre de Fer peut devenir de veritable Aimant. Mais je ne sai à combien va le temps necessaire pour donner à une barre de Fer des poles qui ne puissent pas être changés sur le champ, il y faut peut-être des siècles, ou une longue suite d'années; ce que je sai, c'est que des mois n'y suffisent pas. J'ai présenté à une Aiguille aimantée un barreau de fonte de Fer, long de deux pieds & demi, & d'un pouce en quarré, qui avoit resté au moins dix mois dans une position verticale. Le bout inferieur n'a pas manqué d'attirer la pointe du Sud, mais après que je l'ai eu retourné, le bout qui avoit resté en haut pendant si long-temps, a dans l'instant attiré la pointe du Sud, c'est-à-dire, que les poles de ce barreau ont été changés dans l'instant.

La remarque par laquelle nous finirons ce Memoire, c'est que le pole qui attire la pointe du Nord est toujours plus éloigné du bout superieur du Fer que le pole, qui attire la pointe du Sud, ne l'est du bout inferieur. Quelquefois le pole inferieur se trouve presque dans le bout même, & n'a de force qu'aux environs, pendant que le pole superieur est considerablement éloigné du bout superieur, & que la force de ce pole se conserve jusqu'au haut de la barre. Est-ce que la matiere magnetique entreroit dans le Fer par son bout inferieur, & s'é-

cha-

DES SCIENCES. 1723. 149
chaperoit ensuite en s'approchant du bout
supérieur ?

*SUR LE DERNIER PASSAGE
attendu de Mercure dans le Soleil, &
sur celui du mois de Novembre de la
présente année 1723.*

Par M. DELISLE le Cadet.

* **D**ÉPUIS la découverte des Lunettes, Mercure n'a encore été vû que sept fois dans le Soleil, quoi-qu'on l'y ait attendu quelques autres fois. La dernière fois qu'on a crû qu'il y passeroit, a été le 8 Mai 1720 au matin; auquel jour, suivant les Tables les plus recentes, il devoit encore paroître dans le Soleil quelque temps après son lever.

Sur cette esperance que presque toutes les Tables avoient donné de pouvoir voir Mercure dans le Soleil le 8 Mai au matin, j'ai été attentif à regarder le Soleil dès le 7 au soir. Il y avoit dans ce temps-là plusieurs Taches sur le Soleil, dont j'avois déterminé exactement la situation, pour y pouvoir comparer Mercure, lorsqu'il paroîtroit; il ne parut point de toute la journée du 7, où le temps fut assés favorable à *Paris*. Le 8 au matin, le Soleil se leva dans un brouillard dont il se dégagea quelques minutes après,
mais

* 2 Juin. 1723.

mais Mercure ne parut point, enforte que je fus assuré que si Mercure avoit passé dans le Soleil, il en étoit sorti avant $4^h \frac{1}{4}$ du matin.

M. *Kirch*, Astronome de la Société Royale de *Prusse*, eut aussi le temps assés favorable à *Berlin*; mais il n'apperçût point non plus Mercure sur le Soleil, quoi-qu'il ait pû voir le Soleil peu après son lever, trois quarts d'heure plutôt qu'il n'a paru à *Paris*: ainsi on a pû être assuré qu'à 4^h du matin à *Paris*, Mercure n'étoit plus sur le Soleil.

On a aussi regardé attentivement le Soleil dès son lever le 8 au matin à *Konigsberg* en *Prusse*, à *Nuremberg*, à *Strasbourg*, à *Wittemberg*, mais dans aucun de ces lieux on n'a pû voir Mercure, quoi-que le temps y ait été par-tout assés disposé. Ce qui a fait reconnoître, ou que Mercure n'étoit point entré dans le Soleil à cause de sa trop grande latitude, ou que ce passage s'étoit fait avant le lever du Soleil.

On peut avec plus de raison esperer de voir cette année Mercure dans le Soleil, parce que dans sa conjonction inferieure qui arrivera le 9 Novembre au soir, il n'aura que 4 à 5 minutes de latitude septentrionale. Par les Tables de M. *de la Hire*, cette conjonction arrivera à *Paris* à $5^h 30' 20''$; l'entrée du centre de Mercure dans le Soleil fera à $2^h 45' 38''$, & sa sortie à $8^h 1' 58''$, & il passera à $4' 28''$ du centre du Soleil vers le Septentrion. Les Ephemerides de *Manfredi* font arriver cette Eclipse une demi-heure plus tard, & font passer Mercure une demi-minute seulement plus loin du centre du

du Soleil. Voici la methode & les principes sur lesquels j'ai déterminé les circonstances de ce passage que je viens de rapporter.

La conjonction de Mercure avec le Soleil, vû de la Terre, est la rencontre apparente du centre de Mercure dans le cercle de latitude qui passe par le centre du Soleil. Au moment de cette conjonction, Mercure, vû du centre du Soleil, y paroît en conjonction avec la Terre; ce qui fournit le moyen de calculer les conjonctions apparentes de Mercure avec le Soleil, vûes de la Terre, en n'employant que les longitudes de Mercure, vûes du Soleil, telles que les Tables astronomiques les donnent immédiatement, & comparant ces longitudes avec le lieu de la Terre, vû du Soleil, qui est toujours opposé au lieu du Soleil, vû de la Terre.

C'est de cette manière que j'ai remarqué le temps de la conjonction de Mercure avec le Soleil à $5^h 30' 20''$. Suivant les Tables de M. de la Hire, ayant trouvé que la longitude heliocentrique de Mercure, réduite à l'Ecliptique, étoit pour ce temps-là de $16^{\circ} 46' 29''$ & précisément opposée à la longitude vraie du Soleil, qui est de $16^{\circ} 46' 29''$ m.

L'inclinaison de Mercure ou sa latitude heliocentrique se trouve par les mêmes Tables au même moment, de $9^{\circ} 44''$ septentrionale, & la distance de Mercure à son nœud ascendant, prise sur l'Ecliptique, de $1^{\circ} 20' 46''$. D'où l'on conclut l'angle de l'orbite de Mercure avec le cercle de latitude dans cette conjonction de $83^{\circ} 8' 7''$. Sur ces 6-

152 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
 lemens & sur les mouvemens horaires vrais
 de Mercure & du Soleil, tirés des mêmes
 Tables, le premier de $15' 17'' \frac{1}{2}$, & l'autre
 de $2' 31''$, reste à conclure le mouvement
 apparent de Mercure à la Terre, vû du So-
 leil, la Terre étant supposée fixe au point
 où elle se trouve au moment de la con-
 jonction.

Soit CD , l'Ecliptique (*Fig. 1.*) C , le
 lieu heliocentrique de la Terre au moment
 de la conjonction, c'est-à-dire, lorsque le
 centre de Mercure se trouve dans le cercle
 de latitude CA , comme en A ; soit par con-
 sequent CA , la latitude de Mercure, & AF ,
 son orbite, faisant avec le cercle de latitude,
 l'angle FAG de $83^{\circ} 8' 7''$. Soit pris sur cet
 orbite, AF égal au mouvement horaire vrai
 de Mercure. Soit aussi pris sur l'Ecliptique,
 CD égal au mouvement horaire vrai du So-
 leil. Si l'on imagine les points D, F , joints
 ensemble, & par le point C , CE parallèle
 & égale à DF ; AE fera le mouvement ho-
 raire apparent de Mercure à la Terre, vû
 du Soleil, la Terre étant supposée fixe au
 point C .

Par les nombres posés ci-devant, l'on trou-
 ve le logarithme de ce mouvement horaire
 AE de 2, 8852504, en resolvant le trian-
 gle rectiligne AEF , dans lequel on con-
 noît AF de $1517'' \frac{1}{2}$ ou $9' 17'' \frac{1}{2}$. $FE = CD$
 de $2' 31''$ ou $151''$, & l'angle, compris AFE ,
 de $6^{\circ} 51' 53''$, complement de l'angle FAG ,
 que l'on a dit être de $83^{\circ} 8' 7''$. L'on trou-
 ve aussi par la résolution du même triangle,
 l'angle GAE de l'inclinaison apparente de
 l'orbite de Mercure sur le cercle de latitude
 de $81^{\circ} 47' 18''$. Si

Si presentement l'on abaisse du point C une perpendiculaire CM sur cette orbite vûë, elle y déterminera le point M . de la plus proche distance apparente de Mercure à la Terre, vûë du Soleil, que l'on trouve de $9' 38''$ par la résolution du triangle rectiligne ACM rectangle en M , dans lequel on connoît, outre l'angle CAM de l'inclinaison apparente de l'orbite de Mercure avec le cercle de latitude, l'hypothénuse AC de $9' 44''$ ou $584''$. L'on trouve aussi par la résolution du même triangle ACM , la valeur de AM , & le temps que Mercure employe à le parcourir, qui est de $6' 32''$, à raison de son mouvement horaire AE . Ainsi ayant le temps de la conjonction de Mercure en A à $5^h 30' 20''$, on en conclut le moment de la plus proche distance des centres en M à $5^h 23' 48''$. Ce moment de la plus proche distance apparente des centres de Mercure & de la Terre, vûë du Soleil, est aussi celui de la plus proche distance apparente des centres de Mercure & du Soleil, vûë de la Terre, & ainsi par les seuls mouvemens de Mercure & de la Terre considérés du Soleil, on en peut déterminer le moment de sa conjonction apparente de Mercure avec le Soleil & le milieu du passage de Mercure dans le Soleil, vû de la Terre.

On peut aussi déterminer l'entrée & la sortie de Mercure du disque du Soleil, tels qu'ils sont vûs de la Terre, & cela sans employer d'autres élémens que ceux que l'on vient de rapporter du mouvement de Mercure & de la Terre, vû du Soleil. En voici l'expédient.

Ayant supposé le Soleil & la Terre immobiles, lorsque l'on a recherché le mouvement apparent de Mercure à l'égard de la Terre, vû du Soleil; ayant, dis-je, fait cette supposition, la ligne qui joint les centres du Soleil & de la Terre, doit aussi être censée immobile. De plus, si l'on imagine du centre T de la Terre (*Fig. 2.*) une infinité de lignes TP , TR , qui touchent le Soleil, & qui forment par conséquent la superficie d'un cône, dont l'angle au sommet PTR est égal au diamètre apparent du Soleil, vû de la Terre; ce cône retranchera dans l'orbe de Mercure un cercle NQ , qui est la projection de tout le disque du Soleil dans l'orbe de Mercure, & il est évident que lorsque Mercure viendra à rencontrer, par son mouvement propre sur son orbe, la circonférence de ce cercle, il paroîtra de la Terre entrer ou sortir du disque du Soleil.

Pour déterminer ces momens de rencontre, j'imagine que ce même cercle de projection du disque du Soleil dans l'orbe de Mercure soit vû du centre S du Soleil. Il y paroîtra sous un angle NSQ qui sera facile à trouver, connoissant l'angle NTQ du diamètre apparent du Soleil, vû de la Terre, & le rapport des distances SO , TO de Mercure au Soleil & à la Terre, que l'on tire des Tables astronomiques: car les tangentes des complémens de ces angles NSQ , NTQ , sont entr'elles dans le rapport des distances SO , TO . Il n'y a donc plus qu'à imaginer du point C , comme centre (*Fig. 1.*) un cercle décrit de telle grandeur, qu'il paroisse du Soleil sous un angle égal à l'angle

NSQ

NSQ (*Fig. 2.*) car les points *H*, *I*, de rencontre de ce cercle & de l'orbite apparente *AE* de Mercure à l'égard de la Terre supposée immobile en *C*; ces points de section, dis-je, seront ceux de l'entrée & de la sortie du centre de Mercure dans le Soleil, tels qu'ils seroient vûs du centre de la Terre.

Par les Tables de *M. de la Hire*, les distances *SO*, *TO*, de Mercure au Soleil & à la Terre sont dans le rapport de 31333 à 67646, & le diamètre apparent du Soleil est de 32' 30". D'où l'on conclut le demi-diamètre apparent *NSO* ou *CI* de 35' 5" ou 2105". C'est pourquoi dans le triangle rectiligne *MCI*, rectangle en *M*, connoissant l'hypothénuse *CI* & le côté *CM* (la plus proche distance des centres de Mercure & de la Terre, que l'on a trouvée ci-devant de 9' 38" ou 578") l'on en conclut aisément le troisième côté *MI*, qui étant converti en temps, à raison du mouvement horaire *AE*, donne la demi-durée du passage du centre de Mercure dans le Soleil de 2^h 38' 10", laquelle ajoutée & soustraite du milieu de ce passage trouvé à 5^h 23' 48", il en résulte l'entrée du centre de Mercure dans le Soleil à 2^h 45' 38", & sa sortie à 8^h 1' 58". L'on trouve aussi la plus proche distance apparente des centres de Mercure & du Soleil, vûe de la Terre, de 4' 28", dont Mercure doit passer au Septentrion du centre du Soleil, vû du centre de la Terre; ce que l'on a trouvé, en considérant que les tangentes de ces plus proches distances apparentes de Mercure à la Terre, vûes du

Soleil, ou de Mercure au Soleil, vûës de la Terre; que ces tangentes, dis-je, sont en raison directe des distances réelles de Mercure au Soleil & à la Terre.

Les déterminations précédentes ne donnent l'Eclipse que comme elle doit paroître du centre de la Terre; il y a à l'égard de sa surface quelque différence à laquelle il est inutile d'avoir égard dans la prédiction de l'Eclipse; mais lorsque l'Eclipse a été observée exactement, il y faut avoir égard, & réduire les apparences observées de la superficie de la Terre à ce qu'elles auroient dû être, étant vûës du centre de la Terre; la différence de ces aspects sert même à trouver la parallaxe de Mercure au Soleil, d'où l'on conclut celle du Soleil.






Fig. 2.





DIVERSES EXPERIENCES
D'OPTIQUE.

Par M. MARALDI.

PREMIERE PARTIE.

*Experiences d'Optique, faites en plein
 Soleil.*

* **T**OUT ce qui regarde l'Optique est curieux, & dans cette Science, comme dans les autres, les choses les plus petites meritent nôtre attention. Ces matières peuvent même être utiles, par le rapport qu'elles ont avec la lumière qui nous interesse si fort. L'Astronomie y peut trouver aussi ses avantages. C'est dans ces vûës que j'ai fait les experiences suivantes, & que je les ai accompagnées des reflexions que j'ai crû les plus propres à rendre raison des apparences observées. Voici donc ces experiences.

J'ai exposé en plein soleil un Cylindre long de 3 pieds & de 6 lignes $\frac{1}{2}$ de diametre; son ombre ayant été reçûë sur un papier proche, étoit par-tout également noire & assés bien terminée. Elle conservoit le même

G 7. degré

158 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
degré d'obscurité depuis le Cylindre jusqu'à
la distance de 23 pouces. Plus loin on com-
mençoit à voir une ombre de deux différen-
tes densités; car les deux extrémités de l'om-
bre, formées par la longueur du Cylindre, é-
toient terminées par deux traits d'ombre
noire qui avoient un peu plus d'une ligne de
largeur. Au milieu de ces deux traits, on
voyoit une lumière foible répandue égale-
ment dans l'ombre, ce qui formoit un pe-
nombre uniforme, beaucoup plus foible que
les deux traits extérieurs dont on vient de
parler, & plus foible aussi que l'ombre reçûe
proche du Cylindre. (*Fig. 1.*) A mesure que
l'on éloignoit du Cylindre le papier sur le-
quel l'ombre étoit reçûe, les deux traits
noirs conservoient à peu-près la même lar-
geur qu'auparavant, & le même degré d'ob-
scurité, mais la penombre du milieu paroîs-
soit plus claire, & sa largeur diminuoit de
manière, que les deux traits noirs placés aux
deux extrémités de l'ombre, s'approchoient
l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'enfin l'ombre
ayant été reçûe à la distance de 60 pouces, les
deux traits se confondoient l'un avec l'autre,
& la penombre du milieu a disparu.

Plus loin de l'union des deux traits noirs,
on continuoît à voir une penombre foible,
assés mal terminée, qui augmentoit en lar-
geur à mesure qu'elle étoit reçûe plus loin,
& qui étoit encore sensible à une grande
distance.

Outre cette ombre noire & obscure que
formoit le Cylindre proche du corps opa-
que, on voyoit une penombre fort étroite &
fort foible aux deux côtés extérieurs de l'om-
bre.

bre plus dense. Ensuite de la penombre, on voyoit un trait de lumière plus claire que celle qui étoit reçûe sur le reste du papier en plein soleil.

La largeur de la penombre extérieure alloit en augmentant à mesure que l'ombre étoit reçûe loin du Cylindre. Le trait de lumière qui suivoit après la penombre, s'étendoit aussi, mais son éclat s'affoiblissoit, étant reçûe loin du corps opaque.

Voilà les différentes apparences que nous avons remarquées dans l'ombre du Cylindre long de 3 pieds & de 6 lignes de diamètre, reçûe sur un papier à différentes distances.

J'ai fait les mêmes expériences avec un Cylindre long de 3 pieds & de 9 lignes de diamètre, & on voyoit des apparences semblables. Son ombre reçûe proche, étoit noire & bien terminée; on commençoit à voir la penombre au milieu de deux traits d'ombre plus obscurs à 34 pouces de distance, la penombre du milieu s'affoiblissoit & devenoit plus claire à mesure qu'on la recevoit plus loin, & à 91 pouces les deux traits se confondoient, & l'ombre disparoissoit.

Un troisième Cylindre d'un pouce & onze lignes, commençoit à faire l'ombre de deux différentes densités, à six pieds de distance du Cylindre, & les deux traits se confondoient à 17 pieds où l'ombre disparoissoit.

Un quatrième Cylindre de deux pouces trois lignes de diamètre commençoit à faire la penombre au milieu de deux traits noirs à 7 pieds 10 pouces de distance du Cylindre, & l'ombre disparoissoit à 20 pieds 6 pouces.

Au reste tous ces Cylindres , outre la penombre au milieu de deux traits noirs , faisoient des apparences semblables à celles que nous avons remarquées dans l'ombre du premier ; c'est-à-dire , une penombre fort foible à chaque côté extérieur du trait d'ombre plus obscur , ensuite le trait de lumière avec de semblables diversités que nous avons remarquées dans l'ombre du premier, reçues à différentes distances.

De ces quatre expériences, on peut inferer que tout corps opaque, de figure cylindrique, étant exposé en plein soleil, fera des apparences semblables à celles que nous avons remarquées dans les observations précédentes.

Reflexions sur ces Observations:

Puisque le premier Cylindre qui a 6 lignes & demie de diametre, commence à faire l'ombre de deux différentes densités à 23 pouces de distance, divisant ce nombre par le diametre du Cylindre, qui est de 6 lignes & demie, on a pour quotient 42 ; d'où il paroît que cette distinction d'ombres commence à être sensible à 42 diametres du Cylindre ; & puisque son ombre disparoît à 60 pouces de distance, divisant 60 pouces par 6 lignes & demie, on a 110 diametres du Cylindre pour le terme de son ombre. C'est à peu-près la distance, comme l'on sait , jusqu'où les corps opaques doivent jeter leurs ombres, à cause de la grandeur apparente du demi-diametre du Soleil ; car ce demi-diametre étant de 16 minutes, on trouve par la Trigonometrie

gonometrie que l'ombre de tout corps opaque doit terminer à 110 diametres du corps, avec une difference tantôt plus grande, tantôt plus petite, suivant que le demi-diametre apparent du Soleil est tantôt plus grand, tantôt plus petit.

Nous avons remarqué que dans l'ombre du second Cylindre, qui a 9 lignes de diametre, on commence à voir l'ombre distinguée en deux differentes densités à 34 pouces de distance, qui sont 45 diametres du Cylindre, & que son ombre disparoit à 121 diametres.

De même le troisiéme Cylindre d'un pouce & 11 lignes commence à faire les ombres distinguées en deux differentes densités à 6 pieds, qui sont 38 diametres du Cylindre, & l'ombre finit à 17 pieds 6 pouces, qui sont 109 diametres du Cylindre.

Enfin dans l'ombre du quatriéme Cylindre, qui est de 2 pouces 3 lignes, on commence à voir la distinction de deux ombres à 7 pieds 10 pouces, qui sont 42 diametres du Cylindre, & l'ombre se termine à 20 pieds 6 pouces, qui en font 108 diametres.

On peut donc inferer de ces quatre experiences, que tout corps opaque cylindrique, exposé en plein soleil, fait une ombre qui paroît noire & pure depuis le Cylindre jusqu'à la distance de 38 à 45 diametres du Cylindre qui la forme, & que plus loin cette ombre n'est plus pure ni uniforme, mais distinguée, comme nous avons dit, en deux traits d'ombre plus obscure que le reste, au milieu desquels on voit une penombre dont l'obscurité diminuë à mesure qu'elle est éloignée du Cylindre.

Dans

Dans les experiences précédentes, on trouve une difference de 7 diametres dans la distance où differents Cylindres commencent à faire la distinction de deux ombres, la plus grande ayant été trouvée de 45 diametres, la plus petite de 38. Cette difference peut venir en partie de la difficulté qu'il y a de distinguer toujours précisément le terme où commence cette distinction, à cause qu'elle se fait par des degrés insensibles, ne l'ayant pas toujours trouvée précisément à la même distance dans un même Cylindre: elle peut venir aussi en partie de la differente clarté du Soleil au temps des experiences; car nous avons remarqué qu'on apperçoit plus loin du même Cylindre la difference des ombres, lorsque le Soleil est fort peu élevé sur l'horizon, ou moins lumineux, que lorsqu'il est plus élevé & plus clair; mais en prenant un milieu entre la plus petite distance & la plus grande, on aura une distance moyenne de 41 diametres du Cylindre, où commence à se faire la distinction entre la penombre & les deux traits d'ombre plus obscure.

Pour expliquer ces apparences, nous supposons que de tous les rayons du Soleil qui rencontrent le Cylindre, une partie seulement se reflechit sur elle-même, qu'une autre partie se reflechit de chaque côté du Cylindre, & enfin qu'une autre partie ne se reflechit point, mais qu'elle se glisse de côté & d'autre du Cylindre, & refluant, pour ainsi dire, derrière le Cylindre, comme fait l'eau d'une rivière autour d'un pilier d'un pont; cette lumière qui reflue ainsi, penetre dans l'om-

l'ombre, & la rend moins noire qu'elle seroit sans ces rayons.

La raison pourquoi cette ombre proche du corps opaque ne paroît pas éclairée par des rayons qui refluent, mais seulement à une certaine distance, vient peut-être de ce que ces rayons entrent d'abord dans l'ombre séparez les uns des autres, comme on verra dans les expériences rapportées dans la seconde partie de ce *Memoire*, ce qui est cause qu'ils ne sont pas visibles dans la section de l'ombre qui est proche; mais ces rayons venant à se joindre à une certaine distance, & à tomber tous dans le même endroit, ils y sont plus sensibles, & rendent par conséquent l'ombre moins noire. On peut encore expliquer cette apparence, en supposant que les rayons du Soleil qui refluent dans l'ombre, étant en petite quantité par rapport à ceux qui sont réfléchis par le corps opaque, ne sont pas sensibles proche, à cause qu'ils y sont rares, & occupent dans l'ombre un espace trop grand par rapport à leur quantité, mais ils commencent à être sensibles dans une section d'ombre plus petite, où ils sont plus pressés ensemble, & où ils y occupent une plus petite étendue. C'est aussi par cette raison que la penombre devient plus claire à mesure qu'elle est reçue plus loin de l'objet, où la même quantité de rayons qui refluent occupe encore une plus petite étendue que dans la section où la penombre commence à être sensible. Voilà de quelle manière nous croyons que se forme la penombre au milieu de deux bandes noires qui sont à l'extrémité de l'ombre,

&

164 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
& pourquoi elle ne commence à être sensible qu'à une certaine distance du corps opaque.

Pour expliquer la formation des deux bandes noires qui sont à chaque côté de la penombre, nous supposons que les rayons qui refluent glissent un peu autour du Cylindre avant que de le quitter & avant que de penetrer l'ombre, comme on voit qu'il arrive à l'eau d'une rivière, quand elle passe par les piles d'un pont qui suit dans un certain espace le contour des piles; il n'y aura donc pas de rayons dans la partie de l'ombre qui répond aux deux bords du Cylindre, cette ombre y doit donc être plus noire que vers le milieu où elle est mêlée avec les rayons qui refluent: on doit par conséquent voir de cette manière à chaque côté de la penombre deux traits noirs & plus obscurs que le reste. Ce qui est la seconde apparence que nous avons remarqué dans l'ombre du Cylindre exposé en plein soleil.

La troisième apparence est une penombre fort foible qui suit après les deux bandes noires, & qui est plus foible à mesure qu'elle s'éloigne du milieu vers la partie extérieure, elle vient de ce que cet espace n'est éclairé que des rayons qui partent seulement d'une partie du disque du Soleil, ce qui est connu de tous ceux qui ont traité de l'Optique, c'est pourquoi on ne s'étendra pas davantage pour expliquer ce phenomene.

Enfin le trait de lumière plus forte que la lumière même du Soleil qui se peint sur le papier ensuite de la penombre extérieure, vient, suivant toute apparence, des rayons du

du Soleil que nous avons supposé se réfléchir de côté & d'autre sur les deux bords du Cylindre, & qui se vont terminer à l'endroit du papier où il n'y a plus de penombre extérieure. Or ces rayons réfléchis par les deux bords du Cylindre, joints avec les rayons directs qui viennent immédiatement du Soleil, & qui tombent au même endroit du carton, font une lumière plus forte & plus vive que celle qui est formée par les seuls rayons directs du Soleil. Peut-être aussi que ces rayons réfléchis par les bords du Cylindre, se répandent dans tout l'espace compris par la penombre extérieure formée, comme nous avons dit, par les rayons qui viennent seulement d'une partie du disque du Soleil, mais cette lumière réfléchie n'est pas sensible dans cet espace, parce qu'elle y est mêlée avec la penombre, laquelle par cette raison est plus foible qu'elle ne seroit sans cette lumière réfléchie. Elle est donc seulement sensible à son terme qui tombe hors de la penombre extérieure.

Experiences semblables aux précédentes, faites avec des Globes.

J'ai exposé en plein soleil un Globe d'un pouce & 11 lignes de diamètre; son ombre reçûe sur un carton blanc, étoit noire & uniforme depuis le Globe jusqu'à la distance de 2 pieds 6 pouces; plus loin on commençoit à voir cette ombre de deux différentes densités. L'ombre totale étoit terminée par un anneau obscur, large d'un peu plus d'une ligne. (*Fig. 2.*). Au milieu de cet anneau,

il y avoit une aire circulaire d'une ombre beaucoup plus foible que l'ombre qui formoit l'anneau. En recevant l'ombre plus loin, l'aire circulaire & l'anneau obscur diminuoient de grandeur. L'anneau conservoit le même degré d'obscurité, mais la penombre du milieu paroissoit plus claire. A la distance de 17 pieds 6 pouces du Globe, il n'y avoit plus de penombre, on voyoit seulement une petite obscurité au milieu d'une penombre foible & fort large; à 18 pieds la petite ombre noire paroissoit encore assés bien terminée, & à 20 pieds on ne voyoit plus qu'une penombre foible & circulaire qui paroissoit augmenter à mesure que l'on éloignoit le papier sur lequel l'ombre se peignoit.

Outre ces apparences qui se font dans l'ombre formée par le Globe, on voyoit vers la partie extérieure de l'anneau obscur un autre anneau de penombre foible qui diminuoit de densité plus il étoit éloigné de l'anneau obscur. Après la penombre suivoit un trait circulaire de lumière plus vive que celle qui étoit reçûe sur le papier, & qui venoit immédiatement du Soleil.

On voit par cette expérience, que dans l'ombre du Globe il y a les mêmes apparences que dans l'ombre du Cylindre, avec cette différence seulement que dans l'ombre du Globe les apparences sont circulaires comme les corps qui les forment; au lieu que dans l'ombre du Cylindre les apparences sont terminées par des lignes droites.

Un second Globe de cuivre de 3 pouces 7 lignes de diamètre, exposé en plein soleil

leil comme le premier, faisoit une ombre noire jusqu'à la distance de 4 pieds; au delà on commençoit à voir, comme dans la première experience, la distinction de l'anneau obscur avec la penombre: elle se voyoit plus distinctement à 4 pieds 6 pouces.

Un troisième Globe de 5 pouces une ligne de diametre, exposé en plein soleil, comme les deux autres, faisoit l'ombre noire & uniforme jusqu'à la distance de 5 pieds & demi; à cette distance on commençoit à voir l'anneau d'ombre distinguée par la penombre qui étoit au milieu.

Un quatrième Globe de 5 pouces 9 lignes & demie de diametre, faisoit l'ombre pure jusqu'à la distance de 8 pieds & demi; plus loin on voyoit l'anneau d'ombre plus obscur qui comprenoit une penombre comme les autres. Au reste autour de l'ombre de tous ces Globes on voyoit les autres apparences que nous avons remarquées dans le premier.

Reflexions sur ces Experiences.

Puisque dans l'ombre faite par le Globe d'un pouce & 11 lignes, on commence à distinguer la difference des ombres à 2 pieds 6 pouces de distance du Globe, il suit que cette distinction se fait à 15 diametres du Globe; & comme l'ombre disparoît à 17 pieds 6 pouces, elle se termine à 109 diametres du Globe; ce qui doit arriver à cause du demi-diametre du Soleil qui détermine cette distance de l'ombre, comme nous avons dit à l'égard du Cylindre.

De

De même la diversité de l'ombre formée par le Globe de cuivre de 3 pouces 7 lignes, se faisant à 4 pieds de distance du Globe, on trouve qu'elle s'apperçoit à 15 diametres du Globe.

Dans le Globe de 5 pouces une ligne, la distinction des ombres de deux différentes densitez se fait à 13 diametres, & dans le Globe de 5 pouces 9 lignes & demie, elle se fait à 17 diametres.

Il faut remarquer que cette distinction de penombre, avec l'anneau d'ombre plus obscure, ne se fait pas toujours précisément à la même distance du même Globe, mais qu'on l'apperçoit quelquefois un peu plus loin, quelquefois plus proche du Globe, de sorte qu'il y a un peu de doute dans l'endroit précis où l'on distingue ces deux diversités d'ombre, comme nous avons remarqué qu'il arrive dans l'ombre du Cylindre & par les mêmes raisons ; mais cette difference n'est pas bien grande, de sorte qu'en prenant un milieu entre la plus petite, qui est de 13 diametres du Globe, & la plus grande, qui est de 17, on aura une moyenne de 15 diametres où l'on commence à voir l'ombre du Globe distinguée en deux différentes densités.

De ces quatre experiences, on peut inferer que tout corps spherique commence à faire une penombre sensible au milieu de son ombre à 15 diametres du Globe. On peut aussi conclure des experiences du Globe & de celles du Cylindre, que tout corps opaque ne fait pas une ombre pure à une certaine distance du corps, & que cette distance doit être

tre différente selon les différentes figures des corps qui forment ces ombres.

Nous avons trouvé par des expériences très-constantes, rapportées ci-dessus, que dans l'ombre du corps cylindrique la penombre commence à paroître à la distance de 41 diamètres du Cylindre, & que dans l'ombre des Globes elle se fait à 15 diamètres du Globe. Donc dans l'ombre des Globes la différence des ombres commence à être sensible près de deux tiers plus proche, que dans l'ombre du corps cylindrique.

Cette différence entre la distinction de deux ombres du Cylindre & du Globe se connoît non seulement en comparant les expériences faites sur des Cylindres & des Globes de différents diamètres, comparées ensemble, mais encore par des expériences faites avec un Cylindre & un Globe de même diamètre; car ayant exposé en même temps en plein soleil un Globe d'un pouce & 11 lignes, & un Cylindre pareillement d'un pouce & 11 lignes, & ayant reçu les ombres de ces deux corps sur un même papier, nous avons trouvé entre la distinction des deux ombres une différence de plus de 20 diamètres du corps, la distinction dans l'ombre du Cylindre s'étant faite à 38 diamètres, & celle du Globe à 17. Ce qui ne peut pas être attribué à la difficulté d'appercevoir le terme de cette distinction, qui ne monte tout au plus qu'à 7 ou 8 diamètres.

Les principes que nous avons établis auparavant pour expliquer les apparences que l'on voit dans les ombres des corps cylindriques, servent également pour expliquer les

apparences qui s'apperçoivent dans les ombres des Globes.

On trouve aussi dans les mêmes principes, la raison de la différente distance où se fait la distinction des ombres des corps cylindriques & celle des Globes, en considérant la différente quantité des rayons qui refluent autour des corps de ces deux différentes figures; car dans le Cylindre les rayons du Soleil ne peuvent refluer que des deux côtés du Cylindre qui a une longueur considérable, comme étoient ceux dont je me suis servi. Dans le Globe au contraire il en peut refluer également tout autour; il entre par conséquent une plus grande quantité de rayons dans l'ombre du Globe que dans l'ombre du Cylindre; cette lumière plus abondante qui reflue derrière le Globe doit donc être plus sensible plus proche du Globe qu'à égale distance du Cylindre, à cause qu'il y en a une plus grande quantité dans le même espace, & par conséquent on doit voir cette distinction des deux ombres plus proche du Globe que proche du Cylindre.

Nous avons rapporté ci-dessus que dans l'ombre du même corps, on commence à voir la pénombre plus proche du corps opaque, lorsque le Soleil est plus lumineux, & que cette distinction se fait plus loin, lorsque le Soleil n'est pas si clair. Cette observation s'accorde avec la cause que nous venons d'assigner à la différente distance qu'on a trouvée dans la pénombre du Cylindre & dans celle du Globe, car il y a une plus grande quantité de rayons qui doivent refluer, lorsque le Soleil est plus lumineux, que

que lorsqu'il est un peu obscurci par des nuages rares.

De même comme il y a une plus grande quantité de rayons qui refluent autour du Globe qu'autour du Cylindre, la distinction de deux ombres se doit faire plutôt dans l'ombre du Globe que dans l'ombre du Cylindre.

Ces mêmes apparences donnent lieu de croire que la lumière qui reflue pénètre dans l'ombre immédiatement après le corps opaque, quoi-qu'elle n'y soit pas sensible à la vue ; car puisque cette distinction se fait, comme nous avons dit, plus proche du même corps opaque, lorsque le Soleil est plus clair que lorsqu'il l'est moins, il suit que la différente distance où se fait la distinction, dépend du plus ou du moins de lumière répandue dans le même espace ; ainsi quoique la lumière qui reflue puisse pénétrer l'ombre immédiatement après le corps opaque, elle n'y est pas sensible, parce qu'il n'y en a pas une assez grande quantité de mêlée avec l'ombre. D'où l'on pourroit conclure qu'aucun corps opaque ne fait point d'ombre pure, & qui ne soit mêlée avec des rayons du Soleil qui refluent derrière le corps opaque.

S'il est permis présentement de faire passage du petit au grand, & de ces expériences particulières en conjecturer ce qui peut arriver en general dans la nature, n'y auroit-il pas lieu de croire que les rayons du Soleil qui éclairent la Terre, refluent de la même manière que nous l'avons observé dans les expériences précédentes ? par conséquent que ces rayons qui refluent autour de la Terre,

penetrent dans son ombre , & la rendent moins dense qu'elle ne seroit sans ces rayons , comme nous avons remarqué qu'il arrive dans l'ombre de plusieurs boules ?

On sait que la Lune, lorsqu'elle est entièrement immergée dans l'ombre de la Terre, ne se perd que très-rarement de vûë, mais qu'elle est presque toujours éclairée par une lumière foible & rougeâtre qui la fait encore appercevoir au milieu de l'ombre.

On attribué cette lumière, dont la Lune est éclairée dans ses éclipses, tout entièrement aux rayons du Soleil qui se rompent dans l'atmosphère de la Terre, & penetrant l'ombre , l'éclairent diversement à différentes distances de la Terre, suivant l'inclinaison différente que les rayons, qui partent des différentes parties du disque du Soleil, font à la surface de l'atmosphère. Si les rayons du Soleil refluent autour de la Terre, ces mêmes rayons répandus dans l'ombre, peuvent aussi-bien contribuer à rendre la Lune visible dans ses éclipses, comme les rayons qui se rompent dans l'atmosphère.

Il y a cependant une difficulté contre cette hypothèse, qui est que la Lune, lorsqu'elle entre dans l'ombre de la Terre, semble passer d'abord par une pénombre foible, & successivement par divers degrés d'obscurité presque insensibles qui va en augmentant depuis la circonférence de l'ombre jusqu'au milieu, & va ensuite en diminuant depuis le milieu jusqu'à la sortie entière de la Lune de l'ombre, au lieu que si l'ombre de la Ter-

re étoit semblable à celle des boules, comme nous avons remarqué dans les expériences précédentes, & qu'il y eut à la circonférence un anneau plus obscur que le reste de l'ombre, il devoit être sensible dans les Eclipses de Lune, & cet Astre devoit paroître plus obscur vers le commencement & vers la fin de l'Eclipse que vers le milieu. De même dans les Eclipses partiales, le terme de l'ombre qui sépare la partie du disque de la Lune qui est éclipsée de celle qui ne l'est point, devoit être bien noir & bien terminé, ce qui n'a pas été remarqué jusqu'à présent.

Peut-être que les rayons du Soleil rompus dans l'atmosphère, & qui penetrent en grande quantité l'extrémité du cône de l'ombre dans une grande étendue de ce cône, peut effacer en partie cet anneau d'ombre plus obscur, supposé qu'il subsiste autour de l'ombre de la Terre. Nous examinerons dans une autre occasion cette particularité. On fera cependant attention dans les Eclipses de Lune, s'il y a quelque apparence qui puisse confirmer cette hypothèse ou bien la détruire.

SECONDE PARTIE.

Expériences d'Optique, faites dans une Chambre obscure.

Le Père *Grimaldi* a observé qu'en introduisant par un fort petit trou fait dans une lame de plomb fort mince, un rayon de Soleil dans une chambre obscure, & que met-

174 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
tant à ce rayon un cheveu, ou tout autre
corps cylindrique & opaque fort mince, pla-
cé à une certaine distance du trou; ce corps,
ainsi placé, fait une ombre, qui étant reçûë
sur une carte à quelque distance du corps o-
paque, est beaucoup plus grande que ne de-
mande la distance qui est entre le corps opa-
que & la section de l'ombre. Il a observé
en second lieu qu'à chaque côté de cette
ombre, il y a une bande claire, après la-
quelle suivent des traits colorés de rouge,
de violet & de bleu.

M. *Newton* qui, après le Pere *Grimaldi*,
a fait la même expérience, a remarqué que
si l'on place au même rayon de lumière dé-
crit ci-dessus, un cheveu ou une aiguille
très-fine qui soit à une distance de 12 pieds
du trou, & qu'on reçoive sur un carton
l'ombre faite par ce cheveu à une distance
de 4 pouces, on voit sur ce carton l'ombre
quatre fois plus grande que l'objet; à la dis-
tance de 2 pieds l'ombre paroît dix fois plus
grande, c'est-à-dire toujours plus grande, à
mesure qu'elles s'éloignent du cheveu. Il a obser-
vé aussi, comme le Pere *Grimaldi*, les deux
traits de lumière à chaque côté de l'ombre,
ensuite les autres traits plus petits, colorés
de rouge, de violet & de bleu au côté ex-
terieur de chaque bande de lumière.

J'ai repeté la même expérience, dans la-
quelle, outre ces apparences, j'ai remarqué
de plus, qu'en recevant l'ombre fort loin
du cheveu, on voyoit au milieu de la ban-
de noire une petite bande de lumière qui
partageoit l'ombre suivant sa longueur en
deux parties égales, de manière que l'ombre
du

du milieu n'étoit plus d'une même densité que lorsqu'elle étoit reçûë plus proche du cheveu.

Outre cette expérience, j'ai fait encore celles qui suivent.

Une soye de Sanglier qui étoit plus grosse qu'un cheveu, étant placée directement aux rayons du Soleil qui entroient par le petit trou à une distance de 9 pieds du même trou, faisoit une ombre qui, étant reçûë à 5 ou 6 pieds loin de l'objet, étoit composée de plusieurs traits d'ombre & de penombre. Le milieu étoit une ombre foible, ou plustôt une espece de penombre; à chaque côté de cette penombre il y avoit une bande étroite d'une ombre plus obscure que celle du milieu; après cette bande d'ombre il y en avoit une autre plus étroite de penombre, ensuite une bande claire qui est plus large que l'obscur; à côté de la bande claire on voyoit des traits successivement rouges, violets & bleus comme dans l'ombre du cheveu.

J'ai encore placé de la même manière dans les mêmes rayons qui entrent par le petit trou dans une chambre obscure plusieurs aiguilles de différentes grosseur, mais il seroit trop long de rapporter en particulier toutes les différentes circonstances que nous avons remarquées dans leurs ombres, tant par rapport à la largeur & à la densité de la penombre du milieu que par rapport à la largeur & à la densité des bandes noires & claires qu'elles forment. Nous dirons seulement qu'il y a des aiguilles qui ne font qu'une penombre foible & uniforme au milieu des deux

bandes claires ; d'autres qui font la bande obscure plus dense au milieu de deux bandes noires & plus étroites, après lesquelles suivent immédiatement les deux bandes claires. Il y en a d'autres qui font la bande du milieu un peu rougeâtre, après laquelle on voit deux bandes noires qui sont suivies de deux petites bandes de penombre, après lesquelles sont les bandes claires. Il y a des aiguilles qui font les bandes noires & claires plus larges que d'autres aiguilles. Il y a enfin des aiguilles de moyenne grosseur qui ne font point de penombre aux deux côtés extérieurs de chaque bande noire, ni de bande claire qui soit sensible, & qui a coutume de paroître, après la penombre extérieure, dans l'ombre des plus petites aiguilles & dans celle des plus grosses. Toutes ces aiguilles faisoient cependant les petits traits mêlés de rouge & de bleu aux deux côtés extérieurs de la bande claire qu'on voit dans les ombres du cheveu.

Nous ne rapporterons donc pas en détail toutes ces expériences, & nous nous contenterons des deux suivantes, qui pourront servir à découvrir ce qui se passe dans les ombres des aiguilles.

J'ai exposé dans les rayons du Soleil qui entroient par un petit trou dans une chambre obscure, une plaque perpendiculairement à ces rayons qui avoit deux pouces de long & d'un peu plus d'une demi-ligne de large. Cette plaque étant placée à 9 pieds de distance du trou, on voyoit dans son ombre, lorsqu'elle étoit reçue directement fort proche, une lumière foible qui y étoit également répandue. L'ombre de la même pla-

plaque, reçûë encore directement à 2 pieds & demi de distance, paroïssoit distinguée en quatre petites bandes noires fort étroites au milieu d'une penombre plus foible; ces bandes noires étoient proche l'une de l'autre, séparées par de petits intervalles plus clairs, égaux aux bandes noires. (*Fig. 3.*) Les deux termes extérieurs de cette ombre, de côté & d'autre, étoient marqués par une penombre, ensuite une bande fort claire qui étoit suivie comme dans les ombres des aiguilles des traits ordinaires mêlés de rouge, de violet & de bleu.

L'ombre de la même plaque, reçûë directement à quatre pieds & demi de distance de la plaque, ne paroïssoit plus distinguée en quatre bandes noires & claires, mais seulement en deux : les deux bandes noires extérieures (*Fig. 4.*) ayant disparu, ces deux bandes noires qui restoient étoient plus larges qu'auparavant, & séparées l'une de l'autre par un intervalle d'une ombre plus foible qui étoit le double plus large que chacune des bandes noires qu'on voyoit auparavant, lorsque l'ombre étoit reçûë à 2 pieds & demi de distance, cette penombre du milieu étoit rougeâtre. Après les deux bandes noires, il y avoit une penombre assés forte, après laquelle paroïssient les deux bandes claires assés larges & éclatantes, ensuite les traits colorés.

Une seconde plaque de 2 pouces de long & d'une ligne de large, étant placée comme la précédente dans les rayons du Soleil à 14 pieds du trou par lequel entroient ces rayons, son ombre reçûë directement fort

proche de la plaque, étoit éclairée par une lumière foible également répandue comme dans la plaque précédente ; mais étant reçue encore directement à 13 pieds de distance de la plaque, on commençoit à voir six petites bandes noires, distinguées par autant de bandes d'une ombre moins forte, de la même largeur que les bandes noires (*Fig. 5*) ; à 17 pieds de distance de la plaque, on voyoit ces bandes noires plus larges, plus distinguées & plus séparées des autres bandes moins obscures, de sorte que les moins noires qui étoient entre deux, s'étoient aussi élargies. A 42 pieds depuis la plaque, on ne voyoit plus que deux seules bandes noires au milieu d'une penombre. (*Fig. 6.*) La penombre du milieu, placée entre les deux bandes noires, étoit rougeâtre, les deux extrémités étoient teintes d'une foible noirceur. Après ces deux bandes de penombre extérieures, on voyoit toujours les bandes claires qui étoient larges, & les autres traits de lumière colorée qui les suivent.

Ayant reçu l'ombre de la même plaque à 72 pieds de distance, on n'y voyoit point d'autre différence à l'égard de la situation précédente, excepté que les deux bandes noires étoient plus larges, & l'intervalle du milieu occupé par la penombre aussi plus large & plus rougeâtre qu'auparavant.

J'ai présenté dans les mêmes rayons différentes plaques plus larges, comme d'une ligne & demie, de 2 lignes, de 3, &c. & ayant reçu directement les ombres de ces différents corps sur un papier, je n'ai pu distinguer dans ces ombres ces bandes de lumière

re foible que l'on distingue dans les plaques plus petites, quoi-que j'aie reçu ces ombres à une distance de 56 pieds; on y voyoit seulement une lumière foible & confuse répandue également, comme l'on voit dans les ombres des deux plaques d'une demi-ligne & d'une ligne, lorsqu'elles sont reçues proche du corps qui les forme.

Sil'on avoit des lieux obscurs assez grands, dans lesquels on pût recevoir l'ombre des plaques larges à une fort grande distance, je crois que nous verrions dans ces ombres les mêmes apparences que nous voyons dans les ombres des plus petites aiguilles reçues à une mediocre distance.

De même si l'on pouvoit voir distinctement les ombres des petites aiguilles fort proche du corps qui les forme, comme l'on peut distinguer les parties des ombres des plaques qui ont une demi-ligne ou une ligne de large, on verroit peut-être les ombres de ces petites aiguilles & des cheveux distinguées en différentes bandes de lumière & d'ombre, comme on voit les ombres des plaques d'une ligne. Mais comme pour voir cette apparence dans les ombres des cheveux, il en faudroit recevoir l'ombre fort proche où elle est fort petite, cette extrême petitesse est peut-être cause qu'on ne peut pas distinguer les différentes parties qui la composent; cependant nous avons vu les mêmes apparences dans les ombres des aiguilles qui n'étoient que d'une grosseur ordinaire.

Voilà les phenomenes les plus singuliers que l'on observe dans les ombres des corps étroits & longs, soit qu'ils soient cylindri-

ques, soit qu'ils soient plats, lorsqu'ils sont exposés à un rayon de Soleil qui entre dans une chambre obscure par un trou extrêmement petit.

Le Pere *Grimaldi* a observé, comme nous avons déjà dit, ces trois bandes de lumière & de couleur qu'on voit à chaque côté des ombres des cheveux & d'autres petits corps cylindriques. Il a aussi observé ces traits de lumière & d'ombre qui s'apperçoivent dans les ombres mêmes des plaques plus larges, & qui sont tantôt au nombre de quatre, tantôt au nombre de six, suivant la largeur des plaques, & il a observé que dans la même plaque, de six qu'elles sont proche, elles se réduisent à deux, ainsi que nous avons remarqué, lorsque l'ombre est reçue à la distance de 56 pieds. M. *Delisle* a aussi observé les mêmes apparences, comme il paroît dans un Memoire qu'il lût à l'Academie l'an 1717, & qui n'a point été publié.

Le P. *Grimaldi* explique ces bandes de lumière, tant celles qui se voyent dans l'ombre, que celles qui se voyent à chaque côté de l'ombre, par une espece d'ondulation qu'il suppose dans les rayons du Soleil qui se fait, lorsqu'ils rencontrent quelque obstacle, & il explique l'agrandissement de l'ombre par une difraction qui se fait des rayons proche du cheveu.

Je tâcherai d'expliquer d'une autre manière les apparences qui s'observent dans les ombres des cheveux, dans celles des aiguilles & dans celles des plaques, & je les expliquerai par les mêmes principes que j'ai supposé, pour rendre raison des apparences ob-

observées dans les ombres des corps exposés en plein Soleil, car je crois que les unes & les autres se font à peu-près de la même manière.

Je suppose donc comme dans la première partie de ce Memoire, que des rayons qui vont rencontrer le corps opaque, il y en a une partie qui se reflechit sur elle-même, & forme l'ombre à l'opposite, une autre partie se reflechit aux côtés du corps opaque, & le reste qui n'est qu'une petite partie, se reflechit en circulant autour du corps, & après en avoir fait le tour, le quitte, & entre dans l'ombre formée par les rayons reflechis. Je suppose qu'il y a des parties de lumière qui ne quittent le Cylindre que fort proche de l'axe de l'ombre, d'autres parties qui circulent moins, & quittent le Cylindre avant que d'approcher de l'axe. Cette lumière qui circule autour du corps, se mêlant, pour ainsi dire, avec l'ombre, en diminue l'obscurité dans les différents endroits où tombent ces parties de lumière. & forme ces traits moins obscurs qu'on voit dans les ombres, lorsqu'elles sont reçues proche du corps qui les forme.

Par les experiences faites sur plusieurs petites aiguilles & sur des cheveux, il est constant que leur ombre paroît noire, lorsqu'elle est reçûe à une fort petite distance du corps opaque; qu'à une distance de 3 ou 4 pieds, elle n'est qu'une espece de penombre uniforme ou une ombre fort legere; il tombe donc en cet endroit de l'ombre un peu de lumière qui circule autour du corps opaque,

182 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
& qui en diminuë en cet endroit l'obscurité. L'ombre des mêmes aiguilles étant reçue fort loin de l'objet, on voit non seulement cette penombre plus claire qu'auparavant, mais sa largeur paroît partagée en deux parties égales par un trait de lumière foible qui regne au milieu de l'ombre dans toute sa longueur. Il est donc visible qu'en cet endroit de l'ombre il tombe une plus grande quantité de lumière qu'il n'en tomboit auparavant.

Par les experiences précédentes, on voit les ombres des petites plaques partagées en différentes parties suivant les différentes distances où ces ombres sont reçues à l'égard du corps qui les forme. Fort proche, on voit l'ombre distinguée en quatre ou six bandes claires séparées par autant de bandes obscures égales aux claires; ces bandes claires sont des rayons de lumière qui circulent autour des aiguilles, les uns plus, les autres moins; il y en a qui refluent & ne quittent le Cylindre que presque à l'opposite du lieu où ils le rencontrent: ceux-ci forment les bandes claires qui sont les plus proches du milieu de l'ombre; il y a d'autres rayons qui refluent moins que les premiers, & qui quittent plutôt le Cylindre pour entrer dans l'ombre; ceux-ci forment les bandes de lumière qui sont plus proche des extrémités de l'ombre, ainsi des autres.

Ces traits de lumière qui se voyent dans l'ombre occupent un petit espace jusqu'à une certaine distance; plus loin cette lumière se dilate & se croise, & par-là elle efface une partie de ces traits d'ombre qu'on voyoit plus

plus proche ; car, comme nous avons dit, dans l'ombre de la plaque, large d'une ligne environ, les six traits de lumière & d'ombre qu'on voyoit depuis 13 pieds jusqu'à la distance 35 ou 42 étoient effacés en partie ; mais plus loin que 42 pieds, on ne voyoit plus que deux bandes noires au milieu d'une lumière foible ou d'une penombre. D'où il est visible qu'à 42 pieds de distance, la lumière, par rapport à l'ombre, avoit changé de situation.

Les deux bandes noires ne sont qu'une partie d'ombre qui n'est point mêlée avec les rayons de lumière qui refluent derrière le corps opaque ; la penombre rougeâtre qui est au milieu de deux traits d'ombre est une partie de lumière répandue dans un grand espace de l'ombre, & les deux penombres à chaque côté extérieur des deux bandes noires sont des espaces de l'ombre, où il y a encore une moindre quantité de rayons que dans l'espace du milieu.

Voilà comment nous croyons qu'on peut expliquer en general cette diversité de nuances que l'on voit dans les ombres des plaques d'une demi-ligne & d'une ligne de large ; il suffira d'en avoir donné une idée, sans être obligé d'entrer dans un plus grand détail.

L'explication de ce qui se voit dans ces plaques peut servir à rendre raison des apparences qui se voyent dans les ombres des aiguilles ordinaires, n'y ayant presque point d'autre différence entre les unes & les autres, sinon que dans les aiguilles ordinaires les mêmes apparences sont comprises dans

un petit espace, & se font dans une plus petite distance du Cylindre; au lieu que dans les grandes plaques, elles sont plus remarquables, & demandent une grande distance. De plus la diversité de penombre & d'ombre, & leur différente combinaison que l'on voit dans les ombres des aiguilles de différente grosseur, vient du différent mélange d'ombre & de lumière qui reflue & qui se fait à l'endroit où ces ombres sont reçues.

Après avoir parlé des différents degrés d'obscurité des ombres, nous passons aux bandes de lumière qui suivent les ombres.

Nous expliquons les deux bandes claires que l'on voit à côté de la bande obscure par une reflexion des rayons du Soleil qui se fait sur le corps cylindrique; car ces rayons réfléchis pour l'ordinaire en grande quantité de chaque côté par ce corps, tombent sur le papier, mêlés avec les rayons qui viennent directement du Soleil; la somme de ces deux lumières, l'une réfléchie, l'autre directe, qui se rencontrent au même endroit du papier, compose une lumière totale qui doit être plus claire & plus vive que celle qui est formée par les seuls rayons directs, comme cela est visible dans les bandes claires.

Les deux autres bandes plus petites, que l'on voit à chaque côté extérieur des deux autres plus claires, sont causées par des rayons qui en tombant sur le corps cylindrique, s'y réfléchissent sous différents angles, & vont tomber sur le papier. Cette lumière se mêle avec les rayons directs, & forme une lumière plus vive comme la précédente.

A-

Après avoir rendu raison de la différente densité que l'on voit dans les ombres des aiguilles, & des bandes de lumière qui sont à chaque côté de ces ombres, il reste à examiner de quelle manière se peut faire l'agrandissement extraordinaire de ces ombres qui a été remarqué par le Pere *Grimaldi* & par M. *Newton* dans les cheveux & dans les autres corps cylindriques minces.

Pour expliquer ce phénomène, je suppose qu'un corps opaque, outre l'ombre qu'il fait par les rayons directs du Soleil, peut avoir encore à côté de cette ombre un grand nombre d'ombres plus foibles; ou plutôt une ombre continuë formée par les rayons réfléchis dans l'air. Ces ombres ne sont pas à la vérité visibles dans un grand jour, parce que la lumière réfléchie par les particules d'air autour du corps opaque, étant presque uniforme & répandue également autour du corps, il ne fait point d'ombre sensible par cette lumière réfléchie, mais on pourra comprendre facilement que si en quelque endroit de la place qui est autour de l'objet, on pouvoit diminuer la lumière réfléchie, & empêcher en quelque manière qu'en cet endroit il n'en tombât une aussi grande quantité que par-tout ailleurs, on verroit en cet endroit une ombre d'autant plus forte que la lumière y seroit affoiblie; or en quelque endroit que l'on fasse autour de l'objet cette diminution de lumière, il est certain qu'il y aura une ombre causée par la lumière réfléchie qui est à l'opposite; ainsi cette ombre sera plus forte à l'opposite du Soleil, & l'ombre formée par l'objet fera au-

tour.

tour de lui des ombres plus foibles qui feront la circonference de l'horifon.

Pour un plus grand éclairciffement je fuppose une colonne au milieu d'une place. Cette colonne, étant éclairée par les rayons directs du Soleil, fera une ombre noire à l'opposite, mais elle est encore éclairée par les rayons reflechis dans l'air, & par les objets qui font aux environs, puisqu'elle est visible, de quelque côté qu'on la regarde, même du côté de l'ombre; je dis que cette colonne, outre l'ombre causée par les rayons qui viennent directement du Soleil, pourra faire encore tout autour des autres ombres plus foibles causées par les rayons reflechis dans l'air qui iront en s'affoiblissant à mesure qu'elles s'éloignent de l'opposite du Soleil, si l'on trouve le moyen de diminuer la lumière uniforme reflechie de toutes parts, qui empêche, pour ainsi dire, d'appercevoir ces ombres; car diminuer la lumière d'un côté, fait le même effet que de l'augmenter à l'opposite. Cela fupposé, considérons les circonstances de l'expérience du Pere *Grimaldi* & de M. *Newton*.

On fait entrer par un fort petit trou, qui n'est que la quarante-deuxième partie d'un pouce, dans une chambre obscure un rayon de Soleil. La lumière faite par ce rayon est par consequent fort foible; on presente un cheveu ou une aiguille à ce rayon à une distance de 12 pieds du trou, & recevant sur le carton l'ombre faite par le cheveu à 2 pieds de distance, elle paroît dix fois plus grande que l'objet; à la distance de 10
pieds.

pieds elle paroît trente-cinq fois plus grande, c'est-à-dire, toujours plus grande à mesure qu'elle s'éloigne du cheveu.

Expliquons cette expérience par les principes établis ci-dessus. La lumière du Soleil introduite dans la chambre obscure par le petit trou, éclaire directement l'espace compris entre les lignes droites qui partent de l'extrémité de l'image du Soleil, & passant par le diamètre du trou, vont se terminer aux bords du Soleil; mais outre cette lumière qui vient directement du Soleil, il entre encore par le trou une grande quantité de rayons qui sont réfléchis par l'air.

Quand donc on présente le cheveu aux rayons directs du Soleil, il est éclairé non seulement par ces rayons, mais il l'est aussi par les rayons réfléchis dans l'air voisin; donc le cheveu doit faire à l'opposite une ombre formée par les rayons directs du Soleil, & outre cela il doit faire de çà & de là de l'ombre principale une autre ombre continuë formée par les rayons réfléchis dans l'air; & comme la lumière principale qui entre par le trou dans la chambre obscure est extrêmement foible à cause de la petitesse du trou, qui n'est que la quarantième partie d'un pouce, elle n'est pas assez forte pour effacer une partie de ces ombres faites par la lumière réfléchie de côté & d'autre de l'ombre principale, enforte que de toutes ces ombres qui se forment en portion de cercle autour du cheveu, dont il est comme le centre, il se fait une ombre totale qui est plus grande que l'ombre seule formée par les seuls rayons directs du Soleil, comme l'ont observé le

Pere

Pere *Grimaldi* & M. *Newton*.

Il est vrai que suivant cette explication il devroit y avoir une ombre qui occupe à peu près la demi-circonférence du cercle dont le cheveu seroit au milieu, mais deux choses peuvent empêcher qu'en ne voye cette ombre aussi grande. La première est que le degré de lumière formée par les rayons réfléchis dans l'air, va en diminuant à mesure qu'ils s'éloignent du Soleil; c'est pourquoi les ombres de ces rayons devenant toujours plus foibles à mesure qu'elles font un plus grand angle avec le rayon qui va du centre du Soleil au cheveu, la plus grande partie de ces ombres est effacée par un degré de lumière plus forte, telle qu'est celle du Soleil, faite par les rayons directs introduits par le trou. L'autre raison qui empêche de voir cette ombre aussi grande, est qu'à chaque côté de cette ombre il y a une bande de lumière plus claire que le reste de la lumière faite par l'image du Soleil, comme nous avons déjà dit, qui par conséquent doit effacer à l'endroit où elle se trouve, une partie des ombres proche de la grande, c'est pourquoi nous ne pouvons pas voir cette ombre aussi grande qu'elle se verroit, à cause de ces bandes de lumière formées par les rayons réfléchis, qui sont à chaque côté de l'ombre.

J'ai observé qu'en mettant le cheveu fort proche du trou, il se formoit un plus grand nombre d'ombres & de traits colorés vers le côté extérieur de chaque bande claire que lorsque le cheveu étoit éloigné du trou. Cela vient de ce que la lumière réfléchie dans
l'air.

l'air à l'entrée du trou, étant plus forte que lorsque le cheveu en est éloigné, elle est plus propre proche du trou à marquer un plus grand nombre d'ombres & de bandes plus fortes & plus visibles que lorsque le cheveu est plus éloigné de l'ouverture.

Ces ombres & ces traits colorés qui sont à côté de la bande claire, se voyent même sur le papier, lorsque le cheveu n'est plus éclairé par les rayons directs du Soleil, ainsi que M. *Delisle* l'a remarqué; ce qui fait voir que ces ombres & ces traits colorés ne sont pas seulement formés par les rayons directs du Soleil, mais encore par des rayons qui en sont éloignés de côté & d'autre.

Voilà de quelle manière on peut expliquer pourquoi l'ombre du cheveu est plus grande qu'elle ne doit être naturellement. Cette manière d'expliquer l'agrandissement extraordinaire de l'ombre ne suppose que les principes ordinaires d'Optique.

On pourroit encore expliquer de la manière suivante l'agrandissement extraordinaire de l'ombre. Nous avons supposé qu'une partie de lumière qui rencontre le corps cylindrique, circule tout autour, & va se séparer par parties derrière le Cylindre. Cette lumière qui reflue, forme autour du Cylindre une espèce de Tourbillon cylindrique qui s'étend à quelque distance du Cylindre, de sorte que la somme des diamètres du Cylindre & du Tourbillon est plus grande que le diamètre du Cylindre seul. Cela supposé, comme le Tourbillon de la lumière circule autour du Cylindre, il entraîne non feu-

seulement la partie des rayons qui refluent, mais il fait prendre la même circulation aux rayons de lumière qui viennent directement du Soleil, & qui passent de côté & d'autre du Cylindre jusqu'à la distance où le Tourbillon même s'étend. Ces rayons étant détournés de leur direction, & emportés par les autres qui circulent, laissent un vuide de lumière à l'opposite, & par cette seule raison il se fait une ombre à chaque côté de celle du Cylindre; ainsi l'ombre du Cylindre & celle du Tourbillon ensemble doit être plus grande que celle du Cylindre seul. Voilà une seconde manière d'expliquer l'agrandissement extraordinaire de l'ombre.

Pour rendre raison par la même hypothèse des bandes claires que l'on voit à chaque côté extérieur de l'ombre, on suppose que tous les rayons qui forment le Tourbillon ne suivent pas si précisément la circulation, qu'il s'en échape quelques-uns vers sa partie extérieure. Or cette lumière qui s'échape, se mêlant avec la lumière directe du Soleil, ces deux lumières, jointes ensemble, forment à chaque côté de l'ombre la bande de lumière qui est beaucoup plus éclatante que la seule lumière qui vient directement du Soleil, & entre par le petit trou dans la chambre obscure.

Les autres bandes colorées qui sont à côté de la bande claire, se peuvent expliquer par le même échappement des rayons qui sortent de la partie extérieure du Tourbillon, & vont à une plus grande distance & en moindre quantité que les premiers qui forment la bande claire. Pour ce qui est des
cou-

couleurs, on peut supposer avec M. *Newton* qu'elles sont formées par les rayons de différente espece qui sont séparés l'un de l'autre par différentes inflexions.

Comme on peut souvent rendre raison de la même apparence par différentes hypothèses, je laisse à juger quelle de ces deux est la plus vrai-semblable. Ces explications supposent à la vérité que la lumière circule autour du corps opaque, mais il paroît difficile de rendre raison d'une manière plus simple des apparences observées dans les ombres des corps opaques exposés aux rayons du Soleil, tant en plein jour, que dans la chambre obscure. On peut expliquer ce mouvement que l'on suppose dans les rayons autour du corps opaque, suivant les regles ordinaires, par une suite de reflexions qui produisent un mouvement sensiblement circulaire.

Ceux qui ont expliqué avant nous cet agrandissement extraordinaire de l'ombre observée dans la chambre obscure, ont été obligés de faire pour cela seul de nouvelles suppositions. Car les uns ont supposé une diffraction dans la lumière qui se détourne du corps opaque, les autres ont crû qu'il y a une espece d'action dans le cheveu, par laquelle il éloigne loin de lui les rayons de lumière.

On peut encore expliquer par la même hypothese du Tourbillon de lumière différentes apparences qui ont été observées dans les experiences précédentes, & que nous passerons.

Pour avoir quelque idée de ce qui arrive

192 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
ve à la lumière dans les expériences précédentes, j'ai tâché de le découvrir par le moyen de l'eau. J'ai présenté verticalement un bâton à une fontaine d'eau qui sortoit horizontalement dans l'air libre par une ouverture ronde d'un pouce environ de diamètre. Après avoir présenté le bâton à l'eau, j'ai vu qu'elle se divisoit en quatre parties. La plus grande partie couloit en bas, une petite partie se réfléchissoit & s'élevoit perpendiculairement le long du bâton au dessus du jet horizontal jusqu'à une certaine hauteur, après quoi elle tomboit; le reste se divisoit, pour ainsi dire, en deux branches, dont une alloit à droite, l'autre à gauche, & circulant avec une grande vitesse autour du Cylindre, formoit une espèce de Tourbillon cylindrique assés gros. Ces deux branches, après avoir fait chacune la moitié environ de la circonference du Cylindre, alloient se rencontrer presque à l'opposite, & tomboient en bas. Les mêmes apparences arrivoient, soit que le diamètre du bâton fût plus petit que l'ouverture par où l'eau s'écouloit, soit qu'il fût un peu plus grand. C'est sur cette expérience que je me suis fondé pour supposer que la lumière du Soleil pourroit former un Tourbillon semblable autour du Cylindre qu'on presente dans l'image du Soleil qui entre par le petit trou dans la chambre obscure.

Puisque donc l'eau, toute pesante qu'elle est dans l'air, ne tombe pas toute, lorsqu'elle rencontre le Cylindre, mais qu'il y en a une partie qui circule, & ne le quitte qu'après en avoir fait la moitié ou la plus gran-

grande partie du tour, on pourroit supposer qu'une partie de la lumière qui rencontre le Cylindre, circule autour du corps dans la lumière même.

Il paroît visible que cette circulation d'eau autour du Cylindre, vient de l'impulsion que font les parties de l'eau, les unes contre les autres, & que c'est une continuation du mouvement qu'elles avoient à la sortie du tuyau, lequel mouvement se continuë encore aux parties de l'eau dans le détour qu'elles sont obligées de prendre autour du Cylindre. De même les parties de lumière qui ont un mouvement infiniment plus rapide que l'eau, peuvent circuler autour du Cylindre, poussées tant par les parties qui le suivent que par celles qui sont à côté.

Outre les expériences rapportées jusqu'ici sur les ombres des corps cylindriques exposés aux rayons du Soleil dans une chambre obscure, on en a fait d'autres dont on se contentera de rapporter les principales.

J'ai placé deux cheveux qui se croisoient & se touchoient l'un l'autre. Les ombres de ces deux cheveux ayant été reçues à quelque distance du cheveu, paroissoient peintes réciproquement l'une sur l'autre, en sorte que la partie obscure de l'une se distinguoit sur la partie obscure de l'autre. Les bandes claires se croisoient ensemble & passaient par dessus les bandes noires; les autres petites bandes qui sont à chaque côté des claires, faisoient la même apparence.

Ayant placé une aiguille qui se croisoit avec un cheveu dans les rayons du Soleil, on voit dans leurs ombres reçues à la même

me distance les mêmes apparences que dans les ombres des deux cheveux, quoi-que l'ombre de l'aiguille fût plus forte & plus marquée, on voyoit les ombres du cheveu sur celle de l'aiguille, & les bandes claires de l'une sur les obscures de l'autre.

J'ai mis encore dans les rayons du Soleil une soye de Sanglier proche d'une plaque de fer d'une ligne de largeur, enforte qu'elles se touchoient & se croisoient obliquement, faisant d'un côté des angles aigus & des obliques de l'autre. Dans leurs ombres reçues à la même distance, on voyoit du côté où étoient les angles aigus, que les bandes claires & obscures de la soye entroient jusqu'au milieu de la largeur de l'ombre de la plaque, mais elles n'y entroient pas aussi sensiblement du côté des angles obtus, soit que la plaque fût exposée la première aux rayons du Soleil, soit qu'elle fût la dernière. La plaque faisoit alors une ombre assés noire, composée de six traits obscurs séparés l'un de l'autre par autant de traits plus clairs égaux aux noirs, comme nous avons déjà remarqué dans les experiences précédentes, de sorte que dans cette ombre noire on y distinguoit fort bien toutes les parties claires & obscures de l'ombre de la soye. (*Fig. 7.*)

Pour expliquer cette apparence, nous croyons que la lumière du Soleil glisse un peu le long de la soye, & par cette manière en éclaire une partie qui se trouve derrière la plaque, & n'est point exposée aux rayons directs du Soleil. Cette lumière qui glisse un peu le long de la soye, en prolonge les om-

DES SCIENCES. 1723. 195
ombres jusqu'au milieu de l'ombre de la petite plaque. Voilà de quelle manière on peut expliquer cette apparence. Cette explication peut servir aussi à rendre raison de deux autres que nous avons rapportées auparavant, & de diverses autres semblables que nous avons remarquées après le Pere Grimaldi.

*Experiences faites avec des Globes dans une
Chambre obscure.*

J'ai fait avec de petits globes les mêmes expériences que j'ai faites sur les petites plaques. J'ai donc exposé aux rayons du Soleil qui entroient par un petit trou dans une chambre obscure, une boule d'une ligne de diametre, placée à 25 pieds du trou; son ombre ayant été reçûe à 33 pieds de la boule, on voyoit au milieu une aire circulaire fort claire, ensuite un anneau étroit d'ombre affés obscur, lequel étoit suivi d'un anneau beaucoup plus large de penombre. Cette penombre étoit terminée par un second anneau étroit & obscur, dont le diametre étoit de 3 lignes; après cet anneau on voyoit un autre anneau affés large, de lumière vive, & ensuite les traits colorés de rouge, de violet & de bleu, comme dans les corps cylindriques, avec la seule difference que dans les globes ces apparences étoient circulaires, au lieu qu'elles étoient terminées par des lignes droites dans le corps cylindrique. (*Fig. 8.*)

J'ai fait d'autres expériences semblables avec des globes plus petits, & de plus grands
I 2 que

que le premier. Il y en avoit d'un quart de ligne, d'une demi-ligne; il y en avoit d'une ligne & demie, & de deux lignes & un quart; les ombres de toutes ces boules reçues à la même distance, avoient au milieu une aire circulaire de lumière qui étoit assés claire; mais cette aire avoit un différent diametre, suivant les différents diametres des globes qui les formoient; les aires claires des boules plus grosses, étant plus petites, & les aires des boules plus petites étoient plus grandes.

Cette aire de lumière que l'on voit au milieu des ombres des globes est sans doute une lumière qui reflue en grande abondance derrière le globe, & va éclairer cette partie. Les deux anneaux obscurs qui renferment l'anneau de penombre sont des parties d'ombre sans aucun mélange de lumière, & la penombre renfermée par ces deux anneaux est l'ombre du globe mêlée avec un peu de lumière qui reflue derrière le globe. Au reste les autres anneaux de lumière qui suivent se peuvent expliquer de la même manière que nous avons expliqué les bandes de lumière formées par des corps cylindriques.

La lumière plus grande au milieu des boules plus petites, fait voir qu'elle circule en plus grande abondance & plus facilement autour des petites boules qu'autour des grandes.

Si l'on compare presentement les ombres des petites boules avec celles des petits cylindres & des petites plaques, il est évident qu'il y a beaucoup plus de lumière dans les
om-

ombres des globes que dans celles des Cylindres, non seulement lorsque les uns & les autres sont d'un diamètre égal, mais lorsque le diamètre du globe est plus grand que le diamètre du Cylindre, les ombres de tous ces corps étant reçues à la même distance du corps opaque.

Il faut encore remarquer que nous n'avons pu appercevoir aucune distinction de lumière séparée de l'ombre dans les ombres des plaques qui avoient un peu plus d'une ligne de largeur, quoi-que ces ombres aient été reçues à des distances fort grandes, comme de 72 pieds; mais qu'ayant reçu à la même distance les ombres des globes, lesquels globes avoient jusqu'à 2 lignes & un quart de diamètre, on a vu une diversité de nuances dans leurs ombres.

Cette plus grande lumière que l'on a remarquée dans les ombres des globes que dans celles des Cylindres, vient de ce que les rayons du Soleil circulent plus facilement & en plus grande abondance autour des globes qu'autour des Cylindres & des plaques, parce que dans le globe ils ont plus de liberté de circuler tout autour, au lieu qu'ils ne peuvent refluer que des deux côtés du Cylindre, ainsi que nous l'avons déjà dit à l'occasion des expériences faites en plein soleil.

Après cette expériences je ne laisserai pas d'en rapporter encore d'autres qui ont été faites dans le dessein de découvrir, s'il étoit possible, l'origine de ces couleurs que l'on voit dans les ombres des aiguilles, quoi-que je n'aie pas pu jusqu'à présent me satisfaire sur cet article.

J'ai placé dans les rayons du Soleil qui entroient dans une chambre obscure deux ou trois aiguilles à différentes distances du trou, & à peu-près dans une même ligne droite, afin qu'une partie de l'ombre d'une aiguille tombât sur la partie de l'ombre de l'autre. Cela étant, j'ai remarqué que lorsque la bande claire formée par une aiguille tomboit sur la bande claire formée par une autre aiguille, cette double lumière jointe ensemble, formoit une bande plus claire que lorsqu'elles étoient séparées, comme il a été remarqué par M. *Newton* à l'occasion d'autres expériences qu'il a faites. De même lorsque la couleur qui formoit le bleu dans les deux ombres étoient jointes ensemble, cette couleur paroissoit beaucoup plus vive & plus éclatante que lorsqu'elles étoient séparées. Il arrivoit la même chose, lorsque les deux couleurs rouges se rencontroient ensemble, car elles formoient une belle couleur d'or.

Après avoir joint ensemble ces couleurs de même nature pour en former une plus vive, nous avons essayé de faire passer la bande claire d'une aiguille sur les différentes parties de l'ombre faite par une seconde aiguille, & j'ai remarqué que lorsque la bande claire d'une aiguille tomboit sur la penombre extérieure formée par l'autre aiguille, on voyoit une belle couleur de bleu celeste, à peu-près comme elle paroissoit quand on faisoit tomber les deux couleurs bleües ensemble. Et lorsque la même bande claire se rencontroit sur l'ombre plus forte du milieu, cette union formoit une couleur rouge; ce
qui

qui prouve en quelque manière que cette couleur rougeâtre qu'on voit au milieu des ombres d'un grand nombre d'aiguilles, peut venir du peu de lumière qui reflue dans cette ombre.

J'ai mis deux petites plaques de fer, larges chacune de 3 ou 4 lignes l'une proche de l'autre, desorte qu'il y avoit un petit intervalle entre deux. Les ayant exposées aux rayons du Soleil, & ayant reçu leurs ombres à 15 ou 20 pieds loin des plaques, il n'y avoit aucune lumière entre deux, mais on voyoit une ombre continuë, au milieu de laquelle paroissoient quatre traits d'une couleur de pourpre vive. Ces traits étoient parallèles entre eux, & séparés l'un de l'autre par d'autres traits noirs, distingués de ceux de couleur de pourpre par d'autres traits d'un vert fort foible & d'un jaune aussi pâle. M. *Delisle* a remarqué aussi des couleurs dans les traits de lumière & d'ombre qu'on voit dans les ombres reçues proche des corps.

Quelque attention que j'aye apporté pour faire exactement ces dernières expériences sur le mélange des couleurs, je ne promets pas d'avoir toujours rencontré juste, à cause de la difficulté qu'il y a de faire tomber précisément les parties d'une ombre sur des parties différentes de l'autre.

A l'occasion des couleurs formées par la reflexion des rayons du Soleil, j'ai répété l'expérience suivante, rapportée par le Pere *Grimaldi*. J'ai fait entrer dans une chambre obscure la lumière du Soleil par une ouverture, qui avoit environ un demi-pouce de diamètre. A la distance de 7 ou 8 pieds du

200 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
trou, j'ai présenté à la lumière du Soleil qui
entroit par ce trou, un corps cylindrique de
bois ou de cuivre d'un pouce de diametre;
j'ai appliqué ce Cylindre à l'image du Soleil,
desorte qu'une partie de cette image tom-
boit sur le Cylindre, l'autre tomboit dehors.
Dans cette situation il se faisoit une re-
flexion derayons du Soleil par le corps cy-
lindrique, & cette reflexion formoit une
traînée de lumière en manière de demi-cer-
cle, dont le centre étoit à l'endroit du Cy-
lindre où tomboit l'image du Soleil. Ayant
reçu sur un carton blanc une partie de cette
lumière reflechie, en quelque endroit que
ce fut de la demi-circonference, on voyoit
dans cette lumière une grande diversité de
couleurs toutes belles & vives. Ces cou-
leurs étoient du rouge, du violet, du jau-
ne, du bleu & du vert; desorte qu'étant re-
çûes sur le carton blanc, on auroit crû qu'il
étoit un de ces papiers marbrés de ces diffe-
rentes couleurs. Il n'y avoit que proche de
l'image du Soleil où cette lumière étoit plus
étroite & plus ramassée, qu'on ne voyoit
point ces couleurs, au moins distincte-
ment, mais seulement une lumière à peu-
près comme celle du Soleil.

Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 6.



Fig. 7.





Fig. 8.







*DES DIVERSES METHODES
de déterminer l'Apogée & le Perigée,
ou l'Aphélie & le Perihélie des Pla-
netes.*

Par M. CASSINI.

* **O**N fait que les Planetes ne sont pas toujours à égale distance du Soleil & de la Terre, autour desquels elles font leurs révolutions, mais qu'elles s'en trouvent tantôt plus tantôt moins éloignées; ce qui provient non seulement de ce que le Soleil ou la Terre ne sont pas précisément au centre de leur Orbe, mais aussi de ce que ces Orbes ne sont pas exactement circulaires.

Quelle que soit la figure de cet Orbe, il est certain qu'il y a un point où chaque Planete se trouve dans sa plus grande distance, que l'on appelle Apogée, lorsqu'on la considère à l'égard de la Terre, & Aphélie, lorsque c'est par rapport au Soleil; le point opposé de cet Orbe supposé régulier, s'appelle Perigée à l'égard de la Terre, & Perihélie par rapport au Soleil.

Il est aisé de reconnoître de quelle importance il est dans l'Astronomie de pouvoir déterminer exactement la situation de ces points.

points dans le Zodiaque, & leur distance à la Terre ou au Soleil, puisque c'est de-là principalement que l'on peut conjecturer la figure des Orbes des Planetes & leur mouvement veritable, qui sont les objets principaux de cette Science.

Mais autant que la connoissance exacte de la situation de ces points est necessaire, autant est-il difficile de la déterminer exactement. Car comme vers ces points la distance des Planetes à la Terre ou au Soleil, varie presque insensiblement, il est très-difficile de s'appercevoir du lieu précis où elles se trouvent à leur plus grande distance, & où elles commencent à s'approcher de la Terre & du Soleil, après s'en être éloignées le plus qu'il a été possible; ou bien le temps où elles commencent à s'éloigner de la Terre ou du Soleil, après s'en être approchées à leur plus petite distance.

Ainsi j'ai crû devoir exposer les principaux moyens que l'on peut employer pour parvenir à cette connoissance, en discernant ceux qui meritent la préférence, & quelles sont les circonstances où on peut s'en servir le plus utilement. Mais avant que d'exposer ces methodes, il est à propos de remarquer, que quoi-que nous convenions que la plupart des Planetes fassent leurs révolutions autour du Soleil qui se trouve à l'un des foyers de leur Orbe; cependant la situation où nous nous trouvons, nous oblige de les considerer par rapport à la Terre.

Pour ce qui est de la Lune, tous les Astronomes sont d'accord qu'elle fait sa révolution autour de la Terre, ainsi on par-

parlera de son Apogée & du Perigée.

A l'égard du Soleil, il est indifférent pour cette recherche de supposer qu'il tourne autour de la Terre, ou que la Terre fasse sa révolution autour de lui. Dans cette dernière supposition, on appellera Aphelie & Perihelie de la Terre, ce que l'on nomme vulgairement Apogée ou Perigée du Soleil.

Il n'en est pas de même des autres Planètes, il est nécessaire de déterminer leur Aphelie ou leur Perihelie, parce qu'elles tournent réellement autour du Soleil.

Comme leurs révolutions autour du Soleil, ne s'achevent pas en même temps que celle de la Terre autour du Soleil, ou du Soleil autour de la Terre, il suit qu'elles se trouvent plus près de la Terre dans des temps où elles sont plus éloignées du Soleil, & qu'au contraire elles paroissent s'éloigner de la Terre dans d'autres temps où elles s'approchent du Soleil. Ainsi nous ne pouvons déterminer leur distance au Soleil, qu'en réduisant leur distance à la Terre à celle qu'elles ont par rapport au Soleil.

Mais comme ces rapports de distances supposent des hypothèses astronomiques, & que la moindre erreur dans ces hypothèses en peut causer de fort grandes dans la détermination des Apogées qui demande une grande exactitude, nous avons jugé qu'on ne pouvoit employer sûrement que les occasions où le Soleil & la Planète se trouvent à l'égard de la Terre dans le même point du Zodiaque, ou dans celui qui lui est opposé; car alors il n'y a pas de difficulté d'assigner à la

Planete, vûë du Soleil, le même lieu où elle est apperçûë de la Terre.

Il est aisé de voir que le temps de ces Observations n'arrive que dans leurs conjonctions & oppositions avec le Soleil.

A l'égard des conjonctions, on ne peut pas appercevoir celles des Planetes superieures, telles que Saturne, Jupiter & Mars; car ou elles sont cachées derrière le Soleil, lorsque leur conjonction est presque centrale, ou bien sa lumière empêche de les appercevoir, lorsqu'elles passent en conjonction avec une latitude meridionale ou septentrionale plus grande que le demi-diametre du Soleil.

A l'égard des Planetes inferieures, elles passent toujours dans leurs conjonctions inferieures entre le Soleil & la Terre; c'est pourquoi on peut les appercevoir sur le disque du Soleil, lorsqu'elles ont très-peu de latitude, ce qui arrive cependant très-rarement. Lorsque leur latitude surpasse le demi-diametre du Soleil, elles passent dessus ou dessous en conjonction, & dans cet état on ne peut voir que Venus, car pour Mercure il est trop petit pour pouvoir être alors apperçû. On les distingue encore moins dans leurs conjonctions superieures, où elles passent derrière le Soleil, ou bien dessus ou dessous, à une trop grande distance de la Terre pour pouvoir en être apperçûes.

Pour ce qui est des oppositions des Planetes superieures, on les observe très-facilement, parce qu'elles arrivent au milieu de la nuit; & ce sont ces Observations qui arrivent à peine une fois dans chaque année,

dont

dont nous nous servons principalement pour déterminer leurs Aphelies & Perihelies.

Il faut aussi remarquer que quoi-que la Lune fasse sa révolution autour de la Terre; elle est sujette à des inégalités qui s'éloignent plus ou moins de la Terre en differents endroits de son Orbe; de sorte qu'on ne peut guere employer, pour déterminer son Apogée, que les Observations de ses conjonctions ou oppositions avec le Soleil, auquel temps elle n'a d'autre inégalité que celle qui resulte de son excentricité à l'égard de la Terre & de la figure de son Orbe.

Toutes ces remarques étoient necessaires pour juger que les Methodes que nous allons donner pour déterminer l'Apogée & le Perigée des Planetes, ne conviennent toutes qu'au Soleil; qu'il y en a dont on ne peut faire aucun usage pour les Planetes, & qui conduiroient même à l'erreur; & qu'ainsi il ne faut employer que celles qui conviennent dans certaines circonstances qu'on aura soin d'indiquer.

*Première Methode de déterminer l'Apogée
& le Perigée du Soleil.*

La première Methode qui se presente pour déterminer l'Apogée & le Perigée du Soleil, est d'observer le vrai lieu du Soleil, lorsque son diametre paroît le plus grand & le plus petit. Car par les regles de l'Optique, la grandeur apparente d'un même objet qui s'approche ou s'éloigne de nous, étant en proportion réciproque de ses diverses distances, il est évident que le Soleil est dans

son Apogée, lorsque son diametre nous paroît le plus petit, & qu'il est au contraire dans son Perigée, lorsqu'il nous paroît le plus grand.

Mais comme le Soleil, dans le temps de son passage par son Apogée & son Perigée, est plusieurs jours sans que son diametre paroisse augmenter ou diminuer sensiblement de grandeur, il faut l'observer par un Micrometre ou par des Reticules placés au foyer d'une Lunette, plusieurs jours avant & après, choisissant les heures auxquelles il se trouve à la même hauteur sur l'horison, afin d'éviter les erreurs causées par la parallaxe & la refraction. On comparera ensemble ces Observations, & en ayant trouvé deux où le diametre du Soleil a paru de la même grandeur, on partagera en deux parties égales l'intervalle qui s'est écoulé entre le temps de ces Observations, qui étant ajouté au temps de la première, donne le temps auquel le Soleil est arrivé à son Apogée ou à son Perigée.

On déterminera pour le temps de ces deux Observations le vrai lieu du Soleil qu'on peut calculer immédiatement par sa hauteur meridienne. Le milieu entre ces deux vrais lieux donne le vrai lieu de l'Apogée ou du Perigée du Soleil.

Il est aisé de reconnoître que cette methode ne peut être employée que pour déterminer l'Apogée & le Perigée du Soleil, de même que ceux de la Lune dans le temps seulement des oppositions, pour les raisons que nous avons déduites ci-dessus, & parce qu'il n'y a que ce temps-là qu'on peut apperce-

VOIE

voir le diametre entier de la Lune. A l'égard des autres Planetes, leur diametre apparent est si petit, qu'on ne pourroit pas y reconnoître de difference allés sensible.

Seconde Methode de déterminer l'Apogée & le Perigée du Soleil.

On observera plusieurs jours de suite la hauteur meridienne du bord superieur & du bord inferieur du Soleil avant son passage par l'Apogée ou le Perigée. Corrigeant ces hauteurs par la refraction & la parallaxe, on aura la grandeur veritable du diametre du Soleil, & sa déclinaison pour le jour de chaque Observation. On cherchera ensuite le jour auquel le diametre du Soleil ainsi corrigé a paru après son passage par l'Apogée ou le Perigée, de la même grandeur que dans une Observation précédente. La déclinaison du Soleil étant connue, on trouvera par la Trigonometrie spherique le vrai lieu du Soleil pour le temps des deux Observations correspondantes. La difference étant partagée en deux parties égales, & ajoûtée au vrai lieu du Soleil pour le jour de la première Observation, donne le vrai lieu de son Apogée ou de son Perigée.

Cette methode ne peut pas être employée pour les Planetes, par les raisons que nous avons alleguées ci-dessus.

Troisième Methode de déterminer l'Apogée & le Perigée du Soleil.

Ayant placé au foyer d'une Lunette un fil
ver-

vertical, on mesurera le temps que le Soleil employe à passer par le Meridien en diverses saisons de l'année, & on convertira ce temps en degrés, minutes & secondes à raison de 15 degrés par heure.

Comme le Soleil décrit par son mouvement journalier un Cercle parallele à l'Equateur, dont les degrés diminuent de grandeur à mesure que la déclinaison à l'égard de l'Equateur va en augmentant, il arrive que son diametre occupe alors un plus grand arc de ce parallele; c'est pourquoi il faut réduire le temps de son passage, converti en degrés & minutes de son parallele, en degrés & minutes d'un grand cercle de la Sphere, en faisant comme le sinus total est au sinus du complement de la déclinaison du Soleil au temps de l'Observation; ainsi les minutes & secondes de degré que le diametre du Soleil occupe sur le parallele, sont aux minutes & secondes d'un grand cercle qu'occupe le diametre du Soleil pris sur l'Equateur.

On choisira deux Observations correspondantes, dans lesquelles le diametre du Soleil ainsi réduit, se trouve de la même grandeur; & on calculera par le moyen de la déclinaison du Soleil son vrai lieu dans ces deux différentes situations. La différence étant partagée en deux parties égales, & ajoutée au vrai lieu du Soleil pour le temps de la première Observation, donne le vrai lieu de l'Apogée ou du Perigée du Soleil.

Cette methode, de même que les deux précédentes, ne peut être employée que pour déterminer l'Apogée & le Perigée du

Soleil, & elle a cet avantage, qu'elle n'est point sujette à aucune variation causée par la refraction & la parallaxe.

Quatrième Methode de déterminer l'Apogée & le Perigée du Soleil.

On observera plusieurs jours de suite en diverses saisons de l'année la hauteur meridienne du Soleil, qui étant corrigée par la refraction & la parallaxe, & comparée à la hauteur de l'Equateur, donnera la déclinaison du Soleil pour les jours de ces différentes Observations. Cette déclinaison étant déterminée, & connoissant l'obliquité de l'Ecliptique, que l'on suppose de $23^{\circ} 29' 0''$, on calculera par la Trigonometrie spherique le vrai lieu du Soleil pour le temps de chaque Observation.

Ayant ainsi connu le mouvement vrai du Soleil pendant l'intervalle d'un ou de plusieurs jours, on cherchera dans une autre saison, le temps où le mouvement vrai du Soleil a été égal à celui qu'on lui a reconnu pendant le même nombre de jours, la différence entre le vrai lieu du Soleil déterminé par les Observations correspondantes étant partagée en deux également, & ajoutée au vrai lieu du Soleil de la première Observation, donne le vrai lieu de l'Apogée & du Perigée du Soleil.

Lorsque le mouvement vrai du Soleil en longitude pendant un certain nombre de jours est plus grand ou plus petit que dans le même nombre de jours correspondants, on comparera les Observations des jours qui
pré-

210 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
précédent ou suivent immédiatement, & son
telles que dans un pareil nombre de jours la
quantité du mouvement du Soleil soit plus
grande ou plus petite que dans la première
comparaison. On déterminera l'Apogée ou
le Perigée du Soleil qui résulte de ces Ob-
servations, & on aura la différence entre les
deux déterminations de l'Apogée, dont on
prendra la partie proportionnelle qui con-
vient à la différence quantité du mouvement,
qu'il faut appliquer au lieu de l'Apogée ou du
Perigée trouvé par la première détermina-
tion, pour avoir le vrai lieu de l'Apogée &
du Perigée du Soleil.

Cette méthode suppose que la différence
entre le temps vrai & le temps moyen dans
l'intervalle des premières Observations, est
égale à la différence entre le temps vrai & le
temps moyen dans l'intervalle des Obser-
vations correspondantes, ou qu'elle n'en diffe-
re pas sensiblement. Car autrement il fau-
dra réduire le temps vrai de chaque interval-
le en temps moyen. On prendra le mou-
vement du Soleil qui convient à la différen-
ce entre le temps moyen de chacun de ces
intervalles qu'on retranchera du vrai mou-
vement observé dans le plus grand interval-
le. On comparera ensuite ces vrais mou-
vemens de la manière qu'on vient de l'ex-
pliquer pour déterminer le vrai lieu de l'A-
pogée & du Perigée du Soleil.

Il est aisé de reconnoître que cette me-
thode demande un grand nombre d'Obser-
vations de hauteurs méridiennes du Soleil,
afin de pouvoir choisir celles qui sont les
plus propres pour cette détermination, les-
quel-

quelles doivent être éloignées les unes des autres, afin que les différences entre les mouvemens observés soient plus sensibles.

On peut l'employer aussi pour la Lune & les autres Planetes, pourvû qu'on ait assés d'Observations pour trouver des intervalles égaux où le mouvement vrai d'une Planete avant & après son passage par l'Apogée ou le Perigée soit de la même quantité.

E X E M P L E.

Le 29 Janvier de l'année 1717, la hauteur meridienne apparente du Soleil a été observée de $23^{\text{d}} 36' 15''$, ce qui donne sa déclinaison meridionale à midi de $17^{\text{d}} 52' 0''$, & sa longitude de $309^{\text{d}} 39' 8''$.

Le 14 Mai suivant, la hauteur meridienne apparente du bord supérieur du Soleil a été observée de $60^{\text{d}} 5' 50''$, ce qui donne sa déclinaison septentrionale de $18^{\text{d}} 39' 38''$, & sa longitude de $53^{\text{d}} 24' 46''$.

La difference entre ces deux longitudes est de $103^{\text{d}} 45' 38''$, qui mesurent le vrai mouvement du Soleil dans l'intervalle de 104 jours, depuis le 29 Janvier jusqu'au 14 Mars de l'année 1717.

Le 13 Août de la même année, la hauteur meridienne du bord supérieur du Soleil a été observée de $56^{\text{d}} 5' 20''$, ce qui donne sa déclinaison septentrionale de $14^{\text{d}} 42' 2''$, & sa longitude de $140^{\text{d}} 26' 40''$.

Le 26 Novembre suivant, la hauteur meridienne du bord supérieur du Soleil a été observée de $20^{\text{d}} 27' 50''$, ce qui donne sa dé-

dé-

212 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
déclinaison meridionale de $21^{\text{d}} 0' 35''$, &
sa longitude de $244^{\text{d}} 7' 19''$.

Le mouvement du Soleil en longitude dans
le même intervalle de 104 jours, depuis le
13 Août jusqu'au 26 Novembre 1717, a donc
été de $103^{\text{d}} 40' 39''$, plus petit de 4 minutes
59 secondes que depuis le 29 Janvier jusqu'au
14 Mai de la même année.

La difference entre le temps vrai & le mo-
yen dans le premier intervalle est de $17' 48''$,
plus grande seulement d'une minute 8 secon-
des que dans le second intervalle, auxquels
il répond 3 secondes de vrai mouvement
qu'il faut retrancher du mouvement vrai du
Soleil, déterminé dans le premier intervalle
de $103^{\text{d}} 45' 38''$, & on aura $103^{\text{d}} 45' 35''$.

Comparant l'Observation du 14 Mai, où
la longitude du Soleil étoit de $53^{\text{d}} 24' 46''$,
avec celle du 13 Août, où on l'a trouvée
de $140^{\text{d}} 26' 40''$, on aura le vrai mouvement
du Soleil dans cet intervalle de $87^{\text{d}} 1' 54''$,
dont la moitié $43^{\text{d}} 30' 57''$, étant ajoutée à
 $53^{\text{d}} 24' 46''$, donne $96^{\text{d}} 55' 43''$.

Comme dans ces Observations, le mou-
vement du Soleil en longitude dans le pre-
mier intervalle de $103^{\text{d}} 45' 35''$ est plus grand
de $4' 56''$ que celui qui a été observé de
 $103^{\text{d}} 40' 39''$ depuis le 13 Août jusqu'au 26
Novembre, on examinera les Observations
des jours suivans, & on trouvera que le
14 Août la hauteur meridienne apparente du
bord supérieur du Soleil a été observée de
 $55^{\text{d}} 49' 30''$, ce qui donne sa déclinaison
septentrionale de $14^{\text{d}} 23' 11''$, & sa longitu-
de de $141^{\text{d}} 25' 36''$.

Le 27 Novembre suivant, la hauteur me-
ri-

ridienne du bord supérieur du Soleil étoit de $20^{\text{d}} 16' 30''$, ce qui donne sa déclinaison meridionale de $21^{\text{d}} 12' 7''$, & sa longitude de $245^{\text{d}} 10' 19''$.

La différence entre la longitude du Soleil du 14 Mai & du 27 Novembre, mesure son mouvement vrai dans cet intervalle qui est de $103^{\text{d}} 44' 43''$, plus grand de $4' 4''$, que depuis le 13 Août jusqu'au 26 Novembre, & plus petit de 52 secondes que depuis le 29 Janvier jusqu'au 14 Mai.

Comparant l'Observation du 14 Mai, où la longitude étoit de $53^{\text{d}} 24' 46''$ avec celle du 14 Août où on l'a trouvée de $141^{\text{d}} 25' 36''$, on aura le mouvement du Soleil dans cet intervalle de $88^{\text{d}} 0' 50''$, dont la moitié $44^{\text{d}} 0' 25''$ étant ajoutée à $53^{\text{d}} 24' 46''$, donne $97^{\text{d}} 25' 11''$.

Comme la différence entre le mouvement du Soleil qui résulte des Observations des 14 & 27 Novembre est encore plus petite de 52 secondes que celle qui résulte des Observations des 29 Janvier & 14 Mai, on voit que le vrai lieu de l'Apogée doit être au delà de la dernière détermination ; c'est pourquoi l'on fera comme $4' 4''$ différence, dont le mouvement du Soleil en longitude depuis le 14 Août jusqu'au 27 Novembre est plus grand que son mouvement depuis le 13 Août jusqu'au 26 Novembre, sont à 52 secondes différence, dont le mouvement en longitude depuis le 14 Août jusqu'au 27 Novembre est plus petit que depuis le 29 Janvier jusqu'au 14 Mai ; ainsi $29' 28''$, différence entre l'Apogée du Soleil qui résulte des deux comparaisons précédentes, sont à $6' 17''$ qu'il faut

faut ajoûter au lieu de l'Apogée trouvé par la dernière détermination de $97^{\text{d}} 25' 11''$, pour avoir le vrai lieu de l'Apogée du Soleil en 1717 à $7^{\text{d}} 31' 28''$ de l'Ecreviffe.

Il est aisé de voir jusqu'à quelle précision on peut déterminer le vrai lieu de l'Apogée par cette methode, puisque dans cet exemple une difference de 52 secondes dans le vrai lieu du Soleil, en cause une de $6' 17''$ dans la détermination de l'Apogée du Soleil, ce qui est à raison de $14' 30''$ pour deux minutes de difference dans le vrai lieu du Soleil, qui est une erreur beaucoup plus grande que celle qui peut resulter des Observations faites avec précision. Ainsi l'on peut s'assurer que par cette methode on déterminera le vrai lieu de l'Apogée à moins d'un quart de degré près, & même avec beaucoup plus d'exactitude, si l'on n'y emploie que des Observations choisies & faites dans les circonstances convenables, en assés grand nombre pour rectifier les unes par les autres.

Cinquième Methode de déterminer l'Apogée & le Perigée du Soleil.

On observera en diverses saisons de l'année, le passage par le Meridien du Soleil & d'une Etoile fixe, dont l'ascension droite est connue. Réduisant en degrés la difference entre ces passages, à raison de 15 degrés par heure, on aura la difference entre l'ascension droite du Soleil & celle de cette Etoile au temps de son passage par le Meridien, qu'il faut ajoûter à l'ascension droite de
l'E-

l'Etoile, lorsque son passage précède celui du Soleil, & qu'il faut retrancher de l'ascension droite de l'Etoile, lorsque son passage suit celui du Soleil, & on aura l'ascension droite du Soleil au temps du passage de l'Etoile par le Meridien, avec laquelle on trouvera la longitude véritable du Soleil pour ce temps.

On déterminera de la même manière la longitude véritable du Soleil pour le jour suivant, ou tel autre que l'on voudra, & l'on aura le mouvement vrai du Soleil pendant un certain nombre de jours.

On trouvera par la même méthode, dans une autre saison, le vrai lieu du Soleil, & l'on cherchera le temps où le mouvement du Soleil en longitude est égal à son mouvement observé pendant le même nombre de jours. La différence entre le vrai lieu du Soleil qui résulte des Observations correspondantes, étant partagée en deux également, & ajoutée à la première Observation, donne le vrai lieu de l'Apogée & du Périgée du Soleil.

Lorsque le mouvement vrai du Soleil, pendant ces deux intervalles de temps égaux, n'est pas précisément de la même quantité, on comparera les Observations des jours qui précèdent ou suivent immédiatement, & sont telles que la quantité du mouvement comprise dans un même intervalle de temps, soit plus grande ou plus petite que dans la première comparaison, on déterminera l'Apogée ou le Périgée du Soleil qui résulte de ces Observations, & on aura la différence entre les deux déterminations de l'Apogée, dont

dont on prendra la partie proportionnelle qui convient à la différente quantité du mouvement, qu'il faut appliquer au lieu de l'Apogée ou du Perigée trouvé par la première détermination, pour avoir le vrai lieu de l'Apogée ou du Perigée du Soleil.

On peut se servir, pour cette détermination, de différentes Etoiles fixes, & au cas que l'on ne connoisse point exactement leur ascension droite, il faudra observer la hauteur meridienne du Soleil dans les temps où sa déclinaison varie considérablement d'un jour à l'autre, & calculer son ascension droite, à laquelle on ajoutera le mouvement du Soleil en ascension droite qui convient à la différence entre le passage du Soleil & de l'Etoile par le Meridien, lorsque le passage de l'Etoile est après midi, & de laquelle on retranchera ce mouvement, lorsque l'Etoile a passé le matin, & on aura l'ascension droite véritable du Soleil au temps du passage de l'Etoile par le Meridien. Y ajoutant la différence entre le passage du Soleil & de l'Etoile par le Meridien, réduite en degrés, lorsque l'Etoile a passé par le Meridien après midi: ou le retranchant, lorsque son passage est avant midi, on aura l'ascension droite véritable de l'Etoile, avec laquelle on déterminera le vrai lieu de l'Apogée ou du Perigée du Soleil, de la manière qu'on l'a expliquée ci-dessus.

E X E M P L E.

Le passage de Sirius par le Meridien a été observé le 21 Mai de l'année 1717
à

à 2^h 40' 20", & le 22 Mai à 2^h 36' 20".

Réduisant ces heures en degrés, on aura la différence d'ascension droite entre le Soleil & cette Etoile le 21 Mai de 40^d 5' 0", & le 22 Mai de 39^d 5' 0", qui étant retranchés de l'ascension droite de cette Etoile qui étoit alors de 98^d 11' 3", à cause que son passage a suivi celui du Soleil, donne l'ascension droite du Soleil le 21 Mai 1717 à 2^h 40' 20" de 58^d 6' 3", & le 22 Mai à 2^h 36' 20" de 59^d 6' 3", par le moyen desquelles on trouvera la longitude du Soleil le 21 Mai 1717 à 2^h 40' 20" de 60^d 16' 44", & le 22 Mai à 2^h 36' 20" de 61^d 14' 15". La différence, qui est de 57^d 31', mesure le vrai mouvement du Soleil dans l'intervalle de 23^h 56' 0".

Le 6 Août suivant, le passage de la luisante de l'Aigle par le Meridien a été observé à 10^h 30' 27" $\frac{1}{2}$, & le 7 Août à 10^h 26' 38".

Réduisant ces heures en degrés, on aura la différence d'ascension droite entre le Soleil & cette Etoile le 6 Août de 157^d 36' 52" $\frac{1}{2}$, & le 7 Août de 156^d 39' 30", qui étant retranchés de l'ascension droite de la luisante de l'Aigle qui étoit alors de 294^d 13' 44", donne l'ascension droite du Soleil le 6 Août 1717 à 10^h 30' 27" $\frac{1}{2}$ du soir de 136^d 36' 51" $\frac{1}{2}$, & le 7 Août à 10^h 26' 38" de 137^d 34' 14", par le moyen desquelles on trouvera la longitude du Soleil le 6 Août 1717 à 10^h 30' 27" $\frac{1}{2}$ du soir de 134^d 8' 18" $\frac{1}{2}$, & le 7 Août à 10^h 26' 38" $\frac{1}{2}$ de 135^d 5' 50". La différence qui est de 57' 31" $\frac{1}{2}$, mesure le mouvement vrai du Soleil en longitude pendant l'intervalle de 23^h 56' 10", avec une différence de 10 se-

condes dans le temps, & d'une demi-seconde dans le mouvement, de ce qui a été trouvé entre l'Observation du 21 & 22 Mai.

Négligeant ces différences qui sont insensibles, & qui d'ailleurs se compensent l'une l'autre, on trouvera qu'au temps de la première Observation la longitude du Soleil étoit de $60^{\text{d}} 16' 44''$. & au temps de la dernière de $135^{\text{d}} 5' 50''$. La différence, qui est de $74^{\text{d}} 49' 6''$, étant partagée en deux parties égales, on aura $37^{\text{d}} 24' 33''$, qui étant ajoutés à $60^{\text{d}} 6' 44''$, donne le lieu de l'Apogée du Soleil à $7^{\text{d}} 41' 17''$ de l'Ecrevisse.

Si l'on suppose présentement, que l'ascension droite de ces deux Etoiles n'est pas connue, on trouvera par l'Observation de la hauteur meridienne du Soleil sa déclinaison septentrionale le 21 Mai à midi de $20^{\text{d}} 12' 51''$, & le 22 Mai à midi de $20^{\text{d}} 25' 31''$, ce qui donnera sa déclinaison le 21 Mai à $2^{\text{h}} 40' 20''$, temps du passage de Sirius par le meridiem de $20^{\text{d}} 14' 45''$, avec laquelle on trouvera sa longitude de $60^{\text{d}} 16' 31''$, & son ascension droite de $58^{\text{d}} 5' 48''$. Y ajoutant $40^{\text{d}} 5' 0''$, qui répondent à $2^{\text{h}} 40' 20''$, différence entre le passage du Soleil & de Sirius par le Meridien, on aura l'ascension droite de cette Etoile le 21 Mai à $2^{\text{h}} 40' 20''$ de $98^{\text{d}} 10' 48''$.

Le 22 Mai le passage de Sirius par le Meridien fut observé à $2^{\text{h}} 36' 20''$, qui étant converties en degrés, font $39^{\text{d}} 5''$, qui étant retranchés de $98^{\text{d}} 10' 48''$, donne l'ascension droite du Soleil le 22 Mai à $2^{\text{h}} 36' 20''$.

20" de 59^d 5' 48", avec laquelle on trouvera sa longitude de 61^d 14' 2".

La difference entre cette longitude & celle du jour précédent est de 57' 31" qui mesurent le vrai mouvement du Soleil dans l'intervalle de 23^h 56' 0".

Le 6 Août suivant la déclinaison septentrionale du Soleil a été observée à midi de 16^d 43' 46", & le 7 Août de 16^d 27' 26", ce qui donne la déclinaison du Soleil le 6 Août à 10^h 30' 27" $\frac{1}{2}$, temps du passage de l'Aigle par le Meridien de 16^d 36' 37", avec laquelle on trouvera le vrai lieu du Soleil de 134^d 9' 42" $\frac{1}{2}$, & son ascension droite de 136^d 38' 16". Y ajoûtant 157^d 36' 52" $\frac{1}{2}$ qui répondent à 10^h 30' 27" $\frac{1}{2}$, difference entre le passage du Soleil & de l'Aigle par le Meridien, on aura l'ascension droite de cette Etoile le 6 Août de 294^d 15' 8" $\frac{1}{2}$.

Le 7 Août le passage de l'Aigle par le Meridien fut observé à 10^h 26' 38" $\frac{1}{2}$, qui étant converties en degrés, font 156^d 39' 30", qu'il faut retrancher de 294^d 15' 8" $\frac{1}{2}$ pour avoir l'ascension droite du Soleil le 7 Août à 10^h 26' 38" de 137^d 35' 38" $\frac{1}{2}$, avec laquelle on trouvera le vrai lieu du Soleil le 7 Août à 10^h 26' 38" de 135^d 7' 14". La difference entre cette longitude & celle du jour précédent est de 57' 31" $\frac{1}{2}$ qui mesurent le vrai mouvement du Soleil dans l'intervalle de 23^h 56' 10".

Négligeant ces petites differences qui sont compensées en partie l'une par l'autre, on trouvera au temps de la première Observation la longitude du Soleil de 60^d 16' 31", & au temps de la seconde de 135^d 7' 14". Pre-

nant un milieu, on aura le vrai lieu de l'Apogée du Soleil à $7^{\text{d}} 41' 52''$ de l'Ecreviffe, peu different de celui que l'on a trouvé par la comparaifon précédente.

Cette methode a beaucoup de rapport à la précédente, en ce que l'on y emploie le vrai lieu du Soleil, déterminé dans des intervalles égaux avant & après fon paffage par fon Apogée ou fon Perigée; mais elle a cet avantage, que dans la quatrième methode il étoit néceffaire dans chaque Observation de déterminer le vrai lieu du Soleil par le moyen de fa déclinaifon, ce qui oblige de choisir des temps où cette déclinaifon varie confiderablement d'un jour à l'autre, pour avoir plus exactement fon mouvement en longitude; au lieu que dans celle-ci, l'afcenfion droite d'une Etoile étant une fois déterminée exactement par des Observations choisies, on peut connoître le vrai lieu du Soleil, & par conféquent fon vrai mouvement dans tous les temps de l'année avec une affés grande exactitude. Car comme on ne fuppofe par cette methode que l'afcenfion droite de l'Etoile connue, & la différence entre le paffage du Soleil & de cette Etoile par le Meridien, toute l'erreur qui peut fe trouver dans cette détermination doit provenir de ces deux caufes.

A l'égard de celle qu'il peut y avoir dans l'afcenfion droite de l'Etoile, elle ne peut gueres monter qu'à une minute, & elle n'en a caufe qu'une de la même quantité dans la détermination de l'Apogée.

Pour ce qui eft de la différence entre les paffages, quand même on la fupporeroit de deux

deux secondes, qui est une erreur plus grande que celle qui peut resulter des Observations faites avec précision, cela n'en causeroit qu'une de 3 ou 4 minutes dans l'exemple qui a été rapporté dans la quatrième Methode, ce qui est une exactitude plus grande que celle à laquelle on a cru jusqu'à présent pouvoir parvenir dans la détermination du vrai lieu de l'Apogée & du Perigée.

Sixième Methode de déterminer l'Apogée & le Perigée du Soleil, ou l'Aphélie ou le Perihélie des Planetes, & l'Excentricité de leurs Orbes.

Les methodes que nous venons de proposer, demandent des Observations choisies, faites à distance égale de part & d'autre de l'Apogée & du Perigée, & qu'on ne peut par consequent employer qu'en comparant ensemble un grand nombre d'Observations.

C'est pourquoi nous en donnerons ici une qui a été inventée par mon Pere, & rapportée dans le Journal des Savans du mois de Novembre de l'année 1669, par laquelle on peut déterminer immédiatement le vrai lieu de l'Aphélie & du Perihélie des Planetes dans l'hypothese elliptique, y employant seulement trois Observations faites dans des temps differents.

* Ayant décrit un cercle $MBND$ à volonté, on prendra de C vers B , l'arc CB égal à la difference entre le vrai lieu d'une Planete

nete déterminé par les deux premières Observations, & l'arc BA égal à la différence entre le vrai lieu de cette Planete, déterminé par la seconde & la troisième Observation. Du point B , on menera par le centre L du cercle $MBND$, le diametre BLD qui rencontrera sa circonference au point D . Le mouvement moyen de la Planete étant connu, on prendra du point D vers C l'arc DF égal au moyen mouvement du Soleil qui répond à l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre la première & la seconde Observation, & du point D vers A l'arc DE égal au moyen mouvement depuis la seconde jusqu'à la troisième Observation. On menera du point D aux points C & A , les lignes DC , DA , qui couperont les lignes BF , BE , aux points G & H , par lesquels on menera la ligne GH .

Du point B , on abaissera HG la perpendiculaire BI , & du point I , on menera par le centre L le diametre $MILN$, sur lequel on prendra IO égal à IL . L'angle BIM mesurera la distance de la Planete à son Aphelie dans le temps de la seconde Observation. Le point I sera le centre de l'Ellipse que le Soleil décrit par son mouvement propre, dont le grand axe sera égal au diametre MN , le point L sera un des foyers de l'Ellipse, & représentera le centre du vrai mouvement où le Soleil est placé, & le point O , l'autre foyer autour duquel la Planete parcourt son moyen mouvement.

On peut employer de la même manière un plus grand nombre d'Observations faites avant & après celle qui a été marquée la
se-

seconde, en tirant des extremités B & D du diametre BD , aux points de la circonferen-
ce qui marquent les mouvemens vrais &
moyens du Soleil, des lignes dont les inter-
sections doivent toutes se rencontrer sur la
ligne HG prolongée de part & d'autre, s'il
est necessaire.

D É M O N S T R A T I O N .

L'angle BHA externe est égal à l'angle
 BDA , moitié de l'angle au centre BLA ,
qui mesure le mouvement vrai de la Planete
depuis la seconde jusqu'à la troisième Obser-
vation, & à l'angle DBE , moitié de l'angle
 DLE qui mesure son moyen mouvement ;
c'est-à-dire, au milieu arithmetique entre le
vrai & le moyen mouvement.

L'angle BGC externe est égal à l'angle
 BDC , moitié de l'angle BLC qui mesure
le mouvement vrai de la Planete depuis la
première jusqu'à la seconde Observation, &
à l'angle DBF , moitié de l'angle DLF qui
mesure son moyen mouvement.

Du point B soit mené aux points A & C
les lignes BA , BC . L'angle BAH ou
 BAD qui est dans le demi-cercle BAD est
droit; l'angle BIH est aussi droit par la con-
struction; c'est pourquoi les points $B A H I$
sont dans un cercle dont le diametre est BH .
L'angle BIA qui soutend l'arc BA est donc
égal à l'angle BHA qui soutend le même
arc BA , & a été trouvé égal au milieu a-
rithmetique entre le vrai & le moyen mou-
vement.

On trouvera de même que les angles BCD ou BCG & BIG étant droits, les points $BIGC$ sont dans un cercle, & que l'angle BIC qui soutend l'arc BC est égal à l'angle BGC qui a été trouvé égal au milieu arithmétique entre le vrai & le moyen mouvement.

Du point I comme centre & de l'intervalle IV égal à LM soit décrit le cercle VPT . Soit fait l'angle BIR égal à l'angle IBL , & soit prolongé IR jusqu'à ce qu'il rencontre le cercle VPI en P . Joignez LP , & du point O menez à IP la parallèle OS qui rencontre en S le rayon SB prolongé, s'il est nécessaire.

Les angles IBL , BIP , étant égaux par la construction, les côtés BR & RI sont aussi égaux; les retranchant des rayons LB , IP , des cercles égaux $MBND$, VPT , on aura les côtés PR , RL , du triangle PRL égaux. Les angles RPL , RLP , seront donc égaux entr'eux, mais l'angle IRL externe est égal à la somme des angles RPL , RLP , & à la somme des angles IBL , BIP . Les quatre angles RPL , RLP , IBL , BIP , seront donc égaux entr'eux, & la ligne PL sera parallèle à la ligne BI . Maintenant à cause des parallèles OS , IP ; SL est à RL ou PR qui lui est égal comme SO est à RI , comme OL est à IL . Mais OL est double de IL , donc SL est double de RL ou PR , & SO est double de RI ; donc SL plus SO est double de PR plus RI , c'est-à-dire du rayon PI qui est égal à la moitié du diamètre VT . Le point S est donc sur une Ellipse, dont le grand axe

axe est VT , & dont les foyers sont aux points O & L .

On démontrera de même que si l'on fait l'angle CIK égal à l'angle ICL , & l'on mène OQ parallèle à IK , qui rencontre LC prolongé, s'il est nécessaire en Q ; le point Q est sur une Ellipse dont le grand axe est VT , & les foyers O & L .

Si l'on ajoute presentement à l'angle SLQ ou BLC qui par la construction mesure l'arc BC du vrai mouvement du Soleil l'angle PLB ; on aura l'angle CLP ou CXB qui lui est égal à cause des paralleles BL , BIX . Ajoûtant à l'angle CXB l'angle ICL ou ICX , on aura l'angle BIC ou BGC qui lui est égal, que l'on a démontré mesurer le milieu arithmetique entre le vrai & le moyen mouvement du Soleil.

Si l'on ajoûte de même à l'angle BIC l'angle PLB ou PIB qui lui a été démontré égal, on aura l'angle PIC , auquel si l'on ajoûte l'angle ICL ou CIK qui lui est égal par la construction, on aura l'angle PIK qui à cause des paralleles OS , IP & OQ , IK , est égal à l'angle SOQ . La difference entre l'angle BLC ou SLQ du vrai mouvement, & l'angle BIC milieu arithmetique entre le vrai & le moyen mouvement est donc égale à la difference entre cet angle BIC & l'angle SOQ , lequel représentera par consequent dans l'hypothese elliptique le moyen mouvement qui se fait autour d'un des foyers O de l'Ellipse VST , pendant que le vrai mouvement se fait autour de l'autre foyer L qui represente le centre du Soleil. La ligne VT qui passe par

les foyers L & O fera donc l'axe de l'Ellipse que la Planete décrit par sa révolution, dont l'extrémité V du côté du point O représente son Aphelie, & l'extrémité T son Perihelie. L'angle VOS mesurera la distance moyenne de la Planete à son Aphelie, & l'angle VLS sa distance veritable, qui étant retranchée du vrai lieu du Soleil déterminé en S , donne le vrai lieu de son Aphelie: ce qu'il falloit chercher.

On peut déterminer geometriquement par cette methode le vrai lieu de l'Aphelie des Planetes & leur excentricité, en décrivant une grande figure divisée exactement, & choisissant la détermination qui résulte des Observations qui paroissent avoir été faites avec le plus d'exactitude. Mais comme il seroit difficile de déterminer par ce moyen les Aphelies des Planetes & leur excentricité avec toute la précision que l'on peut souhaiter, on les trouvera par le calcul en cette manière.

E X E M P L E.

Le 5 Mai de l'année 1690 la vraie opposition de Saturne avec le Soleil est arrivée à *Paris* à 6^h 32' du soir. Le vrai lieu du Soleil étoit alors de 1^s 15^d 33", ce qui donne le vrai lieu de Saturne de 7^s 15^d 33' 30".

Le 15 Juillet de l'année 1696 la vraie opposition de Saturne est arrivée à 1^h 0' après midi, son vrai lieu étant de 9^s 23^d 46' 0".

Le 12 Octobre de l'année 1703 la vraie op-

opposition de Saturne est arrivée à $20^h\ 12'$ après midi, son vrai lieu étant de $os\ 19^d\ 14'\ 20''$.

Le mouvement vrai du Soleil dans l'espace de six années, dont deux Bissextiles, 70 jours $18^h\ 28'$ depuis le 5 Mai 1690 à $6^h\ 32'$ du soir jusqu'au 15 Juillet 1696 à $1^h\ 0'$, a donc été de $68^d\ 12'\ 30''$, & ce vrai mouvement dans l'espace de sept années communes 89 jours $19^h\ 12'$ depuis le 15 Juillet 1696 à $1^h\ 0'$ jusqu'au 12 Octobre 1703 à $20^h\ 12'$ a été de $85^d\ 28'\ 20''$.

Soit pris sur le cercle $M B A D$ l'arc BC de $68^d\ 12'\ 30''$, & l'arc BA de $85^d\ 28'\ 20''$, & ayant tiré le diamètre BLD , soit pris l'arc DF de $75^d\ 44'\ 8''$ égal au moyen mouvement de Saturne qui convient à six années communes 72 jours $18^h\ 28'$, & l'arc DE de $88^d\ 31'\ 20''$ égal au moyen mouvement de cette Planete qui répond à 7 années 89 jours $19^h\ 12'$.

L'angle BDC à la circonference, étant la moitié de l'angle BLC au centre qui mesure l'arc BC de $68^d\ 12'\ 30''$, sera de $34^d\ 6'\ 15''$. L'angle DBF à la circonference étant la moitié de l'angle DLF qui mesure l'arc DF de $75^d\ 44'\ 8''$, sera de $37^d\ 52'\ 4''$, & par conséquent dans le triangle BGD , dont les angles BDC ou BDG , & DBF ou DBG sont connus, & le côté BD est égal au double du rayon supposé de 10000, on trouvera le côté BG de 117930.

L'arc BA étant de $85^d\ 28'\ 20''$, & l'arc DE de $88^d\ 31'\ 20''$, on aura l'angle BDA de $42^d\ 44'\ 10''$, & l'angle DBE de $44^d\ 15'\ 40''$, & par conséquent dans le triangle

BHD , dont les angles BDH & DBH sont connus aussi-bien que le côté BD , on trouvera le côté BH de 135911. Maintenant dans le triangle GBH , dont les côtés BG , BH , sont connus, & l'angle compris GBH est de $82^{\text{d}} 7' 44''$ égal à la somme des angles DBG & DBH , on trouvera l'angle BHG de $44^{\text{d}} 17' 15''$; & dans le triangle rectangle BIH , dont le côté BH est connu de 135911, & l'angle BHG ou BHI de $44^{\text{d}} 17' 15''$, on trouvera le côté BI de 949012. Retranchant l'angle DBE qui a été trouvé de $44^{\text{d}} 15' 40''$ de l'angle IBH de $45^{\text{d}} 42' 45''$, complément de l'angle BHG , on aura l'angle IBL de $1^{\text{d}} 27' 5''$, & dans le triangle BIL , dont le côté BI vient d'être trouvé de 949012, & le rayon BL est connu, aussi-bien que l'angle IBL compris entre ces côtés, on trouvera l'angle BLI ou SLV de $25^{\text{d}} 6' 33''$, qui étant retranché du vrai lieu du Soleil en S au temps de la seconde Observation qui étoit de $9^{\text{s}} 23^{\text{d}} 46' 0''$, donne le vrai lieu de l'Aphélie de Saturne de $8^{\text{s}} 28^{\text{d}} 39' 27''$, c'est-à-dire à $28^{\text{d}} 39' 27''$ du Sagittaire. On trouvera aussi dans le triangle BIL le côté IL qui mesure l'excentricité de Saturne de 56646 parties, dont le rayon est 1000000.

Septième Methode de déterminer l'Apogée & le Perigée du Soleil, ou l'Aphele & le Perihelie des Planetes, & l'excentricité de leurs Orbes.

Étant donné par trois Observations quelconques le mouvement vrai d'une Planete & le mouvement moyen qui lui répond, déterminer dans l'hypothese elliptique le vrai lieu de l'Apogée de cette Planete & l'excentricité de son Orbe.

* Soit dans le cercle ABD le moyen mouvement qui convient à l'intervalle de temps entre la première & la seconde Observation, mesuré par l'angle ACB , & le moyen mouvement qui répond à l'intervalle entre la seconde & la troisième Observation, mesuré par l'angle BCD . Ayant prolongé le rayon BC au de-là du centre C , soit fait l'angle CAE égal à la demi-différence entre le vrai & le moyen mouvement qui convient au premier intervalle, & soit pris l'angle CDG égal à la demi-différence entre le vrai & le moyen mouvement qui répondent au second intervalle. Soit décrit par les points A, B, E , le cercle $ABHE$, dont le centre est en V , & par les points B, D, G , le cercle $BDHG$, dont le centre est en T , & qui coupe le cercle $ABHE$ au point H . Soit mené du point H par le centre C du cercle ABD la ligne droite HCF . Je dis que le point F représentera l'Apogée de la Planete, le point Q le Perigée, H , un des foyers

K 7

230 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
foyers de l'Ellipse, autour duquel se fait le
vrai mouvement, & HC la moitié de l'ex-
centricité.

Pour déterminer l'Ellipse que la Planete
décrit par sa révolution, soit fait l'angle
 DHI égal à l'angle CDH , & ayant pris
 CK égal à CH , soit mené KI parallele à
 CD , qui rencontrera HI au point I . Soient
faits aussi les angles BHN & AHL égaux
aux angles CBH & CAH , & soient me-
nées les lignes KN & KL paralleles aux
lignes CB , CA , qui rencontrent les lignes
 HN & HL aux points N & L . Je dis que
les points I , N , L , seront sur une Ellipse
dont les foyers sont H & K , & qu'ils re-
présentent le lieu de la Planete dans les
trois Observations données.

D É M O N S T R A T I O N .

A cause des paralleles DC & KI , on au-
ra dans les triangles HCM , HKI ; HC
est à HK ; comme HM est à HI , comme
 CM est à KI ; mais HC est la moitié de
 HK , donc HM est la moitié de HI , &
 CM est la moitié de KI , donc HM plus
 CM est égal à la moitié de HI plus KI .
Mais à cause des angles égaux DHI ,
 CDH ; DM est égal à HM ; donc DM
plus CM , c'est-à-dire le rayon CD est é-
gal à la moitié de HI plus KI , & par con-
séquent le point I est sur la circonference
d'une Ellipse, dont un des foyers est le
point H , & l'autre foyer le point K .

Il faut presentement considerer que l'an-
gle

gle BHA est égal à l'angle BCA moins les angles CBH & CAH ; mais l'angle BGA qui lui est égal, mesure l'angle BCA moins l'angle CAG demi-différence entre le vrai & le moyen mouvement, donc les angles CBH plus CAH mesurent aussi cette même demi-différence. Si donc l'on retranche de l'angle BHA les angles BHN & AHL qui par la construction ont été faits égaux aux angles CBH plus CAH , on aura l'angle LHN égal à l'angle ACB du moyen mouvement moins deux fois la demi-différence entre le vrai & le moyen mouvement, d'où il suit que l'angle LHN mesure le vrai mouvement de la Planete qui répond au premier intervalle.

On trouvera de même que l'angle BGD ou BHD qui est à la circonférence du cercle $BDHG$ est égal à l'angle BCD moins l'angle CDG demi-différence entre le vrai & le moyen mouvement; mais l'angle CDG est égal à l'angle CDH , moins l'angle GDH ou GBH , qui se terminant à la même circonférence, lui est égal; donc l'angle CDH moins l'angle GBH ou CBH mesure cette demi-différence. Si donc l'on retranche de l'angle BHD l'angle DHI qui a été fait égal à l'angle CDH , & l'on y ajoute l'angle BHN qui a été fait égal à l'angle CBH , on aura l'angle IHN égal à l'angle BCD moins deux fois l'angle CDG , d'où il suit que l'angle IHN représente le vrai mouvement qui convient au second intervalle. Mais à cause des lignes KL, KN, KI , paralleles aux lignes CA, CN, CD , l'angle LKN est égal à l'angle ACB , & l'angle NKI est égal à l'angle BCD . Donc
les

les angles LKN & NKI mesurent le moyen mouvement qui se fait à l'égard du foyer K de l'Ellipse, pendant que le vrai mouvement se fait autour de l'autre foyer H de la même Ellipse, d'où il résulte que le point F représente le vrai lieu de l'Apogée, & le point Q le Perigée; que KH mesure l'excentricité de l'Orbe de la Planete, & que les points L, N, I , représentent son vrai lieu dans ces trois différentes Observations.

E X E M P L E.

Le vrai lieu du Soleil ayant été déterminé en 1722 le 16 Mai de $1^s\ 25^d\ 10' 54''$, le 18 Juillet de $3^s\ 25^d\ 22' 0''$, & le 30 Août de $5^s\ 6^d\ 40' 6''$, on cherche le vrai lieu de l'Apogée du Soleil & l'excentricité de son Orbe.

L'angle ACB du moyen mouvement, depuis le 16 Mai jusqu'au 18 Juillet 1722, est de $62^d\ 5' 44''$, dont retranchant le vrai mouvement du Soleil dans cet intervalle qui a été observé de $60^d\ 11' 6''$, on aura la différence entre le vrai & le moyen mouvement de $1^d\ 54' 38''$, dont la moitié $57^d\ 19'$ étant ajoutée à $60^d\ 11' 6''$, ou retranchée de $62^d\ 5' 44''$, donne l'angle AEB ou AHB de $61^d\ 8' 25''$.

L'angle BCD du moyen mouvement, depuis le 18 Juillet jusqu'au 30 Août 1722, est de $42^d\ 22' 59''$, dont retranchant le vrai mouvement du Soleil dans cet intervalle qui est de $41^d\ 18' 6''$, on aura la différence entre le vrai & le moyen mouvement de $1^d\ 4' 53''$, dont la moitié $32' 26''$ étant retranchée

de

de l'angle ABD de $42^{\circ} 22' 59''$, donne l'angle BGD ou BHD de $41^{\circ} 50' 32'' \frac{1}{2}$.

L'angle ACB étant de $62^{\circ} 5' 44''$, & l'angle BCD de $42^{\circ} 22' 59''$, on aura l'angle ABC de $58^{\circ} 57' 8''$, & l'angle CBD de $68^{\circ} 48' 30'' \frac{1}{2}$, dont la somme mesure l'angle ABP qui sera de $127^{\circ} 45' 38'' \frac{1}{2}$.

L'angle AHB ou BVP qui lui est égal étant de $61^{\circ} 8' 25''$, & l'angle BHD ou BTO qui lui est égal de $41^{\circ} 50' 32'' \frac{1}{2}$, on aura l'angle ABV de $28^{\circ} 51' 35''$, & l'angle TBD de $48^{\circ} 9' 27'' \frac{1}{2}$, dont la somme $77^{\circ} 1' 2'' \frac{1}{2}$ étant retranchée de l'angle ABD de $127^{\circ} 45' 38'' \frac{1}{2}$, reste l'angle TBV de $50^{\circ} 44' 36''$.

Ayant divisé les cordes AB , BD , en deux parties égales par les lignes CP , CO , on aura l'angle BCP , moitié de l'angle ACB , de $31^{\circ} 2' 52'' \frac{1}{2}$, dont le sinus BP est de 51575 parties dont le rayon BC est 100000. On aura aussi l'angle BCO moitié de l'angle BCD de $21^{\circ} 11' 29'' \frac{1}{2}$, dont le sinus BO est 36149. On fera donc comme le sinus de l'angle BVP ou AHB de $61^{\circ} 8' 25''$ est au sinus total; ainsi BP 51575 est à BV qu'on trouvera de 58888; on fera aussi comme le sinus de l'angle BTO ou BHD de $41^{\circ} 50' 32'' \frac{1}{2}$ est au sinus total; ainsi BO 36149 est à BT qu'on trouvera de 54190.

Maintenant dans le triangle BVT , dont le côté BV est de 58888, le côté BT de 54190, & l'angle TBV compris entre ces côtés a été déterminé de $50^{\circ} 44' 36''$, on aura l'angle BTV de $69^{\circ} 38' 7''$, dont le double est l'angle BTH de $139^{\circ} 16' 14''$; on
aura

aura donc l'angle TBH de $20^{\text{d}} 21' 53''$, qui étant ajouté à l'angle DBT de $48^{\text{d}} 9' 27'' \frac{1}{2}$, donne l'angle DBH de $68^{\text{d}} 31' 20'' \frac{1}{2}$, mais l'angle DHB est de $41^{\text{d}} 50' 32'' \frac{1}{2}$, on aura donc l'angle BHD de $69^{\text{d}} 38' 7''$, dont retranchant l'angle CBD ou CDB de $68^{\text{d}} 48' 30'' \frac{1}{2}$, reste l'angle CDH de $49' 36'' \frac{1}{2}$. On fera presentement comme le sinus de l'angle BHD de $41^{\text{d}} 50' 32''$, est au sinus de l'angle DBH de $68^{\text{d}} 31' 20'' \frac{1}{2}$; ainsi BD 72298 est à HD qu'on trouvera de 100854, & dans le triangle CDH dont le côté CD est connu de 100000, le côté DH de 100854, & l'angle compris CDH est de $49' 36'' \frac{1}{2}$, on trouvera l'angle DHC de $59^{\text{d}} 4' 37''$, dont retranchant l'angle DHI égal à l'angle CDH de $49' 36'' \frac{1}{2}$, reste l'angle FHI de $58^{\text{d}} 15' 0''$, distance de l'Apogée au lieu du Soleil dans la troisième Observation, qui étoit de $5^{\text{s}} 6^{\text{d}} 40' 6''$, on aura donc le vrai lieu de l'Apogée du Soleil de $3^{\text{s}} 8^{\text{d}} 25' 6''$. On trouvera aussi CH , moitié de l'excentricité de l'Orbe du Soleil de 1682 parties, dont le rayon est 100000.

Cette methode a beaucoup de rapport à la précédente, mais le calcul en est un peu plus long. On peut l'employer très-utilement pour trouver les Observations qui sont les plus favorables pour la recherche de l'Aphélie & du Perihélie des Planetes, parce que la détermination de ces lieux se faisant par l'intersection de deux cercles, il est certain que l'on trouvera plus de précision par les Observations faites dans les lieux où l'intersection de ces cercles est la moins oblique & la plus approchante de la perpendiculaire.

Hui-

Huitième Methode de déterminer l'Apogée & le Perigée du Soleil, ou l'Aphelie & le Perihelie des Planetes dans l'hypothese de Kepler par trois seules Observations.

Nous venons de donner la manière de déterminer geometriquement dans l'hypothese elliptique simple, l'Aphelie & le Perihelie des Planetes par trois seules Observations faites en quelque endroit que ce soit de leurs Orbes.

Cette methode peut s'appliquer au Soleil, à la Lune & aux autres Planetes, dont l'excentricité est fort petite; mais l'on a remarqué que dans les Orbes des Planetes dont l'excentricité est considerable, telles que Mars & Mercure, les Equations qui resultent de l'hypothese de *Kepler*, representent plus parfaitement la difference entre leur vrai & leur moyen mouvement. Nous avons donc jugé qu'il seroit très-avantageux d'avoir une methode de déterminer, suivant cette hypothese, l'Aphelie & le Perihelie des Planetes, en ne supposant qu'un petit nombre d'Observations. Car comme on ne peut observer que rarement leur vrai lieu vû du centre du Soleil, par les raisons que nous avons rapportées ci-dessus, on ne peut pas par consequent y employer la plupart des methodes précédentes qui demandent un grand nombre d'Observations.

Comme dans l'hypothese de *Kepler* on ne peut pas calculer les vrais lieux des Planetes geometriquement, mais seulement par approximation, il ne faut pas non plus espérer de

236 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
de pouvoir déterminer geometriquement,
suivant cette hypothese, l'Aphelie & le Pe-
rihelie des Planetes, mais seulement par ap-
proximation, ce qui suffit pour cette recher-
che, pourvû que l'on puisse approcher à l'in-
fini de la précision geometrique.

On considerera pour cela que la distance
des Planetes au Soleil, lorsqu'elles sont dans
leur Aphelie & Perihelie, devant être tou-
jours la même, dans quelque hypothese que
ce soit, leurs Orbes doivent avoir aussi une
même excentricité, & qu'ainsi l'Ellipse qu'el-
les décrivent, suivant l'hypothese de *Kepler*
doit être la même que celle qu'elles parcou-
rent suivant l'hypothese elliptique simple. Le
vrai lieu des Planetes, suivant l'une & l'aut-
re de ces deux hypotheses, doit donc être
sur la même Ellipse, mais distribué diverse-
ment, parce que suivant *Kepler* la Planete
parcourt des aires égales en temps égaux,
au lieu que suivant l'hypothese elliptique sim-
ple, le moyen mouvement se distribué éga-
lement autour d'un des foyers de l'Ellipse,
pendant que le vrai ou apparent se fait autour
de l'autre foyer.

Les vrais lieux d'une Planete que l'on sup-
pose se mouvoir, suivant l'hypothese de *Ke-
pler*, étant donc connus par trois Observa-
tions, il s'agit de trouver les lieux de la Pla-
nete qui y répondent suivant l'hypothese el-
liptique, parce que la situation des Planetes
étant, suivant ces deux hypotheses, sur une
même Ellipse, dont les foyers & les axes sont
les mêmes; connoissant le lieu de l'Aphelie
& du Perihelie d'une Planete suivant l'hypo-
these elliptique, on aura en même temps
leur

leur situation, suivant l'hypothese de *Kepler*.

Pour les déterminer, soit † $ALBM$ une Ellipse qui represente par exemple de l'Orbe de Saturne, dont C soit le centre, & S l'un des foyers où est placé le Soleil, suivant les deux hypotheses, en sorte que SA mesure la plus grande distance de Saturne au Soleil, & SB sa plus petite distance. Soient les points M, L, N , les vrais lieux de Saturne en trois differents endroits de son Orbe, tels que les aires MSL, LSN , soient entr'elles, comme les tems que cette Planete a employés à parcourir les arcs MAL, LGN , c'est-à-dire que l'aire $MALS$ soit à l'aire $LGNS$, comme le temps que la Planete a employé à parcourir l'arc MAL est au temps qu'elle a employé à décrire l'arc LGN . Nous avons enseigné dans les Memoires de l'Academie de l'année 1719, une Methode abrégée pour déterminer, suivant l'hypothese de *Kepler*, la vraie distance ASL d'une Planete à son Aphelie, sa distance moyenne ACD étant donnée, & il s'agit de trouver ici la distance moyenne qui répond à la veritable, ce que l'on fera en cette maniere.

L'excentricité CS étant connue par rapport au rayon AC , & la ligne GS étant par la propriété de l'Ellipse, égale à ce rayon, on trouvera dans le triangle rectangle GCS , la valeur du côté GC par rapport au rayon AC ou HC . On fera ensuite comme GC est à HC , ou bien LF est à IF ; ainsi la Tangente de l'angle FSL , distance veritable de Saturne à son Aphelie est à la Tangente de l'angle ASI . Maintenant dans le Triangle CIS , dont l'angle ASI vient d'être dé-

terminé, l'excentricité CS & le rayon CI sont connus; on fera comme CI est à CS , ainsi l'angle ASI ou CSI est à l'angle CIS , qui étant ajouté à l'angle CSI , est égal à l'angle externe ACI . Menant la ligne DRO parallele au rayon CI qui rencontre l'axe AB en R , on aura l'angle ARD égal à l'angle ACI que l'on vient de déterminer. Retranchant de l'angle ARD , l'angle ODS que l'on a remarqué dans les Memoires de 1719, mesurer la difference entre la grandeur de l'arc DI , & celle de la ligne SE , & dont nous avons donné une Table à la fin de ces Memoires, on aura l'angle ASD , & dans le Triangle CDS dont l'angle ASD est connu de même que l'excentricité CS & le rayon CD , on fera comme CD est à CS ; ainsi le sinus de l'angle ASD ou CSD est au sinus de l'angle CDS , qui étant ajouté à l'angle CSD , donne la valeur de l'angle ACD qui mesure la distance moyenne cherchée de Saturne à son Aphelie.

La distance moyenne de Saturne à son Aphelie étant connue, on déterminera facilement son vrai lieu suivant l'hypothese elliptique simple, car la difference entre le vrai & le moyen mouvement d'une Planete étant suivant cette hypothese le double de l'Equation qui se fait au centre, il faut retrancher de l'angle ACD , distance moyennée de Saturne à son Aphelie, l'angle DCT double de l'angle CDS , & mener du point S , la ligne SP parallele à la ligne CT , l'angle ACT ou ASP qui lui est égal, mesurera la distance veritable de Saturne à son Aphelie, &

& le point *P* marquera le vrai lieu de Saturne suivant l'hypothese elliptique.

Ayant ainsi déterminé sur cette Ellipse trois points, suivant cette hypothese, qui répondent aux trois lieux observés, on calculera geometriquement, par le moyen d'une des deux Methodes précédentes, le vrai lieu de l'Aphelie & l'excentricité de Saturne qui se trouveront differents de ceux que l'on a supposés en premier lieu de même que son excentricité.

On se servira de cet Aphelie & de cette excentricité pour calculer de nouveau les vrais lieux de Saturne suivant l'hypothese elliptique, & on emploiera ces vrais lieux pour trouver son Aphelie & son excentricité qui approcheront des veritables avec toute la précision que l'on peut souhaiter.

On peut recommencer ce calcul autant de fois que l'on souhaitera, & approcher ainsi à l'infini de la précision geometrique, mais cela est inutile dans cette recherche.

E X E M P L E.

Le vrai lieu de Saturne ayant été déterminé le 5 Mai 1690 de $7^s\ 15^d\ 33'\ 30''$, le 15 Juillet 1696 de $9^s\ 23^d\ 46'\ 0''$, & le 12 Octobre 1703 de $0^s\ 19^d\ 14'\ 20''$, on veut trouver, suivant l'hypothese de *Kepler*, l'Aphelie de Saturne & son excentricité.

On emploiera d'abord l'Aphelie qui resulte de l'hypothese elliptique qu'on a trouvé dans l'Exemple précédent de $8^s\ 28^d\ 39'\ 27''$, & l'excentricité qui a été déterminée de 56646 parties dont le rayon est 1000000, &

& on aura la distance de Saturne à son Aphelie dans la première Observation de $43^{\text{d}} 5' 57''$, dans la seconde de $25^{\text{d}} 6' 33''$ & dans la troisième de $110^{\text{d}} 34' 54''$. L'excentricité CS ayant aussi été déterminée de 56646 parties, dont le rayon est 1000000, on aura GC de 998395, & l'on fera comme GC 998395 est à HC 1000000. Ainsi la Tangente de l'angle ASL de $25^{\text{d}} 6' 33''$ est à la Tangente de l'angle ASI qu'on trouvera de $25^{\text{d}} 8' 40''$; on fera ensuite comme CI , 1000000 est à CS , 56646; ainsi le sinus de l'angle ASI de $25^{\text{d}} 8' 40''$ est au sinus de l'angle CIS de $1^{\text{d}} 22' 45''$, qui étant ajouté à l'angle ASI , donne l'angle ACI ou ARD de $26^{\text{d}} 31' 25''$. On cherchera dans la Table des Memoires de l'Academie de 1719 p. 204 la valeur de l'angle ODS qui répond à l'angle CIS de $1^{\text{d}} 22' 45''$, & on le trouvera d'une seconde, qui étant retranchée de l'angle ARD de $26^{\text{d}} 31' 25''$, donne l'angle ASD de $26^{\text{d}} 31' 24''$. On fera ensuite comme CD 100000 est à CS 56646; ainsi le sinus de l'angle ASD de $26^{\text{d}} 31' 24''$ est au sinus de l'angle CDS de $1^{\text{d}} 26' 58''$, qui étant ajouté à l'angle ASD , donne l'angle ACD qui mesure la distance moyenne de Saturne à son Aphelie dans la seconde Observation de $27^{\text{d}} 58' 22''$. Retranchant de cet angle, l'angle DCT de $2^{\text{d}} 53' 56''$ qui a été pris égal au double de l'angle CDS , on aura la distance ACT ou ASP de Saturne à son Aphelie dans l'hypothèse elliptique de $25^{\text{d}} 4' 26''$, plus petite de $2' 7''$ que suivant l'hypothèse de Kepler.

On trouvera par la même manière la distance

tance de Saturne à son Aphelie dans la première Observation de $43^d\ 3'\ 16''$, plus petite de $2'\ 41''$ que suivant l'hypothese de *Kepler*, & la distance de cette Planete à son Aphelie dans la troisiéme Observation de $110^d\ 36'\ 53''$, plus grande de $1'\ 59''$ que suivant l'hypothese de *Kepler*.

Les lieux de Saturne étant ainsi déterminés dans l'hypothese elliptique, on trouvera de la manière qui a été enseignée par la sixième Methode, la distance veritable de Saturne à son Aphelie dans la seconde Observation, suivant l'hypothese elliptique, de $25^d\ 42'\ 26''$, à laquelle ajoûtant $2'\ 7''$, difference entre le vrai lieu de la Planete suivant les deux hypotheses, on aura la distance veritable de Saturne à son Aphelie, suivant l'hypothese de *Kepler*, de $25^d\ 44'\ 33''$, qui étant retranchés du vrai lieu de la Planete qui fut observé alors de $9^s\ 23^d\ 46'\ 0''$, donne le vrai lieu de l'Aphelie de Saturne, suivant l'hypothese de *Kepler*, de $8^s\ 28^d\ 1'\ 27''$, plus petit de 38 minutes que si le mouvement de cette Planete se fut fait suivant l'hypothese elliptique simple. On trouvera aussi l'excentricité *CS* de 57173.

Le lieu de l'Aphelie de Saturne & son excentricité étant ainsi connus, on prendra la distance de cette Planete à son Aphelie, que l'on trouvera dans la première Observation de $42^d\ 27'\ 57''$, dans la seconde de $25^d\ 44'\ 33''$, & dans la troisiéme de $111^d\ 12'\ 54''$. On calculera ensuite, comme ci-devant, la distance de Saturne à son Aphelie dans l'hypothese elliptique, que l'on trouvera dans la première Observation de $42^d\ 25'\ 13''$,


MEM. 1723.

L


plus


plus petite de $2' 44''$ que suivant l'hypothese de *Kepler*, dans la seconde Observation de $25^d 42' 21''$, plus petite de $2' 12''$ que suivant l'hypothese de *Kepler*, & dans la troisieme Observation de $111^d 14' 57'' \frac{1}{2}$, plus grande de $2' 3'' \frac{1}{2}$ que suivant l'hypothese de *Kepler*; ce qui ne differe que de peu de secondes de ce qui a été déterminé par le premier calcul. On cherchera ensuite par la Methode précédente la distance de Saturne à son Aphelie, suivant l'hypothese elliptique que l'on trouvera dans la seconde Observation de $25^d 44' 40''$, à laquelle ajoûtant $2' 12''$, différence entre le vrai lieu de la Planete suivant les deux hypotheses, on aura la distance veritable de Saturne à son Aphelie dans l'hypothese de *Kepler* de $25^d 46' 52''$, qui étant retranchée du vrai lieu de la Planete, lequel étoit dans la seconde Observation de $9^s 23^d 46' 0''$, donne le vrai lieu de l'Aphelie de Saturne, suivant l'hypothese de *Kepler*, de $8^s 27^d 59' 8''$, plus petite de $2' 19''$ que par la comparaison précédente, & de 40 minutes 9 secondes que suivant l'hypothese elliptique simple. On trouvera aussi l'excentricité de Saturne de 57181 , un peu plus grande que par le calcul précédent.

L'on voit par cet Exemple, que la difference entre le lieu de l'Aphelie qui resuoltoit de l'hypothese elliptique simple & de l'hypothese de *Kepler*, étoit par le premier calcul de 38 minutes, & que par le second calcul on a trouvé ce lieu encore moins avancé de $2' 19''$, desorte que si l'on recommence ce calcul, la difference entre le vrai lieu de l'Aphelie & du Perihelie, suivant l'hypothese de *Kepler*









Kepler & celui que l'on vient de déterminer, ne seroit que de quelques secondes, qui est une précision inutile dans cette recherche, puisqu'on s'estimerait fort heureux de pouvoir en être assuré à quelques minutes près.

Cette difference de 40 minutes dans le lieu de l'Aphelie & du Perihelie de Saturne, déterminé suivant les deux hypotheses, doit varier suivant les diverses situations de Saturne dans son Orbe, & on en doit trouver encore de plus grandes dans l'Orbe de Mars, & principalement dans celui de Mercure, dont l'excentricité est beaucoup plus grande que celle des autres Planetes, ce qui fait voir l'avantage que l'on peut retirer dans l'Astronomie, d'avoir une Methode, exacte & facile à pratiquer pour trouver le lieu de l'Aphelie & du Perihelie des Planetes, suivant l'hypothese de *Kepler*.

E' T A B L I S S E M E N T

D'UN NOUVEAU GENRE DE PLANTE,
sous le nom de RICINOCARPOS.

Par M. MARCHAND.

* LA methode que les Botanistes ont inventée dans le dernier siècle, pour établir les Genres des Planetes sur leurs parties constantes & immuables, étant aujourd'hui

L 2

d'hui

d'hui reçûe comme la base fondamentale de la Botanique, ne permet plus aux Phyticiens de donner des noms aux Plantes que par rapport à la structure de leurs fleurs & de leurs fruits; & ces habiles Historiens qui ont travaillé successivement avec tant de progrès à une Science également utile & agréable, nous mettent en état, par leur methode, de juger sous quel genre doit être rangée une Plante qui auroit été ci-devant inconnûe, en observant exactement les parties qui composent sa fleur & son fruit; ce qui nous met aussi à portée de reconnoître, si dans le nombre des Plantes que les Auteurs ont employées sous un même genre, ces Plantes, dis-je, appartiennent veritablement au genre sous lequel elles ont été rangées.

Mais comme il étoit assés difficile que ces mêmes Botanistes eussent examiné d'après nature la quantité prodigieuse de Plantes dont ils font mention, il a fallu qu'ils s'en soient rapportés aux descriptions peu circonscanciées qui en ont été faites par les Historiens qui les ont précédé, ce qui quelquefois a pû contribuer à les faire tomber dans quelques erreurs contre leur methode même. Or comme la Plante qui fait le sujet de ce Memoire, est du nombre de celles dont nous croyons que le caractere generique ne leur a pas été bien connu, nous rapporterons ici sa description amplement détaillée, en faisant remarquer les parties essentielles qui la caractérisent, & en quoi elle differe des genres où quelques Botanistes modernes l'ont employée.

La

La racine de cette Plante † *a*, se divise dès sa naissance en trois ou quatre racines blanchâtres, de la grosseur de cinq à six lignes, sur environ sept à huit pouces de longueur, ridées & gercées par anneaux à leur origine, lesquelles s'étendent latéralement, & jettent quantité de grosses fibres ondées, un peu situées perpendiculairement, & subdivisées en une infinité de plus petites fibres peu cheveluës qui gardent la même direction. La surface des grosses racines est une écorce spongieuse & charnuë, qui couvre un corps dur & presque ligneux, sans apparence de moëlle. Toutes ces racines nous ont paru avoir quelque legere odeur aromatique.

De la racine s'élève immédiatement une seule tige *b*, haute de deux pieds & demi ou davantage, ronde, ferme & solide, assés droite, un peu nouëuse de deux en deux pouces, laquelle s'incline diagonalement de côté & d'autre de nœud en nœud, où elle produit une grande feuille, souvent accompagnée à son aisselle d'un bouquet d'autres plus petites feuilles, en manière de rejetton ou branche. Cette tige est couverte d'une écorce de couleur verd-grisâtre, rayée de lignes plus blanches depuis sa naissance jusqu'à un pied de haut, & elle est colorée de rouge-brun, & tantôt plus tantôt moins pointillée ou moucherée de taches oblongues, de couleur verd-rougeâtre dans le reste de sa hauteur. Sa base a environ un pouce de diametre, finissant tout-à-coup à quatre lignes de grosseur. La surface de cette tige est

est luisante, composée d'une écorce de substance fibreuse & spongieuse, d'une ligne d'épaisseur, de couleur verdâtre, sous laquelle on trouve un autre corps plus solide & presque ligneux, blanchâtre, épais de deux à trois lignes, au milieu duquel on découvre une cavité remplie de moëlle fort blanche, peu compacte, & entrecoupée par des membranes feuilletées *t c, c, c*, de même couleur, posées horisontalement le long de la cavité de la tige. Chaque nœud de cette tige produit deux appendices *d, d*, contournées en demi-cercle, dont l'une se jette à droite & l'autre à gauche, & qui ensemble embrassent la circonférence de la tige, & ces appendices sont garnies sur leur surface extérieure de fibres roides *e, e*, *Fig. en grand*, quoi-que fines, douces au toucher, charnuës, visqueuses, plus ou moins branchuës à la manière du bois de Cerf, inégalement longues, & de couleur rouge-brun. Toutes ces fibres rameuses sont terminées par un petit bouton charnu, teint de rouge jaunâtre, clair & transparent, à peu-près comme les boutons que l'on voit à l'extrémité des cornes du Limaçon; ce qui nous a paru singulier, & que je ne sai point qu'on ait encore observé sur aucune autre Plante. Les plus grandes feuilles *f*, qui ornent la tige de cette Plante, sont situées vers le milieu de sa hauteur; leur couleur en general varie assés, tant en dessus qu'en dessous. Celles-ci sont verd-foncé en dessus, plus clair en dessous. Celles qui naissent plus haut sont verd-

verd rougeâtre en dessus moins en dessous, & enfin celles qui occupent l'extrémité de la tige, ainsi que celles qui naissent par bouquets le long de la même tige, sont quelquefois des deux côtés de couleur rouge-brun, ou de couleur verd-glacé de rouge-brun, étant toutes généralement lisses & luisantes, tant en leur surface supérieure qu'inférieure. Les grandes feuilles ont sept à huit pouces de diamètre, sur cinq à six pouces de longueur; elles sont profondément découpées en cinq lobes, à la manière des feuilles de la *Staphysagre*, mais d'une substance plus molle, larges vers le milieu, & terminées tout-à-coup en pointe un peu inclinée en embas. Beaucoup d'autres plus petites de ces feuilles sont seulement découpées en trois lobes, & chaque découpe est garnie dans le milieu d'une grosse fibre nerveuse, plus ou moins rougeâtre, d'où partent quantité de petites fibres qui se subdivisent, & tapissent le parenchyme de la feuille, & toutes ces fibres en general sont beaucoup plus apparentes en dessous qu'en dessus.

Le contour des découpures des feuilles est légèrement & inégalement dentelé en dents de scie, & entièrement bordé d'appendices charnus très-fines, peu ou point rameuses, ressemblant en quelque façon à de fort petites épines, terminées par un point ou bouton charnu de couleur rougeâtre. Toutes les feuilles sont portées par des queues de différente longueur, suivant la grandeur des feuilles. Ces queues sont peu sillonnées à leur naissance, & presque ronds

des en dessus & en dessous, garnies de bouquets d'appendices plus branchuës que celles qui bordent les découpures des feuilles, approchant davantage des bouquets qui sont attachés aux appendices des nœuds de la tige, & ces bouquets-ci sont situés régulièrement & alternativement le long de la surface supérieure de la queue de la feuille sur deux lignes presque paralleles.

La tige de cette Plante se termine tout-à coup en deux ou trois petites branches droites, hautes de trois à quatre pouces, grosses d'environ deux lignes, lisses & luisantes, de couleur rouge-brun, chacune terminée par quatre à cinq bouquets de fleurs, rangés alternativement, & qui par leur port & arrangement tiennent le milieu entre les fleurs en umbelle & les fleurs en épi.

Chaque bouquet porte huit à dix fleurs, chacune soutenuë par un pedicule fort court, terminé par un calice d'une piece *g*, *g*, charnu, découpé en cinq pointes aiguës, de couleur rouge-brun verdâtre, garnies par les bords d'appendices de la même substance que celles qui sont sur les autres parties de la Plante, mais simples & très-courtes, paroissant seulement comme des points aux bords des découpures du calice.

De ce calice sort une fleur en rose *h*, de trois à quatre lignes de diametre, composée de cinq petales *i* charnus, oblongs, terminés en pointe obtuse, de couleur rouge-brun en dedans & en dehors, plus étroits à leur naissance, & garnis d'un onglet jaune-verdâtre. Le milieu de la fleur est occupé par une capsule *l* verd-blanchâtre, de
la

a grosseur d'un pois, surmontée d'un pistille *m* rougeâtre, divisé en trois branches fourchues, terminées par de petites têtes jaunes. Cinq étamines *n* blanches, chargées de sommets rouge-brun mêlé de jaune, sortent de la base de chaque pétale & environnent la capsule. La fleur étant passée, la capsule grossit & devient un fruit cylindrique *o* triangulaire, arrondi par les coins, fort semblable à celui du *R. cinus*, & qui étant mûr, est environ de la grosseur d'une noisette, couvert d'une écorce ou enveloppe *p* brune en dehors, cartilagineuse, gercée & grisâtre en dedans. Ce fruit étant parfaitement mûr & sec, se divise en trois loges ou cavités *q*, dures & presque ligneuses, de couleur gris-fauve, lisses en dedans, lesquelles contiennent chacune une graine oblongue *r*, un peu aplatie d'un côté, relevée & convexe de l'autre, couverte d'une écorce sèche & cartilagineuse, aussi de couleur gris-fauve, mais très-legerement pointillée de taches brunes, & ces graines ont à une de leurs extrémités un mammelon roussâtre en forme de petite tête *s*, cette écorce contient une amande fort blanche, dont elle ne se sépare point. Au milieu du fruit est une membrane grisâtre triangulaire *t* fort mince, attachée par sa base au pedicule de la fleur; laquelle membrane sépare chaque loge, & c'est cette partie que M. *Tournefort* appelle *poignon* ou *axe* dans le fruit du *Ricinus*. La graine de cette Plante produit d'abord deux feuilles dissimilaires *u* ovales, ainsi que fait le *Ricinus*, puis une troisième feuille semblable aux deux précédentes, à la réserve qu'elle est un

250 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
peu plus grande, plus allongée & bordée
d'appendices charnuës extrêmement fines,
ainfi que les autres feuilles dont nous avons
ei-devant parlé. Cette Plante est fort aqueu-
se, & jette plusieurs gouttes d'eau clair-lim-
pide, toutes les fois qu'on en détache quel-
que feuille.

Les premières feuilles qui naiffent au bas
de la tige, se dessechent & tombent ordi-
nairement quand la Plante entre en fleur.
Toutes les parties de cette Plante ont une
saveur piquante, qui échauffe confiderable-
ment la bouche, mais particulièrement la
graine.

Cette Plante nous est venuë de la *Guade-
loupe* par graines.

Elle fleurit ici au mois d'Août, & veut
être semée au printemps sur couche, & quoi-
que nous l'ayons bien exposée au chaud,
elle ne nous a point produit de bonnes grai-
nes jusques à present, & s'est toujourns des-
sechée, & a péri à la fin de l'automne.

On ne fait point qu'on fasse usage de cet-
te Plante en Medecine, mais sa saveur & la
ressemblance de son fruit avec celui du *Ri-
cinus*, doivent faire croire qu'elle a la même
qualité émetique que le *Ricinus*.

Par l'examen du caractère generique de la
Plante dont nous venons de lire la descrip-
tion à la Compagnie, il est évident qu'elle
ne peut être rangée sous le genre du *Rici-
nus*, qui suivant le raport des Botanistes
modernes, porte des fleurs à étamines, sé-
parées & éloignées du fruit sur le même pied.
Nous ne voyons pas non plus que nôtre
Plante puisse être du genre du *Ricinoïdes*,
parce

parce que le *Ricinoïdes*, suivant les mêmes Historiens, donne des fleurs polypetales, auxquelles le fruit ne succede point, mais que le fruit naît séparément en d'autres endroits de la Plante, non pas comme ils le disent, indépendamment des fleurs, mais au contraire, ainsi que l'a fort bien remarqué † M. Nissolle, ayant observé sur le *Ricinoïdes* de deux sortes de fleurs, les unes polypetales qui sont steriles, & les autres à étamines qui sont fertiles, où véritablement naît le fruit. Or comme notre Plante porte une fleur à cinq petales, d'où le fruit sort immédiatement, & que par conséquent elle est d'un caractère différent de celui du *Ricinus*, & de celui du *Ricinoides*; nous concluons donc, par les raisons susdites, que notre Plante doit faire un genre particulier, ce qui nous engage de la nommer *Ricinocarpus Americanus, floribus pentapetalis*, comme qui diroit, Plante de l'*Amerique*, qui a le fruit semblable à celui du *Ricinus* & la fleur à cinq petales, auquel effectivement le fruit de notre Plante a une très-grande ressemblance, non seulement par sa structure, mais aussi par les graines qu'il contient.

† *Memoires de l'Acad. Royale des Sciences*, an. 1712. p. 441.

EXPLICATION DES FIGURES
qui representent les differentes parties du
Ricinocarpos.


P R E M I È R E P L A N C H E.

La Plante réduite en petit.

- a*, la racine.
- b*, la tige.
- a*, la germination avec ses feuilles diffimilaires, en petit.

S E C O N D E P L A N C H E.

- ccc*, Membranes feuilletées.
- dd*, Appendices contournées en demi-cercle.
- ee*, Fibres rameuses en grand, posées sur une appendice.
- f*, une des grandes feuilles au naturel.
- gg*, Calice de grandeur naturelle, & les Figures suivantes.
- h*, Fleur.
- i*, Petales.
- l*, Capsule.
- m*, Pistile.
- n*, E'tamines.
- o*, Fruit triangulaire.
- p*, E'corce ou envelope du fruit.
- q*, Loge du fruit où est contenuë la graine.
- r*, Graine.
- f*, Mammelon de la graine.
- t*, Membrane triangulaire située au milieu du fruit.




Ricinocarpus Americanus
floribus Pentapetalis.






f

Pl. 2^e





SECONDE SECTION
DE LA
SECONDE PARTIE
DU CALCUL

DES DIFFERENCES FINIES,

Où l'on traite des grandeurs exprimées par
des fractions.

Par M. NICOLE.

† O N se propose de donner dans cette
Section une Theorie generale des suites,
dont chaque terme est exprimé par une
fraction composée de tant de facteurs qu'on
voudra, augmentant selon une loi quel-
conque.

PROPOSITION I.

Trouver la difference d'une grandeur al-
gebrique fractionnaire, dont le dénomina-
teur n'est composé que d'un facteur, quelle
que soit l'augmentation qui doit arriver à
ce facteur.

L 7

Soit

Soit cette expression algebrique $\frac{1}{z}$, dont on demande la difference, l'augmentation qui doit arriver à ce facteur étant n , $2n$, $3n$, $4n$, $5n$, $6n$, ou enfin m .

1.^o Si l'augmentation est n , cette expression deviendra $\frac{1}{z+n}$, la difference demandée est donc $\frac{1}{z} - \frac{1}{z+n}$, qui étant mise à même dénomination, devient $\frac{1 \cdot n}{z \cdot z + n}$.

2.^o Si l'augmentation est $2n$, la difference demandée sera $\frac{1}{z} - \frac{1}{z+2n} = \frac{2n}{z \cdot z + 2n}$.

Si l'on multiplie le numerateur & le dénominateur de cette fraction par $z+n$, qui est le facteur qui manque au dénominateur, pour que tous ses facteurs soient consecutifs, on aura $\frac{2n \cdot z + n}{z \cdot z + n \cdot z + 2n}$, qui se réduit, en décomposant, à $\frac{2 \cdot n}{z + n \cdot z + 2n}$

+ $\frac{2 \cdot n \cdot n}{z \cdot \dots \cdot z + 2n}$.

3.^o Si l'augmentation est $3n$, la difference demandée sera $\frac{1}{z} - \frac{1}{z+3n} = \frac{3n}{z \cdot z + 3n}$,

& en multipliant par $z+n \cdot z+2n$, qui sont les facteurs qui manquent au dénominateur, pour que tous ses facteurs soient consecutifs, il viendra $\frac{3n \cdot z + n \cdot z + 2n}{z \cdot \dots \cdot z + 3n}$, qui

par

par la décomposition se réduit à $\frac{3 \cdot n}{x + 2n \cdot x + 3n}$

$$+ \frac{2n \cdot 2n}{x + n \dots x + 3n} + \frac{3n \cdot 2n \cdot n}{x \dots x + 3n}.$$

4.^o Si l'augmentation est $4n$, on aura

$\frac{1}{x} - \frac{1}{x + 4n}$ pour la différence demandée,

qui se réduit à $\frac{4n}{x \cdot x + 4n} = \frac{4n \cdot x + n \cdot x + 2n \cdot x + 3n}{x \dots x + 4n}$

$$= \frac{4n}{x + 3n \cdot x + 4n} + \frac{4n \cdot 3n}{x + 2n \dots x + 4n} +$$

$$\frac{4n \cdot 3n \cdot 2n}{x + n \dots x + 4n} + \frac{4n \cdot 3n \cdot 2n \cdot n}{x \dots x + 4n}.$$

5.^o Si l'augmentation est $5n$, on aura

$\frac{5n}{x \cdot x + 5n}$ pour la différence cherchée, qui devient

par la multiplication $\frac{5n \cdot x + n \cdot x + 2n \cdot x + 3n \cdot x + 4n}{x \dots x + 5n},$

& se décompose en $\frac{5n}{x + 4n \cdot x + 5n} + \frac{5n}{x + 3n \dots x + 5n}$

$$+ \frac{5n \cdot 4n \cdot 3n}{x + 2n \dots x + 5n} + \frac{5n \cdot 4n \cdot 3n \cdot 2n}{x + n \dots x + 5n} +$$

$$\frac{5n \cdot 4n \cdot 3n \cdot 2n \cdot n}{x \dots x + 5n}.$$

C O R O L L A I R E.

Il est donc évident que la différence cherchée est

$$\begin{array}{ccccccc}
 \frac{1^{\text{re}}}{z, z + n} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \frac{2^{\text{e}}}{z + n, z + 2n} & + & \frac{1. 2. n n}{z \dots z + 2n} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \frac{3^{\text{e}}}{z + 2n, z + 3n} & + & \frac{3. 2 n n}{z + n \dots z + 3n} & + & \frac{1. 2. 3 n^3}{z \dots z + 3n} & \cdot & \cdot \\
 \frac{4^{\text{e}}}{z + 3n, z + 4n} & + & \frac{6. 2 n n}{z + 2n \dots z + 4n} & + & \frac{4. 2. 3 n^3}{z + n \dots z + 4n} & + & \frac{1. 2. 3. 4 n^4}{z \dots z + 4n} \\
 \frac{5^{\text{e}}}{z + 4n, z + 5n} & + & \frac{10. 2 n n}{z + 3n \dots z + 5n} & + & \frac{10. 2. 3 n^3}{z + 2n \dots z + 5n} & + & \frac{5. 2. 3. 4 n^4}{z + n \dots z + 5n} \\
 & & & & & & + \frac{1. 2. 3. 4. 5 n^5}{z \dots z + 5n} \cdot 5 n
 \end{array}$$

Si l'on examine ces suites, on verra 1.^o Qu'elles contiennent autant de termes que l'augmentation contient de fois n . 2.^o Que les numérateurs de ces termes sont composés des coefficients de la puissance d'un binôme, laquelle puissance est indiquée par l'augmentation, en observant de retrancher le premier coefficient de chacune de ces puissances. 3.^o Que les coefficients restants sont chacun multipliés par le terme correspondant de cette suite 1. n , 1. n . 2 n , 1. n . 2 n . 3 n , 1. n . 2 n . 3 n . 4 n , 1. n . 2 n . 3 n . 4 n . 5 n , &c. 4.^o Que les dénominateurs de chacun de ces termes sont tels, que le dernier terme a autant de facteurs z . $z + n$. $z + 2n$. $z + 3n$. $z + 4n$, &c. plus un, que l'augmentation contient de fois n : que le penultième a tous les facteurs du dernier, excepté le premier facteur; que l'antepenultième a tous les facteurs du précédent, excepté le premier, & ainsi de suite.

D'où il suit que si l'on nomme m l'augmentation, on aura cette suite $\frac{m}{z + m - n. z + m}$

$$+ \frac{m.m - n}{z + m - 2n \dots z + m} + \frac{m. m - n. m - 2n}{z + m - 3n \dots z + m}$$

$$+ \frac{m. m - n. m - 2n. m - 3n}{z + m - 4n \dots z + m} + \frac{m. m - n. m - 2n. m - 3n. m - 4n}{z + m - 5n \dots z + m}$$

$$+ \&c. = \frac{1}{z} - \frac{1}{z + m} \text{ pour la diffé-}$$

rence d'une fraction dont le dénominateur n'est composé que d'un facteur, l'augmentation qui doit arriver à ce facteur étant m .

PROPOSITION II.

Trouver la difference d'une fraction.

$\frac{1}{x, x+n}$, dont le dénominateur est composé de deux facteurs, l'augmentation qui doit arriver à chaque facteur étant n , $2n$, $3n$, $4n$, $5n$, $6n$, ou enfin m .

1.^o Si l'augmentation est n , cette expression deviendra $\frac{1}{x+n, x+2n}$, la difference de l'une à l'autre est donc $\frac{1}{x, x+n} - \frac{1}{x+n, x+2n}$, qui se réduit, en mettant à même dénomination, à $\frac{2n}{x \dots x+2n}$

2.^o Si l'augmentation est $2n$, la difference demandée sera $\frac{1}{x, x+n} - \frac{1}{x+2n, x+3n}$, qui étant mis à même dénomination, devient $\frac{x+2n, x+3n - x, x+n}{x \dots x+3n}$, qui se ré-

duit par la première section à $\frac{2, 2n, x+n+n, 2n}{x \dots x+3n}$

$$= \frac{4n}{x+n \dots x+3n} + \frac{6nn}{x \dots x+3n}$$

3.^o Si l'augmentation est $3n$, l'expression $\frac{1}{x, x+n}$ deviendra par cette augmentation

$$\frac{1}{x+3n, x+4n}$$

$\frac{1}{x+3n, x+4n}$, la difference de l'une à l'autre

est donc $\frac{x+3n, x+4n - x, x+n}{x, x+n, x+3n, x+4n}$, qui se ré-

duit par la premiere section à $\frac{2, 3n, x+n+2n, 3n}{x, x+n, x+3n, x+4n}$

Si l'on multiplie le numerateur & le dénominateur de cette fraction par le facteur qui manque dans le dénominateur, pour que tous ses facteurs soient consecutifs, il viendra

$\frac{2, 3n, x+n, x+2n+2n, 3n, x+2n}{x, x+n, \dots, x+4n}$. Le premier

terme du numerateur se réduit par la décom-

position à $\frac{2, 3n}{x+2n, x+4n} + \frac{2, 3n, 2n}{x+n, x+4n}$

+ $\frac{2, 3n, 2n, n}{x, x+4n}$. Le second terme se réduit

aussi à $\frac{2n, 3n}{x+n, x+4n} + \frac{2n, 3n, 2n}{x, x+4n}$. La dif-

ference demandée est donc $\frac{6n}{x+2n, x+4n}$

+ $\frac{18n^2}{x+n, x+4n} + \frac{24n^3}{x, x+4n}$.

4.^o Si l'augmentation est $4n$, l'expression $\frac{1}{x, x+n}$ deviendra par cette augmentation

$\frac{1}{x+4n, x+5n}$, la difference de ces deux quan-

tités est donc $\frac{x+4n, x+5n - x, x+n}{x, x+n, x+4n, x+5n}$, qui se réduit
par

par la première section à $\frac{2 \cdot 4n \cdot 2 + n + 3n \cdot 4n}{2 \cdot 2 + n \cdot 2 + 4n \cdot 2 + 5n}$,

& en multipliant le numérateur & le dénominateur par les facteurs $2 + 2n$, $2 + 3n$ qui manque au dénominateur pour que tous ses facteurs soient consécutifs, il viendra

$$\frac{2 \cdot 4n \cdot 2 + n \cdot 2 + 3n \cdot 2 + 3n \cdot 4n \cdot 2 + 2n \cdot 2 + 3n}{2 \cdot 2 + n \cdot 2 + 4n \cdot 2 + 5n}$$

Le premier terme se réduit par la décompo-

$$\text{sition à } \frac{2 \cdot 4n}{2 + 3n \cdot 2 + 5n} + \frac{2 \cdot 4n \cdot 3n}{2 + 2n \cdot 2 + 5n} +$$

$$\frac{2 \cdot 4n \cdot 3n \cdot 2n}{2 + n \cdot 2 + 5n} + \frac{2 \cdot 4n \cdot 3n \cdot 2n \cdot n}{2 \cdot 2 + 5n} \quad \text{Le second}$$

$$\text{terme qui vaut } \frac{3n \cdot 4n \cdot 2 + n \cdot 2 + 3n}{2 \cdot 2 + 5n} (A) +$$

$$\frac{3n \cdot 4n \cdot n \cdot 2 + 3n}{2 \cdot 2 + 5n} (B) \text{ se réduit de même à}$$

$$\frac{3n \cdot 4n}{2 + 2n \cdot 2 + 5n} + \frac{3n \cdot 4n \cdot 3n}{2 + n \cdot 2 + 5n} + \frac{3n \cdot 4n \cdot 3n \cdot n}{2 \cdot 2 + 5n}$$

$$= A, \quad \frac{3n \cdot 4n \cdot n}{2 + n \cdot 2 + 5n} + \frac{3n \cdot 4n \cdot n \cdot 3n}{2 \cdot 2 + 5n} = B. \text{ Si}$$

donc l'on rassemble toutes ces parties, on

$$\text{aura } \frac{8n}{2 + 3n \cdot 2 + 5n} + \frac{36nn}{2 + 2n \cdot 2 + 5n} +$$

$$\frac{96nn}{2 + n \cdot 2 + 5n} + \frac{120n^4}{2 \cdot 2 + 5n}$$

5. Si l'augmentation est $5n$, l'expression

$$\frac{1}{2 \cdot 2 + n} \text{ deviendra par cette augmentation}$$

$$\frac{1}{2 + 5n \cdot 2 + 6n}$$

$\frac{1}{z+5n, z+6n}$, la difference de l'une à l'autre

est donc $\frac{z+5n, z+6n - z, z+n}{z, z+n, z+5n, z+6n}$, qui se réduit

par la première section à $\frac{2 \cdot 5n \cdot z + n + 4n \cdot 5n}{z, z+n, z+5n, z+6n}$,

& en multipliant le numerateur & le dénominateur de cette fraction par $z+2n$.

$z+3n, z+4n$, qui sont les facteurs qui manquent au dénominateur pour qu'ils soient consécutifs, on aura

$\frac{2 \cdot 5n \cdot z + n + 4n \cdot 5n}{z \dots z+6n} +$

$\frac{4n \cdot 5n \cdot z + 2n \cdot z + 3n \cdot z + 4n}{z \dots z+6n}$, en décomposant le

premier terme, il vient $\frac{2 \cdot 5n}{z+4n \dots z+6n} +$

$\frac{2 \cdot 5n \cdot 4n}{z+3n \dots z+6n} + \frac{2 \cdot 5n \cdot 4n \cdot 3n}{z+2n \dots z+6n} +$

$\frac{2 \cdot 5n \cdot 4n \cdot 3n \cdot 2n}{z+n \dots z+6n} + \frac{2 \cdot 5n \cdot 4n \cdot 3n \cdot 2n \cdot n}{z \dots z+6n}$

Le second terme se réduit à

$\frac{4n \cdot 5n \cdot z + n + n \cdot z + 2n + n \cdot z + 4n}{z \dots z+6n} =$

$\frac{4n \cdot 5n \cdot z + n \cdot z + 2n \cdot z + 4n}{z \dots z+6n} (A) + \frac{4n \cdot 5n \cdot 2n \cdot z + n \cdot z + 4n}{z \dots z+6n}$

$(B) + \frac{4n \cdot 5n \cdot 2n \cdot n \cdot z + 4n}{z \dots z+6n} (C)$ qui par la décomposition, deviennent

$\frac{4 \cdot 5n}{z+3n \dots z+6n}$

$$\frac{4n \cdot 5n}{z+3n \dots z+6n} + \frac{4n \cdot 5n \cdot 4n}{z+2n \dots z+6n} + \frac{4n \cdot 5n \cdot 4n \cdot 2n}{z+n \dots z+6n} + \frac{4n \cdot 5n \cdot 4n \cdot 2n \cdot n}{z \dots z+6n} = A.$$

$$+ \frac{4n \cdot 5n \cdot 2n \cdot 4n}{z+n \dots z+6n} + \frac{4n \cdot 5n \cdot 2n \cdot 4n \cdot n}{z \dots z+6n} = B,$$

$$\frac{4n \cdot 5n \cdot 2nn}{z+n \dots z+6n} + \frac{4n \cdot 5n \cdot 2nn \cdot 4n}{z \dots z+6n} = C.$$

Si l'on rassemble toutes ces parties, on aura

$$\frac{10n}{z+4n \dots z+6n} + \frac{60nn}{z+3n \dots z+6n} + \frac{240n^3}{z+2n \dots z+6n}$$

$$+ \frac{600n^4}{z+n \dots z+6n} + \frac{720n^5}{z \dots z+6n} \text{ pour la}$$

différence cherchée.

COROLLAIRE.

Il est donc évident que la difference cherchée est

$$\begin{array}{ccccccc}
 \frac{1 \cdot 2n}{2 \dots 2 + 2n} & + & \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot n^2}{2 \dots 2 + 3n} & + & \dots & + & \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot n^4}{2 \dots 2 + 6n} \\
 \frac{2 \cdot 2n}{2 + n \dots 2 + 3n} & + & \frac{3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot n^2}{2 + n \dots 2 + 4n} & + & \frac{4 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot n^3}{2 \dots 2 + 5n} & + & \frac{5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot n^4}{2 \dots 2 + 6n} \\
 \frac{3 \cdot 2n}{2 + 2n \dots 2 + 4n} & + & \frac{6 \cdot 2 \cdot 3 \cdot n^2}{2 + 2n \dots 2 + 5n} & + & \frac{10 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot n^3}{2 + 2n \dots 2 + 6n} & + & \frac{15 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot n^4}{2 \dots 2 + 6n} \\
 \frac{4 \cdot 2n}{2 + 3n \dots 2 + 5n} & + & \frac{10 \cdot 2 \cdot 3 \cdot n^2}{2 + 3n \dots 2 + 6n} & + & \frac{10 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot n^3}{2 + 3n \dots 2 + 6n} & + & \frac{15 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot n^4}{2 \dots 2 + 6n} \\
 \frac{5 \cdot 2n}{2 + 4n \dots 2 + 6n} & + & \frac{10 \cdot 2 \cdot 3 \cdot n^2}{2 + 4n \dots 2 + 6n} & + & \frac{10 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot n^3}{2 + 4n \dots 2 + 6n} & + & \frac{15 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot n^4}{2 \dots 2 + 6n}
 \end{array}$$

8c.

Si

Si l'on examine tous ces termes & leurs coefficients, lesquels sont marqués par le premier chiffre de chaque terme, on verra que ces coefficients sont ceux des puissances d'un binôme, excepté le premier terme, c'est-à-dire, par exemple que lorsque l'augmentation est $3n$, la différence cherchée est composée de trois termes, & que les premiers chiffres de chacun de ces trois termes sont les coefficients du binôme élevé au cube, & ainsi des autres.

D'où il suit que si l'on nomme m l'augmentation que chaque facteur doit recevoir,

on aura cette suite

$$\begin{array}{c}
 \frac{2. m}{x + m - n \quad x + m \quad x + m + n} \\
 + \\
 \frac{m. m - n. 3}{x + m - 2n \dots x + m + n} \\
 + \\
 \frac{m. m - n. m - 2n. 4}{x + m - 3n \dots x + m + n} + \frac{m. m - n. m - 2n. m - 3n. 5}{x + m - 4n \dots x + m + n} \\
 + \\
 \frac{m. m - n. m - 2n. m - 3n. m - 4n. 6}{x + m - 5n \dots x + m + n} \\
 + \\
 \frac{m. m - n. m - 2n. m - 3n. m - 4n. m - 5n. 7}{x + m - 6n \dots x + m + n} + \&c. = \\
 \frac{x}{x \cdot x + n} - \frac{x}{x + m \cdot x + n + m} \text{ pour la diffé-}
 \end{array}$$

rence d'une fraction dont le dénominateur est composé de deux facteurs, lesquels doivent augmenter de la grandeur m .

Cette suite sera composée d'autant de termes que la grandeur m contiendra de fois la grandeur n .

PROPOSITION III.

Trouver la différence d'une grandeur algebrique fractionnaire, dont le dénominateur est composé de trois facteurs, quelle que soit l'augmentation qui doit arriver à chaque facteur.

Soit cette expression algebrique $\frac{1}{x \cdot x+n \cdot x+2n}$ dont on demande la différence, l'augmentation qui doit arriver à chaque facteur étant n , $2n$, $3n$, $4n$, $5n$, $6n$, ou enfin m .

1.^o Si l'augmentation est n , cette expression deviendra $\frac{1}{x+n \cdot x+2n \cdot x+3n}$, la différence de l'une à l'autre est donc $\frac{1}{x \cdot x+n \cdot x+2n}$

$$\frac{1}{x+n \cdot x+2n \cdot x+3n} = \frac{3n}{x \cdot x+3n}$$

2.^o Si l'augmentation est $2n$, la différence demandée sera $\frac{1}{x \cdot x+n \cdot x+2n}$

$$\frac{1}{x+2n \cdot x+3n \cdot x+4n} = \frac{x+3n \cdot x+4n - x \cdot x+n}{x \cdot \dots \cdot x+4n}$$

qui se réduit par la première section à

$$\frac{2 \cdot 3n \cdot x+n+2n \cdot 3n}{x \cdot \dots \cdot x+4n}, \text{ \& en décomposant à}$$

$$\frac{2 \cdot 3n}{x+n \cdot \dots \cdot x+4n} + \frac{2 \cdot 3n \cdot n}{x \cdot \dots \cdot x+4n} + \frac{2n \cdot 3n}{x \cdot \dots \cdot x+4n}$$

$$= \frac{6n}{x+n \cdot \dots \cdot x+4n} + \frac{12n^2}{x \cdot \dots \cdot x+4n}$$

3.^o Si l'augmentation est $3n$, la différence demandée

mandée sera $\frac{1}{z \cdot z + n \cdot z + 2n} - \frac{1}{z + 3n \cdot z + 4n \cdot z + 5n}$

$$\frac{z + 3n \cdot z + 4n \cdot z + 5n - z \cdot z + n \cdot z + 2n}{z \cdot z + 3n \cdot z + 4n \cdot z + 5n} =$$

$$\frac{z \cdot z + 3n \cdot z + 4n \cdot z + 5n - z \cdot z + n \cdot z + 2n}{z \cdot z + 3n \cdot z + 4n \cdot z + 5n} = \frac{z \cdot z + 3n \cdot z + 4n \cdot z + 5n - z \cdot z + n \cdot z + 2n}{z \cdot z + 3n \cdot z + 4n \cdot z + 5n}$$

Le premier terme se réduit, en décomposant, à $\frac{3 \cdot 3n}{z + 2n \dots z + 5n} + \frac{3 \cdot 3n \cdot 2n}{z + n \dots z + 5n}$

+ $\frac{3 \cdot 3n \cdot 2n \cdot n}{z \dots z + 5n}$. Le second à

$$\frac{3 \cdot 2n \cdot 3n}{z + n \dots z + 5n} + \frac{3 \cdot 2n \cdot 3n \cdot n}{z \dots z + 5n}$$

La différence cherchée est donc $\frac{9n}{z + 2n \dots z + 5n} +$

$$\frac{36n^2}{z + n \dots z + 5n} + \frac{60n^3}{z \dots z + 5n}$$

4.° Si l'augmentation est $4n$, la différence demandée sera $\frac{1}{z \cdot z + n \cdot z + 2n}$

$$\frac{1}{z + 4n \cdot z + 5n \cdot z + 6n} =$$

$$\frac{3 \cdot 4n \cdot z + n \cdot z + 2n + 3 \cdot 3n \cdot 4n \cdot z + n + 3n \cdot 4n \cdot 5n}{z \cdot z + n \cdot z + 2n \cdot z + 4n \cdot z + 5n \cdot z + 6n}$$

Si l'on multiplie le numérateur & le dénominateur par $z + 3n$, qui est le facteur qui manque au dénominateur, pour que tous les facteurs soient consécutifs, on aura

$$\frac{3 \cdot 4n \cdot z + n \cdot z + 2n + 3n + 3 \cdot 3n \cdot 4n \cdot z + n \cdot z + 3n}{z \cdot z + 3n \cdot z + 4n \cdot z + 5n \cdot z + 6n}$$

$$\frac{z \cdot z + 3n \cdot z + 4n \cdot z + 5n \cdot z + 6n}{z \cdot z + 3n \cdot z + 4n \cdot z + 5n \cdot z + 6n}$$

Le

Le premier terme se réduit par la décom-

position à $\frac{3 \cdot 4n}{z+3n \cdot z+6n} + \frac{3 \cdot 4n \cdot 3n}{z+2n \dots z+6n} +$

$\frac{3 \cdot 4n \cdot 3n \cdot 2n}{z+n \dots z+6n} + \frac{3 \cdot 4n \cdot 3n \cdot 2n \cdot n}{z \dots z+6n}$. Le second à

$\frac{3 \cdot 3n \cdot 4n}{z+2n \dots z+6n} + \frac{3 \cdot 3n \cdot 4n \cdot 3n}{z+n \dots z+6n} +$

$\frac{3 \cdot 3n \cdot 4n \cdot 3n \cdot n}{z \cdot z+6n}$. Le troisième à $\frac{3 \cdot n \cdot 4n \cdot 5n}{z+n \dots z+6n}$

+ $\frac{3n \cdot 4n \cdot 5n \cdot 3n}{z \dots z+6n}$. La difference cherchée est

donc $\frac{12n}{z+3n \cdot z+6n} + \frac{72n^2}{z+2n \dots z+6n} +$

$\frac{240n^3}{z+n \dots z+6n} + \frac{360n^4}{z \dots z+6n}$.

5.^o Si l'augmentation est $5n$, la differen-
ce demandée fera $\frac{1}{z \cdot z+n \cdot z+2n}$

$\frac{1}{z+5n \cdot z+6n \cdot z+7n}$

$\frac{3 \cdot 5n \cdot z+n \cdot z+2n + 3 \cdot 4n \cdot 5n \cdot z+n + 4n \cdot 5n \cdot 6n}{z \cdot z+n \cdot z+2n \cdot z+5n \cdot z+6n \cdot z+7n}$

& en multipliant le numerateur & le déno-

minateur par $z+3n \cdot z+4n$, qui sont les
facteurs qui manquent au dénominateur,
pour que tous les facteurs soient consécu-
tifs, on aura

$\frac{3 \cdot 5n \cdot z+n \cdot z+2n \cdot z+3n \cdot z+4n + 3 \cdot 4n \cdot 5n \cdot z+n \cdot z+3n \cdot z+4n + 4n \cdot 5n \cdot 6n \cdot z+3n \cdot z+4n}{z \cdot \dots \cdot z+7n}$

Le premier terme se réduit à $\frac{3 \cdot 5n}{z+4n \dots z+7n}$

$$+ \frac{3 \cdot 5n \cdot 4n}{x+3n \dots x+7n} + \frac{3 \cdot 5n \cdot 4n \cdot 3n}{x+2n \dots x+7n} +$$

$$\frac{3 \cdot 5n \cdot 4n \cdot 3n \cdot 2n}{x+n \dots x+7n} + \frac{3 \cdot 5n \cdot 4n \cdot 3n \cdot 2n \cdot n}{x \dots x+7n} \text{ Le se-}$$

cond se réduit à $\frac{3 \cdot 4n \cdot 5n \cdot x + 3 \cdot 4n \cdot 5n \cdot 2n \cdot x + 4n}{x \dots x+7n} (A)$

$$+ \frac{3 \cdot 4n \cdot 5n \cdot n \cdot x + n \cdot x + 4n}{x \dots x+7n} (B), \text{ dont la dé-}$$

composition donne $A = \frac{3 \cdot 4n \cdot 5n}{x+3n \dots x+7n} +$

$$\frac{3 \cdot 4n \cdot 5n \cdot 4n}{x+2n \dots x+3n} + \frac{3 \cdot 4n \cdot 5n \cdot 4n \cdot 2n}{x+n \dots x+7n} +$$

$$\frac{3 \cdot 4n \cdot 5n \cdot 4n \cdot 2n \cdot n}{x \dots x+7n}, \& B = \frac{3 \cdot 4n \cdot 5n \cdot n}{x+2n \dots x+7n} +$$

$$\frac{3 \cdot 4n \cdot 5n \cdot n \cdot 4n}{x+n \dots x+7n} + \frac{3 \cdot 4n \cdot 5n \cdot n \cdot 4n \cdot n}{x \dots x+7n} \text{ Le}$$

troisième terme se réduit à $\frac{4n \cdot 5n \cdot 6n \cdot x + n \cdot x + 4n}{x \dots x+7n}$

$$(C) + \frac{4n \cdot 5n \cdot 6n \cdot 2n \cdot x + 4n}{x \dots x+7n} (D), \text{ dont la}$$

décomposition donne $C = \frac{4n \cdot 5n \cdot 6n}{x+2n \dots x+7n}$

$$+ \frac{4n \cdot 5n \cdot 6n \cdot 4n}{x+n \dots x+7n} + \frac{4n \cdot 5n \cdot 6n \cdot 4n \cdot n}{x \dots x+7n}, \& D =$$

$$\frac{4n \cdot 5n \cdot 6n \cdot 2n}{x+n \dots x+7n} + \frac{4n \cdot 5n \cdot 6n \cdot 2n \cdot 4n}{x \dots x+7n}$$

Si donc on rassemble toutes ces parties,
on aura $\frac{15n}{x+4n \dots x+7n} + \frac{120n^2}{x+3n \dots x+7n}$

$$+ \frac{600n^3}{x+2n \dots x+7n} + \frac{1800n^4}{x+n \dots x+7n} + \frac{2'20n^5}{x \dots x+7n}$$

pour

DES SCIENCES. 1723. 269
pour la différence cherchée.

6.^o Si l'augmentation est $6n$, on trouvera
en suivant la même méthode

$$\begin{array}{r} \frac{18n}{x+5n..x+8n} + \frac{180n^2}{x+4n..x+8n} + \\ \frac{1200n^3}{x+3n..x+8n} + \frac{5400n^6}{x+2n..x+8n} + \\ \frac{15120n^5}{x+n..x+8n} + \frac{20160n^6}{x..x+8n} \end{array} \text{ pour la différen-}$$

ce demandée.

C O R O L L A I R E.

Il est donc évident que la différence d'une fraction dont le dénominateur est composé de trois facteurs est

$$\begin{array}{ccccccc}
 \frac{1 \cdot 3 \cdot n}{2 \cdot \dots \cdot 2 + 3n} & \cdot & \text{ lorsque l'augmentation est } & \cdot & \cdot & \cdot & n. \\
 \frac{2 \cdot 3 \cdot n}{2 + n \cdot \dots \cdot 2 + 4n} & + & \frac{1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot n^2}{2 \cdot \dots \cdot 2 + 4n} & \cdot & \cdot & \cdot & 2n. \\
 \frac{3 \cdot 3 \cdot n}{2 + 2n \cdot \dots \cdot 2 + 5n} & + & \frac{3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot n^2}{3 + n \cdot \dots \cdot 2 + 5n} & + & \frac{1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot n^3}{2 \cdot \dots \cdot 2 + 5n} & \cdot & 3n. \\
 \frac{4 \cdot 3 \cdot n}{2 + 3n \cdot \dots \cdot 2 + 6n} & + & \frac{6 \cdot 3 \cdot 4 \cdot n^2}{2 + 2n \cdot \dots \cdot 2 + 6n} & + & \frac{4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot n^3}{2 + n \cdot \dots \cdot 2 + 6n} & + & \frac{1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot n^4}{2 \cdot \dots \cdot 2 + 5n} \cdot \cdot \cdot 4n. \\
 \frac{5 \cdot 3 \cdot n}{2 + 4n \cdot \dots \cdot 2 + 7n} & + & \frac{10 \cdot 3 \cdot 4 \cdot n^2}{2 + 3n \cdot \dots \cdot 2 + 7n} & + & \frac{10 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot n^3}{2 + 2n \cdot \dots \cdot 2 + 7n} & + & \frac{5 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot n^4}{2 + n \cdot \dots \cdot 2 + 7n} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot n}{2 \cdot \dots \cdot 2 + 7n} \cdot \cdot \cdot 5n.
 \end{array}$$

856

SI

Si l'on examine tous ces termes, & leurs coefficients qui sont représentés par le premier chiffre de chaque terme, on verra que la différence d'une fraction composée de trois facteurs, sera composée d'autant de termes, que l'augmentation qui doit arriver à chaque facteur contient de fois n , & que les coefficients de ces termes sont ceux du binôme élevé à une puissance égale à l'augmentation que doit recevoir chaque facteur, en observant de retrancher le premier coefficient de cette puissance.

D'où il suit, que si l'on veut que l'augmentation qui doit arriver à chaque facteur soit m , on aura cette suite

$$\begin{array}{r}
 \overline{m, 2} \quad \quad \quad \overline{m, m-n, 2, 4} \\
 2, 2, m-n, 2, 2n \quad + \quad 2, 2, m-2n, 2, m, 2n \\
 \\
 \overline{m, m-n, m-2n, 4, 5} \\
 2, 2, m-3n, \dots, 2, m, 2n \quad + \\
 \\
 \overline{m, m-n, m-2n, m-3n, 5, 6} \\
 2, 2, m-4n, \dots, 2, m, 2n \quad + \\
 \\
 \overline{m, m-n, m-2n, m-3n, m-4n, 6, 7} \quad + \quad \&c. \\
 2, 2, m-5n, \dots, 2, m, 2n \\
 \\
 \overline{I} \quad \quad \quad \overline{I} \\
 2, 2, n, 2, 2n \quad - \quad 2, m, 2, n, m, 2, n, m
 \end{array}$$

pour la différence cherchée.

Si l'on cherche par la même méthode, la différence d'une fraction, dont le dénominateur soit composé de quatre facteurs, & l'augmentation qui doit arriver à chaque facteur soit m on trouvera cette suite

$$\overline{m, 4} \\
 2, m-n, \dots, 2, m, 3n$$

$M \quad 4$

$$\begin{array}{r}
 \frac{m, 4}{x + m - n \dots x + m + 3n} + \frac{m, m - n, 4, 5}{2, x + m - 2n \dots x + m + 3n} \\
 + \frac{m, m - n, m - 2n, 4, 5, 6}{2, 3, x + m - 3n \dots x + m + 3n} \\
 + \frac{m, m - n, m - 2n, m - 3n, 5, 6, 7}{2, 3, x + m - 4n \dots x + m + 3n} \\
 + \frac{m, m - n, m - 2n, m - 3n, m - 4n, 6, 7, 8}{2, 3, x + m - 5n \dots x + m + 3n} \\
 \&c. = \frac{I}{x, x + n, x + 2n, x + 3n}
 \end{array}$$

Si l'on cherche la différence d'une fraction dont le dénominateur soit composé de cinq facteurs, l'augmentation qui doit arriver à chaque facteur étant m , on trouvera cette suite

$$\begin{array}{r}
 \frac{m, 5}{x + m - n \dots x + m + 3n} + \frac{m, m - n, 5, 6}{2, x + m - 2n \dots x + m + 4n} \\
 + \frac{m, m - n, m - 2n, 5, 6, 7}{2, 3, x + m - 3n \dots x + m + 4n} \\
 + \frac{m, m - n, m - 2n, m - 3n, 5, 6, 7, 8}{2, 3, 4, x + m - 4n \dots x + m + 4n} \\
 + \frac{m, m - n, m - 2n, m - 3n, m - 4n, 6, 7, 8, 9}{2, 3, 4, x + m - 4n \dots x + m + 4n} \\
 + \frac{m, m - n, m - 2n, m - 3n, m - 4n, m - 5n, 7, 8, 9, 10}{2, 3, 4, x + m - 6n \dots x + m + 4n} + \&c. \\
 = \frac{I}{x, x + n, x + 2n, x + 3n, x + 4n} \\
 \frac{I}{x + m, x + n + m, x + 2n + m, x + 3n + m, x + 4n + m}
 \end{array}$$

COROLLAIRE GENERAL.

On aura donc ces suites, pour la différence d'une fraction composée de 1. 2. 3. 4. 5. &c. facteurs, l'augmentation étant m .

$$\begin{array}{r}
 \frac{m. 1}{z + m - n. z + m} + \frac{m. m - n}{z + m - 2n \dots z + m} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2n}{z + m - 3n \dots z + m} + \frac{m. m - n. m - 2n. m - 3n}{z + m - 4n \dots z + m} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2n. m - 3n. m - 4n}{z + m - 5n \dots z + m} + \\
 \text{\&c. pour un facteur.}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \frac{m. 2}{z + m - n \dots z + m + n} + \frac{m. m - n. 3}{z + m - 2n \dots z + m + n} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2n. 4}{z + m - 3n \dots z + m + n} + \frac{m. m - n. m - 2n. m - 3n. 5}{z + m - 4n \dots z + m + n} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2n. m - 3n. m - 4n. 6}{z + m - 5n \dots z + m + n} + \\
 \text{\&c. pour 2. facteurs.}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \frac{m. 3}{z + m - n \dots z + m + 2n} + \frac{m. m - n. 3. 4}{2. z + m - 2n \dots z + m + 2n} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2n. 4. 5}{2. z + m - 3n \dots z + m + 2n} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2n. m - 3n. 5. 6}{2. z + m - 4n \dots z + m + 2n} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2n. m - 3n. m - 4n. 6. 7}{2. z + m - 5n \dots z + m + 2n} + \\
 \text{\&c.}
 \end{array}$$

M 5

(274) MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
&c. pour 3. facteurs.

$$\begin{array}{l}
 \frac{m. 4}{2. + m - n. . . 2. + m + 3n} + \frac{m. m - n. 4. 5}{2. 2. + m - 2n. . . 2. + m + 3n} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2. n. 4. 5. 6}{2. 4. 2. + m - 3n . . . 2. + m + 3n} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2. n. m - 3. n. 5. 6. 7}{2. 3. 2. + m - 4n . . . 2. + m + 3n} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2. n. m - 3. n. m - 4. n. 6. 7. 8}{2. 3. 2. + m - 5n . . . 2. + m + 3n}
 \end{array}$$

&c. pour 4 facteurs.

$$\begin{array}{l}
 \frac{m. 5}{2. + m - n. 2. + m + 4n} + \frac{m. m - n. 5. 6}{2. 2. + m - 2n . . 2. + m + 4n} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2. n. 5. 6. 7. . .}{2. 3. 2. + m - 3n . . . 2. + m + 4n} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2. n. m - 3. n. 5. 6. 7. 8}{2. 3. 4. 2. + m - 4n . . . 2. + m + 4n} + \\
 \frac{m. m - n. m - 2. n. m - 3. n. m - 4. n. 6. 7. 8. 9}{2. 3. 4. 2. + m - 5n . . . 2. + m + 4n}
 \end{array}$$

&c. pour 5. facteurs.

La loi de ces suites est aisée à appercevoir, 1.^o elles ont toutes le même nombre de termes quel que soit le nombre des facteurs, pourvu que l'augmentation qui doit arriver à chaque facteur soit la même, par exemple, si $m = 4n$, le 5.^e terme de toutes ces suites s'évanouit, aussi bien que tous les termes qui le suivent.

2.^o Les chiffres, qui dans chaque terme de ces suites, multiplient les quantités m .

$m =$

$m - n$, $m - 2n$, &c. expriment les nombres figurés d'une bande horizontale du triangle arithmétique de M. *Pascal*, laquelle bande est indiquée par le nombre des facteurs de la fraction dont on a pris la différence, c'est-à-dire que si la fraction est composée par exemple de trois facteurs, ces quantités seront les nombres figurés du troisième ordre &c. dont on excepte le premier terme. De là il suit que si l'on nomme p le nombre des facteurs on aura cette suite pour la différence d'une fraction dont le nombre des facteurs est p .

$$\begin{array}{r}
 \frac{m \cdot p}{x + m - n \dots x + m + p - 1 \cdot n} + \\
 \frac{m \cdot m - n \cdot p \cdot p + 1}{1 \cdot 2 \cdot x + m - 2n \dots x + m + p - 1 \cdot n} + \\
 \frac{m \cdot m - n \cdot m - 2n \cdot p \cdot p + 1 \cdot p + 2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot x + m - 3n \dots x + m + p - 1 \cdot n} + \&c. \\
 \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot x + m - 4n \dots x + m + p - 1 \cdot n}{x + n \dots x + p - 1 \cdot n} \\
 = \frac{x + m \cdot x + m + n \dots x + m + p - 1 \cdot n}{1}
 \end{array}$$

COROLLAIRE II.

Il est donc évident par cette formule, que toute suite de fractions est sommable dont les denominateurs sont composés de facteurs qui augmentent arithmétiquement, & dont

chaque terme a un facteur de plus que le terme qui le precede, les numerateurs de ces fractions étant les nombres figurés du triangle arithmetique de M. *Pascal*, multipliés chacun par le terme correspondant de m , m , $m-n$, $m-m-n$, $m-2n$, &c.

COROLLAIRE III.

Si l'on suppose $m=n$, tous les termes de cette suite s'évanouiront excepté le premier terme, l'on aura alors $\frac{p^n}{1 \dots 1+n-1+p-1.n}$

ce qui est le cas du Memoire imprimé en 1717.

COROLLAIRE IV.

Si l'on suppose $n=0$, c'est-à-dire que la fraction dont on a pris la difference soit composée de tant de facteurs égaux qu'on voudra, la suite deviendra

$$\frac{pm}{1+m} + \frac{p.p-1.m^2}{1.2.1+m} + \frac{p.p-1.p-2.m^3}{1.2.3.1+m} + \frac{p.p-1.p-2.p-3.m^4}{1.2.3.4.1+m} + \&c. = \frac{1}{1+m} - \frac{1}{p}$$

D'où l'on voit qu'une suite infinie est sommable, dont tous les termes sont les produits de chaque terme d'une progression geometrique, multipliés par chaque terme d'une suite de nombres figurés.

Exemple,

Exemple. Soit cette suite $\frac{4 \cdot a}{b+a} + \frac{0 \cdot a}{1+a} + \frac{20 \cdot a}{7} + \frac{35 \cdot a}{8} + \&c.$ qui est formée par les termes d'une progression geometrique, dont le premier est $\frac{a}{b+a}$, & par les nombres figurés du 4.^e ordre, la somme de cette suite sera $\frac{1}{b4} - \frac{2}{b+a4}$.

Si l'on substitue successivement dans la suite generale pour p , m & z les valeurs que l'on voudra, il naîtra une infinité de suites qui seront toutes sommables.

Voici une autre maniere de trouver les sommes de ces suites.

Soit $\frac{a}{1-a}$, si l'on fait la division à l'infini de cette expression, on aura $a + aa + a^3 + a^4 + a^5 + a^6 + a^7 + a^8 + \&c.$ julques à l'infini

On pourra donc substituer $\frac{a}{1+a}$ pour une telle suite, & si l'on a cette autre.

$a + 2aa + 3a^3 + 4a^4 + 5a^5 + 6a^6 + 7a^7 + \&c.$

en la décomposant en

$a + aa + a^3 + a^4 + a^5 + a^6 + a^7 + \&c.$

$$= \frac{a}{1-a}$$

$$+ \frac{aa}{a^2} + \frac{a^3}{a^3} + \frac{a^4}{a^4} + \frac{a^5}{a^5} + \frac{a^6}{a^6} + \frac{a^7}{a^7} + \&c.$$

$$= \frac{a}{1-a}$$

$$+ \frac{a^3}{a^3} + a^4 + a^5 + a^6 + a^7 + \&c.$$

$$= \frac{a}{1-a}$$

$$+a^4 + a^5 + a^6 + a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} a^4 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$+a^5 + a^6 + a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} a^5 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$+a^6 + a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} a^6 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$+a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} a^7 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

il viendra

$$a + 2aa + 3a^3 + 4a^4 + 5a^5 + 6a^6 + 7a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 1 - a \end{array} \times a + aa + a^3 + a^4 + a^5 + a^6 + a^7 + \&c.$$

$$\begin{array}{r} a \\ \hline 1 - a \end{array}$$

Si l'on a cette autre suite

$$a + 3aa + 6a^3 + 10a^4 + 15a^5 + 21a^6 + 28a^7 + \&c.$$

qui est composée des nombres figurés du 3.^e ordre multipliés par une progression géométrique, on la décomposera en

$$a + 2aa + 3a^3 + 4a^4 + 5a^5 + 6a^6 + 7a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} a \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 1 - a \end{array} + aa + 2a^3 + 3a^4 + 4a^5 + 5a^6 + 6a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} a^2 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 1 - a \end{array} + a^3 + 2a^4 + 3a^5 + 4a^6 + 5a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} a^3 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$\begin{array}{r} a^4 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$\begin{array}{r} a^5 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$+ a^4 + 2a^5 + 3a^6 + 4a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} a_4 \\ \hline \hline 2 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$+ a^5 + 2a^6 + 3a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} a_5 \\ \hline \hline 2 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$+ a^6 + 2a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} a_6 \\ \hline \hline 2 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$+ a^7 + \&c. =$$

$$\begin{array}{r} a_7 \\ \hline \hline 2 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

Donc

$$a + 3a^2 + 6a^3 + 10a^4 + 15a^5 + 21a^6 + 28a^7 + \&c. =$$

$$\frac{1}{1 - a} \times a + aa + a^3 + a^4 + a^5 + a^6 + \&c.$$

$$\begin{array}{r} \hline \hline 2 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

$$\begin{array}{r} a \\ \hline \hline 3 \\ \hline 1 - a \end{array}$$

Il est clair que dans les nombres figurés de tous les ordres, la même décomposition aura lieu.

$$\text{La suite } a + p. a^2 + \frac{p. p + 1.}{1. 2.} a^3 +$$

$$+ \frac{p. p + 1. 2. 3.}{1. 2. 3.} a^4 + \frac{p. p + 1. p + 2. p + 3.}{1. 2. 3. 4.} a^5 +$$

$$+ \frac{p. p + 1. p + 2. p + 3. p + 4.}{1. 2. 3. 4. 5.} a^6 + \&c.$$

$$\text{sera donc égale à } \frac{a^p}{1 - a}.$$

R. E.

REMARQUE I.

Si l'on fait attention à la regle generale qui a été trouvée pour prendre la difference d'une fraction composée de tant de facteurs qu'on voudra, l'augmentation qui doit arriver à chaque facteur étant aussi quelconque, on appercevra aussi ce qu'il faut faire, une difference quelconque étant donnée pour retrouver la grandeur dont elle est la difference, ou s'il n'y a qu'une partie de cette difference de donnée, on découvrira ce qui manque à cette partie pour retrouver la grandeur dont elle est la difference, cette grandeur est l'integrale de la difference donnée.

REMARQUE II.

Les grandeurs m , n & p qui entrent dans la formule generale de la difference d'une fraction quelconque, étant toutes trois indeterminées, il est clair que si l'on determine l'une de ces trois grandeurs, ou deux quelconques, ou enfin toutes trois, & que l'on substitue dans la formule ces valeurs determinées, cette formule recevra autant de differens changemens que ces trois grandeurs peuvent recevoir de differentes valeurs, & que dans chaque état de cette formule elle exprimera la difference finie d'une expression algebrique fractionnaire dont l'integrale finie sera par consequent cette fraction.

Appli.

Application du Corollaire general à la recherche des sommes des suites.

E X E M P L E I.

Si l'on suppose dans la formule generale $m=4$ $n=2$ & $p=3$, elle se changera en

$$\frac{12}{z+2 \dots z+8} + \frac{48}{z \dots z+8}$$

Si l'on suppose de plus que z a successivement les valeurs 1, 5, 9, 13, 17, 21, &c. ces deux termes seront les formules des deux suites

$$\begin{aligned} & \frac{12}{3.5.7.9} + \frac{12}{7.9.11.13} + \frac{12}{11.13.15.17} + \\ & \frac{12}{15.17.19.21} + \&c. \quad \frac{48}{1.3.5.7.9} + \frac{48}{5.7.9.11.13} \\ & + \frac{48}{9.11.13.15.17} + \frac{48}{13.15.17.19.21} + \&c. \end{aligned}$$

Pour avoir la somme de ces deux suites il ne faut donc que prendre l'integrale de cette formule $\frac{12}{z+2 \dots z+8} + \frac{48}{z \dots z+8}$, cette

integrale est $\frac{1}{z \cdot z+2 \cdot z+4}$, puisque par la formule generale la difference de cette grandeur est $\frac{12}{z+2 \dots z+8} + \frac{48}{z \dots z+8}$, la somme de ces deux suites prises depuis les termes $\frac{12}{z+2 \dots z+8} + \frac{48}{z \dots z+8}$, jusques à l'infini est donc $\frac{1}{z \cdot z+2 \cdot z+4}$ ce qui donne pour la somme entiere des deux suites $\frac{1}{1.3.5}$. Car alors $z=1$.

E X E M-

E X E M P L E II.

Si l'on suppose $m=4n$, $n=3$, & $p=5$,
 on aura $\frac{12.5}{z+9 \dots z+24} + \frac{12.9.10}{z+6 \dots z+24} +$
 $+ \frac{12.9.6.10}{z+3 \dots z+24}$ pour la difference qui
 convient à ces suppositions, & chaque ter-
 me de cette difference sera la formule d'une
 suite dans laquelle z a successivement les
 valeurs, 1. 13. 25. 37. 49. 61. &c. Ces
 suites seront donc

$$\begin{aligned} & \frac{12.5}{10.13.16.19.22.25} + \frac{12.5}{22.25.28.31.34.37} + \\ & + \frac{12.5}{34.37.40.43.46.49} + \&c. \\ & \frac{12.9.10}{7.10.13.16.19.22.25} + \frac{12.9.10}{19.22.25.28.31.34.37} + \\ & + \frac{12.9.10}{31.34.37.40.43.46.49} + \&c. \\ & \frac{12.9.6.10}{4.7.10.13.16.19.22.25} + \frac{12.9.6.10}{16.19.22.25.28.31.34.37} + \\ & + \frac{12.9.6.10}{28.31.34.37.40.43.46.49} + \&c. \end{aligned}$$

qui est la som-
 me de ces trois suites, depuis le terme ex-
 primé par

$$\frac{12.5}{z+9 \dots z+24} + \frac{12.9.10}{z+6 \dots z+24} + \frac{12.9.6.10}{z+3 \dots z+24}$$

jusques à l'infini, ce qui
 donne pour la somme entiere des trois
 suites $\frac{1}{1.4.7.10.13}$, car alors $z=1$